อย่างละเอียดรอบคอบอย่างน้อยปัสะทรั้ง และกวรให้ ออร์โมมทดแทนต่อ ก็ต่อเมื่อมีประโชรน์มากกว่าความ เสี่ยงเท่านั้น

เนื่องจากมีประสบการณ์ที่จำกัดในการรักษาสดรีที่ทหค ประจำเดือนก่อนวัยอันควร (เนื้อจากรังใช่พุดคทำงาน หรือท่าตัด) สังนั้นหลักฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงจาก ออร์ในมหลุนทนในการรักษาเราะหมคประจำเดือน ก่อนวัยอันควรจึงมีอยู่อย่างจำกัดด้วยเท่นดียวกัน อย่างไรก็สาม เนื่องจากในสดรีที่อายุนัชยกว่ามีความ เสี่ยงสัมบูรณ์ในระจับที่ส่ำ สังนั้นความสมดุจระทว่าง ประไขชน์เฉะความเสี่ยงสำหรับสดรีเหล่านี้จึงอาจ

การตรวม/การติดสามุทางการแพทช์
ก่อนที่จะเริ่มหรือคลับมหรืบใช้ขอร์ในนาดแทน ควร
ซักประวัติส่วนควันละประวัติสอบทรัวอย่าละเอียด
การตราลร่างกาย (รวมถึง เชิงกราม และเต็นม) ควร
สิลารถาถึงข้อนี้และซ้อท้ามใช้และทับคือนในการใช้ยา
การตราลร่างกาย (รวมถึง เชิงกราม และเต็นม) ควร
สิลารถาถึงข้อนี้และซ้อท้ามใช้และทับคือนในการใช้ยา
ในระหว่างการตรวจร่างกาดตนที่ทนอให้หมาะสม
กับสู่ป่วยแค่ละตน ควรแนะนำให้ผู้ป่วยราชงานการ
เมื่อบแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับค้านมให้แพทธ์หรือ
พยามาลทราม (สูหร้อย "แระจึงเก็นม ที่แพทธ์หรือ
พยามาลทราม (สหร้อยให้เกราให้เครื่องน้อดใยภาพที่
การตรวจสอบสังรวมถึงการใช้เครื่องน้อดใยภาพที่
การตรวจสามีรับพื้นอนร้อนในการตามระบัฏิบัติการ
กัดกรองที่เป็นพางคลิมิกสำหรับรัฐแมนในเล่ละทาน
ความตำเป็นทางคลิมิกสำหรับผู้ป่วยแต่ละทาน

โรคที่จำก็<u>ในต้องได้รับการดูแลเป็นพิศษ</u>
หากเป็นโรคโล ๆ ต่อไปนี้ เคยเป็นมาก่อน และ/
หรือมือกการแต่ลงในระหว่างการดัดกรรภ์หรือ
ในระหว่างที่ใส้รับการรักมาล้อยอร์ ในมา่อน
หน้านี้ ผู้ป่วยกราให้รับการรักมาล้อยอร์ ในมา่อน
หน้านี้ ผู้ป่วยกราให้รับการรักมาล้อยอร์ ในมา่อน
หน้านี้ ผู้ป่วยกราให้รับการรักมาล้อยอสโลรเหม*
โรคเหล่านี้อาจกรับเป็นระหว่างการรักมาล้อยอสโลรเหม*
เรื่องอกมลลูกหนิด Leciomyoma (การเกิด
เกี่ยยื่อเส้นใชที่มลลูก (และine libroids))
หรือเดือนให้เริ่มเลลูกเจริกมูคิดที่ที่
- มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะก็มเลือลลุดสรัน

ระลูกหู (Otosclei

<u>เขื่อบุโพรงมดลูกหมาตัวอีดปกติและมะเร็ง</u> <u>เขื่อบุโพรงมดลูก</u>

การให้อยร์โมนไประสสาเอเมสริมเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 12 วันค่อรอบของการใช้ยาในสสรีที่ผันไม่ใส้
ผ่าลักมลุกออก ช่วยป้องกันความเสียงให้เพิ่งใจกาก
การใส้รับออร์โมนทอแทนแบบที่มีเอสโครเลนเพียง
อย่างลียว อางมีเลือดออกและจุดเลือดออกเกิดขึ้น ให้
ในระหว่างเลือนเราของการรักษาในสสรีที่ยังมีมลลุก
ทำงานให้ปกลิ หากมีเลือดออกเลืองเลือดออกเกิดขึ้น
บางร้างสังจากนั้นในระหว่างการรักษา หรือยังเกิดขึ้น
บางร้างสังจากนั้นในระหว่างการรักษา หรือยังเกิดขึ้น
ล่อทถังจากหลุดการักษา กระกับการสวายทาสาเทสุ
ซึ่งอาจรามเล็จการสัดขึ้นเมื่อเชื่อปูโทรงเลลุกกที่จอกที่จอกที่อยี่บัน
ว่าไม่ใส้บันยะเร็งเชื่อปูโทรงเลลุกกที่จอกที่จอกที่จอกที่อยี่บัน
ว่าไม่ให้เรียดร์โมนเกริ่มตัดสร้ายอะก่อนมะเร็ง หรือเปลี่ยนเป็น
เชลอ์มะเร็งให้ที่สุด สังนั้นจิดกรรมีที่จากเก็นจอยู่ในจุด
การใส้รับอารที่เปลี่ยนกากการใช้ออร์โมนเลสโครเลนเพียง
อย่างคือวในสลร์ที่ให้รับการห่างลีกเลลุกออกเนื่องจาก
เชื่อปูใหรงเลลุกเลริญเกิดที่ หากทราบว่าผู้ป่วยถึงจงมี
เชื่อปูใหรงเลลุกเลริญเกิดที่

จากหลักฐานโดยรวมแสงให้เห็นจิสาวเมสั่งจที่เพิ่ม มากับเของนะเร็งต้ามมในสตรีที่ใช้รับฮอร์ โมนแบนผสม เอสไครเจน-โปรเจสลาเจน หรือฮอร์ โมนทอนทนแบบที่ มิเฉพาะเอสโจรเจนเพียงอย่างเดียวด้วยเช่นกันซึ่งขึ้นอยู่ กับระยะเวลาของการใช้รับฮอร์ โมนทอแทน

ากการศึกษาของโครงการวิชัย Women's Health mitative (WHI) ใม่หมความเสียงที่เห็นมากขึ้นของ เะเร็งเต้านมในสตรีที่ได้รับการผ่าตัดบลลูกออกและ

(ดูดับเช่าง) - มีบังจับเสียงที่จะเป็นเนื้องอกชนิดที่ใวต่อ ขอร์ไมเมอส โดรเดน เช่น มีพูกดิสำดับที่ เ เป็นมะเริ่งเด้านม

- ความดับโลทิตสูง
- มีความดินโลทิตสูง
- มีความดินโกติของลับ (เช่น เนื่องอกที่ตับ
ชนิดอะดีโนมา (liver adenoma))
- โรคแบทวามที่มีความดีจปกติของ
หลอดเลือดร่วมด้วยหรือไม่ก็ใส้
- โรคนิวในจุนไว้ดี
- โรคนิวในจุนไว้ดี
- "บมกาน หรือปวดสีรษะ (อย่างรุนแรง)
- โรคฉูมิแท้ตนเองหรือฉูปัช (Systemic lupus erythemaosis)
- มีประวัติกวหนาตัวมากกินของเยื่อนุ โพรงมอลูก (ดูด้านล่าง)
- โรคฉุมทัก

<u>เหตุผลที่ทำให้ตัดสนบูตการรักษากับที่</u> ควรหยุดการรักษาในกรณีที่พบข้อท้ามใช้และ ในสถานการณ์ดังค่อไปนี้: - ดีท่าน หรือการทำงานของตับแผ่ลง - กวามดันใลกิตเทิ่มสูงขึ้นอย่างมีหัยสำคัญ - มีอาการปาดศีรามะประเภทในเกรนเกิดขึ้นใหม่

ในสตรีที่มีมดลูกทำงานได้ปกติ มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ที่จะเป็นเยื่อนุโพรงมดลูกทำงานได้ปกติ มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น เพื่อะเป็นเยื่อนุโพรงมดลูกเท็บ เลี้ยาแบบสโตรเกนพียงอย่าง เดียวเป็นคร่วงระยะเวลาที่ยวงนน มีรายงานกามพื้นขึ้น ของความเสี่ยงก็จะเป็นมะเร็งเยื่อนุโพรงมดลูกในกลุ่น สตรีที่ให้รับออร์โมนเอร์เดือนที่ในที่ของอังเดือนที่เหลือนที่เหลือนที่เหลือนที่เหลือนที่เหลือนที่เหลือนที่ในที่รับออร์โมนเอร์เดียวกับเลือนที่ในให้รับออร์โมน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการรักหาและขนาดของสอร์โมน เลือนใสเลน (ดูเพิ่มเดิมในทัวเซ็ย 4.8) หลังจากหยุดการ รักษา ความเสี่ยงขางอังคงเท็มขึ้นเป็นเวลาอย่างน้อย เรื่อนที่ในให้เรื่อนที่เพิ่มในเกลาย่างน้อย เรื่อนที่ในให้เรื่อนที่เพิ่มเป็นเวลาอย่างน้อย เรื่อนที่ในให้เรื่อนที่ได้เพิ่มเป็นเวลาอย่างน้อย เรื่อนที่ให้เรื่อนที่ได้เพิ่มเป็นเวลาอย่างน้อย เรื่อนที่ในให้เรื่อนที่ได้เพิ่มเป็นเวลาอย่างน้อย เรื่อนที่ได้เพิ่มเป็นเวลาอย่างน้อย เรื่อนที่ได้เพิ่มเป็นเวลาอย่างน้อย

ในทางคลินิก การที่ฮอร์โมนเอสโครเจนถูก เมลาบอไซซ์เก็มมากั้นอาจทำให้หลในการรักษา ลดลง และลักษณะรูปแบบของเลือดที่ออกจาก โพรงนอลูกมีการเปลี่ยนเปลงไป

L6 ภาวะเจริญพันธุ์ การคั้งครรภ์ และการให้นม

นี้แแนะนำให้ใช้เอสโดรเฟน" ในระหว่างการ ซังครรภ์ หากเกิดดังครรภ์ในระหว่างที่ใต้รับการ รักษาด้วยเอสโดรเฟน" ให้หยุดยาทันที ผลการ ศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยาส่วนใหญ่อนถึงปัจจุบัน เกี่ยวกับการที่การกในครรภ์ใต้รับฮอร์โนน เอสโดรเจนโดยบังเอิญซึ่งให้เห็นว่าไม่มีผลทำให้

 ผลต่อความสามารถในการขับขึ้นละทำงานกับ เครื่องดักร <u>การให้นมบุตร</u> ไม่แนะนำให้ใช้เอสโตรเฟม[®] ในระหว่างที่ให้นมบุตร

อังไม่ทราบถึงผลของเอสโครเห่น‰ต่อลวามสามารถ ในการขับขี่และทำงานกับเครื่องจักร

4.8 ผลไม่พึ่งประสงค์

ประชมการณ์ทางคลินิก ในการศึกษาวิจัชทางคลินิก มีผู้ป่วยห้อยกว่าร้อยละ เอ ที่ เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากขา โดยเหตุการณ์ ไม่ทึงประสงค์ ที่มีวายงานหนบบ่อยที่สุดคือ กดเล็บที่ เด้านมีปวดเด้านม ปวดที่อง บวม และปวดศึรษะ รายการด้านล่างก็อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นใน การศึกษาวิจัชทางคลินิกในระหว่างที่ใส้รับการรักษา

พบบ่อย (Common): ≥ เ ใน เอย แต่ < เ ใน เอ ความคิดปกติกางจิดใจ: •ชีมเศร้า

ปกติทางระบบประสาท:

ปวดสีรมะ
 ปวดสีรมะ
 ปวดท้อง หรือคลั้นได้
 กวามผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้านเนื้อ และ เนื้อเชื่อเกี่ยาทีน:
 คะกลิวที่ยา
 ความผิดปกติของระบบสิบทันสูและเด้านม:
 กดเจ็บที่เก้านม เล้านมของชหญ่งใน หรือปวด เด้านม
 ความผิดปกติที่ว่าไป และสถาวะสรงสำแสน่งที่ใต้รับยา:

หนใน้บ่อย (Uncommon): ≥ 1 ใน 1,000 แต่ < 1 ใน 11 ลวามคิดปกติทางสา:

• มีความคิดปกติทางสา:

• มีความคิดปกติทางหลอดเลือด:

• มีลิ่มเลือด ในหลอดเลือดสำ

ความคิดปกติของระบบทางเดิบอาหาร:

• อาหารไม่ย่อย

• อกิงเงิด ทั้งเหรือ

ความคิดปกติของคับและทางเดินน้ำดี:

• นั่วในจุงน้ำดี

ความคิดปกติของสวาหนังและเบื้อเชื้อใต้สั้นที่วหนัง:

• ดิน หรือ ลมพิม

ประชาบการณ์หลังรับหน้ายผลิตภัณฑ์ขอกตลาย
นอกเหนือจากเหตุการณ์ในที่งประสงส์จากบาคามที่กล่าว
ให้ข้างด้านเล้ว อันมีเหตุการณ์ให้ที่งประสงส์จากบาคามที่กล่าว
ให้ข้างด้านเล้ว อันมีเหตุการณ์ให้ที่งประสงส์จากบาคามที่กล่าว
เรื่องกับการรักษาด้วยเอสโดรเห็น" หลุการณ์ให้ที่ง
ประสงส์จากบาทีมักรับเอสโดรเห็น" หลุการณ์ในที่ง
ประสงส์จากบาทีมักรับเอสโดรเห็น" หลุการณ์ในที่งานารณ์
ประมันให้จากข้อมูลที่มีอยู่) สำหรับประสบการณ์
หลังจำหน่ายหลิดภัณฑ์ขอกคลามในเวโน้มของการ
รายงากนัดสุการณ์ในที่งประสงค์ที่ไม่สำคัญและที่เป็น
ที่ทราบันเหตุการณ์ในที่งประสงค์ที่ไม่สำคัญและที่เป็น
ที่ทราบกันคิ ความถีนแสดงจะถูกแปลเลดกนล์จันที่ปะ
คามผิดปกติของระบบประสาทะ ในเกรามนีอาการ
แข่นง โรคาลอดเลือดสนาอง วิจวิณเสียงษะ จันแสร้า
อากมผิดปกติของสาทนังและเนื่อเขียงได้รับผิวหนัง:
เหล่าว