氢溴酸右美沙芬分散片说明书 请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

通用名称: 氢溴酸右美沙芬分散片

商品名称:

汉语拼音: 英文名称: Qingxiusuan Youmeishafen Fensanpian Dextromethorphan Hydrobromide Dispersible Tablets

成份】本品的主要成份为氢溴酸右美沙芬。

化学结构式: 化学名称: 3-甲氧基-17-甲基- (9α, 13α, 14 a) -吗啡喃氢溴酸

C18H25NO · HBr · H2O

本品为粉色片。 370.33

【适应症】 (规格】(用于干咳,包括上呼吸道感染(如感冒和咽炎) 支气管炎等引起的咳嗽。

用法用量 不良反应】 消化系统: 免疫系统: 精神障碍: 皮肤和皮下组织:皮肤过敏、 神经系统: 上市后监测发现使用氢溴酸石美沙芬口服单方制剂出现以下不良反应: (1) 5mg (2) 15mg 量】口服。成人一次15~30mg, 場ら、 嗜睡、头晕、头痛、眩晕、 多微功、视幻觉、精神错乱,这些不良反应在服用过量药物的情况下更加明显组织。反映过载、皮疹、荨麻疹、瘙痒、红斑、过敏性皮炎。 反应可自行消失,计量可引却抽土下法。 超敏反应和过敏反应, **岡**円、 食欲缺乏、 包括皮疹、 暖气、 无力、 - 日3~4次。 口干、腹部不适(如胃痛) 荨麻疹、水肿、 肌肉不自主收缩。

停药后上述反应可自行消失。 皮疹、荨麻疹、瘙痒、红斑、过敏性 过量可引起神志不清,支气管痉挛, 呼吸抑制。

2. 妊娠3个月內妇女、哺乳期妇女禁用。 1. 对氢溴酸右美沙芬或本药的任何其他成份过敏者禁用。

他酮等药物或服用这些药物停药不满两周的患者禁用。 【例本》 5-羟色胺再摄取抑制剂(如氟西汀、 阳罗西汀) 女非

用药7天,症状未缓解或病情加重,请咨询医师。 妊娠3个月以上孕妇慎用,过敏体质者慎用。

肝肾功能不全患者慎用。

患有持续性或慢性咳嗽、严重肺部疾病及咳嗽变异性哮喘的患者慎用。

CYP2D6基因多态性人群在服用本品之前应咨询医师。

正在服用館静刻,身体衰弱或卧床不起的患者,在服用本品之前应答询医师。 服药期间不得驾驶机、车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。

10. 9. 本品不能与含酒精的饮品同时服用。 机械作业及操作精密仪器。

本品性状发生改变时禁止使用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】妊娠3个月内妇女、哺乳期妇女禁用。妊娠3个月以上孕妇慎用。

一般情况下, 老年人生理机能下降, 需要适当减量。

太品 不須 二 当 时