# 数学分析公式结论总结 ——HYX\_v1.0

- 数学分析公式结论总结 ——HYX v1.0
  - § 0.常用公式表
    - 三角函数
      - 和差化积:
      - 积化和差:
      - 半角公式:
      - 倍角公式:
      - 万能公式:
      - 其他:
  - o § 1.数列极限
    - 调和-几何-算术平均值不等式:
    - 伯努利不等式:
    - 柯西不等式:
    - 二项式展开:
    - 因式分解:
    - 闵科夫斯基不等式(可以通过几何意义来记忆):
    - 结论:
    - 符号/定义:
    - 数列极限定义:
    - 数列极限的保序性(取0时为保号性):
    - 自然常数:
    - 六大定理关系:
    - 其他:
  - § 2.函数极限与连续

## § 0.常用公式表

### 三角函数

#### 和差化积:

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

#### 积化和差:

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin (\alpha + \beta) + \sin (\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin (\alpha + \beta) - \sin (\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos (\alpha + \beta) + \cos (\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos (\alpha + \beta) - \cos (\alpha - \beta)]$$

#### 半角公式:

$$\sin\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$$

$$\cos\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$$

$$\tan\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}$$

$$\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$$

#### 倍角公式:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$1 - \cos \alpha = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$\cot 2\alpha = \frac{\cot^2 \alpha - 1}{2 \cot \alpha}$$

$$\sec 2\alpha = \frac{\sec^2 \alpha + \csc^2 \alpha}{\csc^2 \alpha - \sec^2 \alpha} = \frac{\sec^2 \alpha \csc^2 \alpha}{\csc^2 \alpha - \sec^2 \alpha}$$

$$\csc 2\alpha = \frac{\sec^2 \alpha + \csc^2 \alpha}{2 \sec \alpha \csc \alpha} = \frac{\sec \alpha \csc \alpha}{2}$$

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

#### 万能公式:

$$\sin lpha = rac{2 anrac{lpha}{2}}{1+ an^2rac{lpha}{2}} \ \cos lpha = rac{1- an^2rac{lpha}{2}}{1+ an^2rac{lpha}{2}} \ an lpha = rac{2 anrac{lpha}{2}}{1- an^2rac{lpha}{2}}$$

#### 其他:

$$an lpha = rac{1}{\cot lpha}$$
  $\sin lpha = rac{1}{\csc lpha}$   $\cos lpha = rac{1}{\sec lpha}$ 

## § 1.数列极限

## 调和-几何-算术平均值不等式:

$$rac{n}{rac{1}{a_i}+rac{1}{a_i}+\cdots+rac{1}{a_i}} \leq \sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n} \leq rac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n} \quad (a_i>0, i=1,2,\cdots,n)$$

## 伯努利不等式:

$$(1+x)^n \geq 1+nx \quad (\forall x>-1, n\in \mathbb{N}^*)$$

### 柯西不等式:

$$(\sum_{i=1}^n a_i b_i)^2 \leq (\sum_{i=1}^n a_i^2)(\sum_{i=1}^n b_i^2)$$

### 二项式展开:

$$(a+b)^n=\sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$$

#### 因式分解:

$$a^{n} - b^{n} = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

### 闵科夫斯基不等式(可以通过几何意义来记忆):

$$(\sum_{i=1}^n (a_i+b_i)^2)^{rac{1}{2}} \leq (\sum_{i=1}^n a_i^2)^{rac{1}{2}} + (\sum_{i=1}^n b_i^2)^{rac{1}{2}} \ (\sum_{i=1}^n (a_i+b_i)^p)^{rac{1}{p}} \leq (\sum_{i=1}^n a_i^p)^{rac{1}{p}} + (\sum_{i=1}^n b_i^p)^{rac{1}{p}}$$

### 结论:

$$egin{aligned} &\lim_{n o\infty} n^{rac{1}{n}} = 1 \ &\lim_{n o\infty} rac{c^n}{n!} = 0 (c 
eq 0) \ &\lim_{n o\infty} rac{n^lpha}{c^n} = 0 (lpha > 0, c > 1) \end{aligned}$$

## 符号/定义:

- $\forall$ : 任意选取  $\exists$ : 存在 冒号: 满足的结论  $n!! = \begin{cases} 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots n & n \ mod \ 2 = 0 \\ 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots n & n \ mod \ 2 = 1 \end{cases}$
- 无穷小/无穷小量: 如果数列 $a_n$ 的极限为零,那么称数列 $a_n$ 为无穷小(量) 欧拉常数 $(\gamma)$ :  $1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n=\gamma+\epsilon(n),$  其中  $\lim_{n\to\infty}\epsilon(n)=0$ ; 即调和级数与自然对数的差值的极
- 上/下确界:  $sup E = \alpha, inf E = \beta$

### 数列极限定义:

$$\forall \epsilon > 0, \exists N(\epsilon) \in \mathbb{N}^*, \forall n > N : |a_n - a| < \epsilon$$

## 数列极限的保序性(取0时为保号性):

(1)设
$$\lim_{n o\infty}a_n=a, lpha< a,则存在 $N\in\mathbb{N}^*$ ,使得当 $n>N$ 时,有 $lpha< a_n$$$

(2)设
$$\lim_{n o\infty}a_n=a,\lim_{n o\infty}b_n=b$$
,且 $a< b$ ,则存在 $N\in\mathbb{N}^*$ ,使得当 $n>N$ 时,有 $a_n< b_n$ 

(3)设
$$\lim_{n o\infty}a_n=a,\lim_{n o\infty}b_n=b$$
,若存在 $N\in\mathbb{N}^*$ ,使得当 $n>N$ 时,有 $a_n\leq b_n$ ,则 $a\leq b$ 

#### 自然常数:

$$\lim_{n \to \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = \lim_{n \to \infty} (1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}) = e$$


$$\lim_{n \to \infty} (1 + \frac{k}{n})^n = e^k, \qquad \lim_{n \to \infty} (1 - \frac{k}{n})^n = e^{-k} \quad (k \in \mathbb{N}^*)$$

$$x_n = (1 + \frac{1}{n})^n \dot{\text{\text{#}}} \ddot{\text{\text{#}}} \ddot{\text{\text{#}}}, y_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1} \dot{\text{\text{#}}} \ddot{\text{\text{#}}} \ddot{\text{\text{#}}} \ddot{\text{\text{#}}}$$

$$(1 + \frac{1}{n})^n < e < (1 + \frac{1}{n})^{n+1} \iff n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 < (n+1)\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \iff \frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$$

$$\frac{k}{n+k} < \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) < \frac{k}{n}$$

#### 六大定理关系:



## 其他:

(1)对 $x \geq 0, y \geq 0, n \in \mathbb{N}^*$ ,有

$$(x+y)^n \geq x^n + y^n, \qquad (x^n + y^n)^{rac{1}{n}} \leq x + y \ (x+y)^{rac{1}{n}} \leq x^{rac{1}{n}} + y^{rac{1}{n}}, \qquad |x^{rac{1}{n}} - y^{rac{1}{n}}| \leq |x-y|^{rac{1}{n}}$$

(2)

$$\lim_{n\to\infty}\left(a_1+a_2+\cdots+a_n\right)=s\Rightarrow \lim_{n\to\infty}\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}=0$$

(3)

$$n<\sqrt{(n-1)(n+1)}\Rightarrow rac{(2n-1)!!}{(2n)!!}<rac{1}{\sqrt{(2n+1)}}\quad (n\in\mathbb{N}^*)$$

(4)

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{2^{\alpha}} + \dots + \frac{1}{n^{\alpha}}\right) = \begin{cases} \overline{\Lambda} & \alpha = 1 \\ \overline{\rho} & \alpha > 1 \end{cases}$$

## № 2.函数极限与连续