内尺寸(Inner dimension) 外尺寸(Outside dimension) 制造尺寸(Manufacture dimensions) 材质(Material)

厚度(Thickness) 出血线 =====

匹林胶囊

[50]

国药:77777

140(L)X30(W)X100(H) mm 141(L)X31(W)X102(H) mm 140.6(L)X30.6(W)X101.1(H) mm 白卡纸 0.5mm

切割线 🚃

备注(Remark) 盒形代码(Box No.) 展开面积(Design Area) 表面工艺(Membrane)

折叠线 ====

100010 357.9mm X 201.3mm

无

ASPIRIN CAPSUL

阿司匹林胶囊 ASPIRIN CAPSULE

100mg救

(注题等型) 四月茶品不能回5%。通约出數成少插集在評据之即設置每在 其代,即就是指字用了似层之限。进后开版:其次經形次。同可可分 建設在,而上乙醛是代方乙醛,即與存近乙醛基於,資金學來維衍 股环波形。

ASPIRIN CAPSULE 阿司匹林胶囊

阿司匹林胶囊

ASPIRIN CAPSULE

国药:77777

阿司匹林胶囊

ASPIRIN CAPSUL

真独林迅信回 **ASPIRIN CAPSULE**

100mgk

(注意事項) 即匹特和否能同时%。通的主要成分语稱在肝脏乙醇胺氮结件用"产"点子。 再在乙醛脱氢的作用下宽成乙酰,进而生成一氧化碳和水。同可匹补 應信用量 氢酶活性,阻止乙醛氧化为乙酸,导致体内乙醛堆积,使全身疼痛的(5解热、循痛,一次0.3~0.6g,一日3次,必要时每4/1站打次。 6万元级第一日3~5g(该在风部用可用等),分次囚服。 6万元级第一日3~5g(该在风部用可用等),分次囚服。 60年期间小板聚集,尚不是所谓,多数主张应用小型制,如50~ 150年9。 60年间小板聚集,尚不明确用量,多数主张应用小型制,如50~ 150年9。 60年间小板聚集,一次1g,一日2~2次,连用2~3日;降发性 作用程。可可应体征标准上被广为用于发热、头痛、神经痛、则或 60年间加速超电痛,一次1g,一日2~2次,连用2~3日;降发性 作用器性关节与等的形式。

ASPIRIN CAPSULE 阿司匹林胶囊

阿司匹林胶囊

ASPIRIN CAPSULE

