

I. LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES OBJET DE RESTRICTION

1. INSECTICIDES

(IMPORTATION UNIQUEMENT POUR LES CAMPAGNES NATIONALES)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	USAGE
01	Diméthoate	400 g/L	EC	Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les campagnes nationales (Oliviers,..)(date d'effet:13/07/2023)
02	Imidaclopride	200 g/L	SL/OD	Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les campagnes nationales (charançon rouge,..)(date d'effet:13/07/2023)
03	Malathion	95%	ULV	Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les campagnes nationales (Agrumes,..)(date d'effet:13/07/2023)
		500 g/L	EC	

2. INSECTICIDES HOMOLOGUES STRICTEMENT REGLEMENTES

(UTILISATION UNIQUEMENT POUR LES TRAITEMENTS DES SEMENCES)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
01	Imidacloprid+Tebuconazole	208.98 g/l +12.8 g/l	FS	GIZMO SUPER FS	F.018-18	AGRIPROTEC	NUFARM	Blé : Carie & charbon, Fusariose: 250 cc/qt Traitement des semences (Traitement des semences; Nbre de traitement : 1 calendrier des applications : avant semis;(COMM 18/10/2018) Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les Traitement des semences (date d'effet:13/07/2023)(comm 25 juin 2025)
02	Thiamethoxam	350 g/L	FS	ADAGE 350FS	I.013-18	SOLAGRI	SYNGENTA	P.de terre : Insectes du sol : 20 ml/100 Kg de semences(Trempage) Blés : Insectes du sol : 100 ml + 600 à 800 ml d'eau/Quintal de semences (Enrobage) (COMM18/10/2018) Restriction d'usage:Utilisation uniquement pour les traitements des semences(date d'effet 13/07/2023)
03	Thiametoxam	350 g/L	FS	Cruiser 350 FS	I.124-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	P.de terre : Insectes du sol : 20 ml/100 Kg de semences (Trempage) Blés : Insectes du sol : 100 ml + 600 à 800 ml

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								d'eau/Quintal de semences (Enrobage) Restriction d'usage:Utilisation uniquement pour les traitements des semences(date d'effet 13/07/2023)
04	Difenoconazole + Fludioxonil +Thiamethoxam	25g/l + 25 g/l + 262.5 g/l	FS	CelestTop 312.5	126-11/21 F.	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Semences de blé : Maladies transmissibles par semences de Blés (Carie, Charbon, Septoriose, Fusarium) : 150 ml+ 600à800ml d'eau/quintal. Semences de céréales : Traitement de semences : protection foliaire contre les pucerons la dose de 150 ml + 600à800ml d'eau/quintal. Restriction d'usage:Utilisation uniquement pour les traitements des semences(date d'effet 13/07/2023)
05	Difenoconazole + Metalaxyl –M + Thiamethoxam	20 g/kg+200 g/kg+200g/kg	WS	APRON STAR WS	FL028-22	COTUGRAIN	SYNGENTA	Semences des féveroles: Anthracnose, Pythium, Fusarium spp, Mildiou, Ver blanc, Bruches:250 g/100 kg de semences par enrobage. (COMM 08/06/22) Restriction d'usage:Utilisation uniquement pour les traitements des semences(date d'effet 13/07/2023)

3. FONGICIDES

(IMPORTATION UNIQUEMENT POUR LES CAMPAGNES NATIONALES)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	USAGE
01	Mancozèbe	80%	WP	Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les campagnes nationales(CBS Agrumes,...)(date d'effet:13/07/2023)

4. FONGICIDES HOMOLOGUES STRICTEMENT REGLEMENTES (UTILISATION UNIQUEMENT POUR LES LEGUMINEUSES)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
01	Chlorothalonil	720 g/l	SC	Morfus 720 SC	F.014-14/24	SANABEL AGRO	ROTAM AGROCHEMIC AL(rivale)	Fève : Anthracnose : 200 cc/hl; Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les légumineuses (date d'effet:13/07/2023) (comm 22 mai 2024)
02	Chlorothalonil	500g/l	SC	AVOCA	F.004-20	RAYEN AGRICOLE	Barclay chemicals(R&D) Ltd.	Féverole: Anthracnose(Aschochytafabae): 3L/ha (300 l/ha) (COMM13//02/2020) Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les légumineuses (date d'effet:13/07/2023)
03	Chlorothalonil	720 g/L	SC	Banko 720 SC	F.013-11/21	BIOPROTECTION	UPL/ARYSTA LIFESCIENCE	Fèves : Anthracnose : 200 cc/hl Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les légumineuses (date d'effet:13/07/2023)
04	Chlorothalonil	720 g/L	SC	TERRAVO	F.010-20	SOLAGRI	SYNGENTA	Fèves : Anthracnose : 200 cc/hl Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les légumineuses (date d'effet:13/07/2023)
06	Chlorothalonil +Tebuconazole	250 g/l+90 g/l	SC	SUPER PLAZMA SC	F.55-21	AGRIPROTEC	NUFARM	Féverole : Rouille, Anthracnose : 1.5 l/ha(COMM09/02/21) Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les légumineuses (date d'effet:13/07/2023)
07	Tébuconazole +Chlorothalonil	125 g/l+375 g/l	SC	CIGAL PLUS SC	F.008-18	SANABEL AGRO	RotamAgrochemicalCo.Ltd	Féverole: Rouille : 1 l/ha (Pulvérisation foliaire; Préventif et curatif;300 l de bouillie/ha (COMM 18/10/2018) Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les légumineuses (date d'effet:13/07/2023)

LISTE DES PRODUITS PESTICIDES A USAGE AGRICOLE HOMOLOGUES

Version actualisée 16 juillet 2025

* = = *

I. INSECTICIDES

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
01	(E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecadien -1-yl acetate(53.8 mg/diffuseur) (E,Z)-3,8 –Tetradecadien -1-yl acetate(6.2 mg/diffuseur)	60 mg /dispensers	VP	SHIN –ETSU MD T	I.014-22	COTUGRAIN	Shin ETSU chemical/ CBC (EUROPE)/BIOGARD	Tomate sous serre :Tutaabsoluta :1000 diffuseurs/ha(100 diffuseurs/1000 m2) Une persistance d'action de: -110-120 jours au printemps-été. -150-160 jours en automne-hiver (COMM 08/06/22)
02	Abamectin	18 g/l	EC	ABAMET EC	I.33-25	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD CHINE	Tomate sous serre: Acariens rouges <i>Aculops lycopersici</i> :75 ml/hl Volume de bouillie:400-500 l/ha Nombre d'application :02 applications espacés de 2 semaines Le produit est efficace contre les œufs et les formes mobiles des acariens (Comm 16/07/2025)
03	Abamectin	18 g/l	EW	BUTIK EW	I.21-25	RAYEN PHYTAGRI	LAINCO-Espagne	Palmiers dattier Acariens « Oligonychus afrasiaticus » : Acaricide spécifique de contact et d'ingestion 60 ml /hl d'eau(Comm 25/06/2025)
04	Abamectine	18 g/L	EC	Numectin	I.A.009-16	MULTAGRI	NUFARM	Agrumes :Acariens : 60cc/hl Palmiers dattier Acariens « Oligonychus afrasiaticus » : 60 cc/hl Volume de bouillie:1000l/ha Traitement curatif Nbre d'app:01 Calendrier des app: début de l'attaque DAR:10 jours

								Le produit a un effet limitant des populations d'O.afraasiaticus pour les formes mobiles et les formes œufs 21 jours après le traitement. (Comm 25/06/2025)
05	Abamectine	18 g/L	EC	LAOTTA	03-24.I	ATLAS AGRICOLE	LAINCO	Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasiaticus " :60 cc/hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024) Agrumes :Mineuse des agrumes (Phyllocnistris citrella):40 ml du produit+400 ml huile minérale -volume de bouillie :2000 l/ha -nbre max d'application:3 DAR :10 jours Le produit est efficace contre les larves de la mineuse des agrumes, l'efficacité est observée à partir du 3^{ème} jour et elle dure 14 jours. (Comm 25/06/2025)
06	Abamectine	84 g/L	SC	Agriec Gold 084 SC	I.A.129-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Agrumes :mineuse: 15 cc/hl (pas moins de 125 cc/ha) + 400 cc huile/hl; Agrumes : Acariens:15 cc/hl (pas moins de 125 cc/ha); Poirrier : Psylle : 20 cc/ hl ; Pommiers : Acariens:15 cc/hl (pas moins de 125 cc/ha) Palmier dattier:Acariens des dattes(Oligonychusafrasiaticus):15 ml/hl en Traitement curatif (APV ; COMM 08/06/22)
07	Abamectine	20g/l	SC	TERVIGO 020 SC	IN.001-19	BIOPROTECTION	Syngenta Crop Protection AG	Tomate : Nématode "Meloidogynespp": 2 App au sol par saison (2*4 l/ha); Melon :Nématode "Meloidogynespp": 2 App au sol par saison (2*3 l/ha)I;(COMM 23/04/2019)
08	Abamectine	18g/l	EC	VALMEC EC	I.004-19	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAU GH EUROPE SARL	Tomate : Acariens "Tetranychus urticae":75 cc/hl -Pulvérisation foliaire (action : translaminare) : dés la détection du parasite sur feuilles -2ème application après 02 semaines - Effet d'écotoxicité inacceptable pour le prédateur Phytoseiulus persimilis Agrumes :Mineuses des feuilles:40 cc +400cc huile d'été/hl -Pulvérisation foliaire : deux app espacées de 15 à 21j pour obtenir une meilleure efficacité L'efficacité de produit s'étale sur 7 à 10 jours (COMM 23/04/2019)

								Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :75 cc/Hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
09	Abamectine	18 g/l	EC	ROMECTIN EC	I.02-21	AGRONOMIC LAND	ROTAM CHEMISTRY CO.,Ltd	Agrumes :Acariens(TetranychusUrticae) : 25 ml/100 l -Pulverisation foliaire -le produit présente un effet toxique significatif sur les prédateurs respectivement aux 14ème et 21ème jours après traitement.(COMM09/02/21)
10	Abamectine	18 g/l	EC	VARGAS ULTRA EC	I.51-23	SOLAGRI	ROTAM CHEMISTRY CO.,Ltd/ALBAUG H	Agrumes :Acariens(TetranychusUrticae) : 25 ml/100 l -Pulverisation foliaire -le produit présente un effet toxique significatif sur les prédateurs respectivement aux 14ème et 21ème jours après traitement.(COMM09/02/21)*COMM28 dec2023)
11	Abamectine	18 g/l	EC	Vertimec	IA.003-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Tomate et Pommier : Acariens 75 cc/hl + Mouillant Fraisier : Acariens: 75 cc/hl Poirier : Psylle : 75 cc/hl Agrumes : Acariens : 60 cc/hl Tomate s/s chauffées : Mouches mineuses: 30cc/hl Agrumes : Mineuses : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Palmier dattier :Acariens des dattes(Oligonychusafrasiaticus):60 ml/hl en Traitement curatif (COMM 08/06/22)
12	Abamectine	18 g/L	EW	Diva 1.8 EW	I.A.002-15/25	EL MOUSSEM AGRICOLE	CHEMINOVA	Pommier : Acariens : 75 cc/hl Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :60 cc/Hl Nbre max de traitement: 03 Période de traitement: curatif Calendrier des applications: début d'attaque des formes mobiles d'acariens avec intervalle de 7 à 10 jours Pas plus de 2 traitements consécutifs Alterner avec des acaricides appartenant à des familles chimiques différentes Persistance d'action:3-6 semaines DAR:14 jours LMR:0.01 AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)(comm 25/06/2025)

13	Abamectine	18 g/L	EW	ZORO	I.30-25	SSCC	CHEMINOVA/ FMC	Pommier : Acariens : 75 cc/hl Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :60 cc/Hl Nbre max de traitement: 03 Période de traitement: curatif Calendrier des applications: début d'attaque des formes mobiles d'acariens avec intervalle de 7 à 10 jours Pas plus de 2 traitements consécutifs Alternier avec des acaricides appartenant à des familles chimiques différentes Persistance d'action:3-6 semaines DAR:14 jours LMR:0.01(COMM 25/06/2025)
14	Abamectine	18 g/l	EC	ACTROSE 18 EC	I.015-18	Ets MEZGHANI	ASTRACHEM	Poirier : Psylle : 75 cc/hl Agrumes : Acariens : 60 cc/hl Tomate s/s chauffées : Mouches mineuses: 30cc/hl Agrumes : Mineuses : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl (COMM 18/10/2018)
15	Abamectine	18 g/l	EC	TINA EC	IA.005-11/21	ETS MEZGHANI	INDUSTRIAL QUIMICA KEY	Poirier : Psylle : 75 cc/hl Agrumes : Acariens : 60 cc/hl Tomate s/s chauffées : Mouches mineuses: 30cc/hl Agrumes : Mineuses : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl(COMM 18/10/2018)
16	Abamectine	18 g/l	EC	MECTINE PRO	I.006-17	JADWA AGROTEC	AAKO BV	Poirier : Psylle : 75 cc/hl; Agrumes : Acariens : 60 cc/hl; Tomate s/s chauffées : Mouches mineuses: 30cc/hl Agrumes : Mineuses : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl (COMM 20/06/2017)
17	Abamectine	18 g/l	EC	Potenza 1.8	IA.007-11/21	SANABEL AGRO	SINON CORPORATION	Poirier : Psylle : 75 cc/hl; Agrumes : Acariens : 60 cc/hl; Tomate s/s chauffées : Mouches mineuses: 30cc/hl; Agrumes : Mineuses : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :60ml/Hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
18	Abamectine	18 g/l	EC	Aakomectine	IA.009-11/21	STEC	AAKO BV	Poirier : Psylle : 75 cc/hl; Agrumes : Acariens : 60 cc/hl; Tomate s/s chauffées : Mouches mineuses: 30cc/hl; Agrumes : Mineuses : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl

19	Abamectine	18 g/l	EC	Transact 18 EC	I.A.161-11/21	TASMID	ASTRACHEM	Poirier : Psylle : 75 cc/hl; Agrumes : Acariens : 60 cc/hl; Tomate s/s chauffées : Mouches mineuses: 30cc/hl; Agrumes : Mineuses : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl
20	Abamectine	1.8%	EC	LAINSECT EC	I.06-25	FERTITECH	LAINCO	Agrumes : Mineuse des agrumes (<i>Phyllocnistis citrella</i>):40 cc/hl Volume de bouillie :2000 l -la première application doit être effectuée au début du développement des pousses ou pendant le développement des fruits -intervalle d'application:7 jours -fréquence d'application: maximum 3 fois par saison -méthode d'application: par pulvérisation foliaire DAR:10 jours Le produit est efficace contre les larves de la mineuse des agrumes, l'efficacité est observée à partir du 3^{ème} jour et elle dure 7 jours. (Comm 25/06/2025)
21	Abamectin + Chlorantraniliprole	1,7% + 4,3 %	SC	CORAG DUO SC	25-37.I	ATLAS AGRICOLE	NANJING(HEBEI GUANGLONG AGROCHEMICALS)	Tomate sous serre: <i>Tuta absoluta</i> : 60 cc/hl Nombre d'application : Max 2 applications par cycle DAR 7 Jours Le produit est efficace contre les œufs et larves de <i>Tuta absoluta</i>. (Comm 16/07/2025)
22	Abamectin +Chlorantraniliprole	18 g/l+45 g/l	SC	Cleverole plus SC	I.14-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE : (<i>Tutaabsoluta</i>):50 ml/hl 1 application Volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 28/12/2023)
23	Abamectin +Chlorantraniliprole	18 g/l+45 g/l	SC	ABAROLE SC	I.13-24	PLANETE VERTE	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE : (<i>Tutaabsoluta</i>):50 ml/hl 1 application Volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 22/05/24)
24	Abamectin +Etoxazole	42 g/L + 168g/L	SC	BOSCOTT SC	I.34-25	BIOPROTECTION	ALBAUGH	Tomate sous serre: Acariens rouges <i>Aculops lycopersici</i> :10 ml/hl Soit 100 ml/ha Volume de bouillie:1000 l Stade d'app: dès l'apparition du ravageur DAR:03 jours Le produit est efficace contre les œufs et les formes mobiles des acariens.

								(Comm 16/07/2025)
25	Abamectin +Spirotetramat	4%+ 24%	SC	SPERAMET PLUS SC	I.17-25	SOLAGRI	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD CHINE	Agrumes : Cochenille « pou rouge de californie <i>A. aurantii</i> » :50 ml/hl -2 applications -volume de bouillie:900-1000 l/ha Le produit est efficace contre <i>A. aurantii</i> l'efficacité a été observée à partir du jour 14 .l'efficacité s'est maintenue jusqu'au jour 21. (COMM 25/06/2025)
26	Abamectine +spinosad	3%+ 2%	EW	REVINTY 5 EW	I.35-23	PROMOCHIMIE	JIANGXI ZHENG BANG CHINE/NANJING	TOMATE SOUS SERRE : Acariens rouges :75 cc/hl Appliquer le produit pendant tout le cycle Nbre max d'application :2 DAR:07 jours (COMM 28/12/2023)
27	Abamectine +Spirotetramat	4% + 24%	SC	TITONIC SC	25-48.I	PROTAGRI	NANJING AGROCHEMICAL	Tomate sous serre : Mouche blanche <i>Bemisia tabaci</i> :35 cc/hl Max 02 app/saison DAR 10 j <u>Autorisation Provisoire de vente APV</u> (Comm 16/07/2025)
28	Abamectine+spirotetramat	4% + 24%	SC	FLEXINE SC	25-54.I	NEGANOR FFT	HEBEI VEYONG BIO HEMICAL(fab/N ANJING/dis)	Tomate sous serre: Mouche Blanche <i>Bemisia tabaci</i> : 40 ml/hl (0.4l/ha) Volume de bouillie:1000 l/ha Application foliaire en préventif et curative Nbre d'app:2 app /cycle Intervalle d'app:10 jours DAR:10 jours Le produit est efficace contre les œufs, les larves, les pupes et les adultes de <i>Bemisia tabaci</i> APV (Comm 16/07/2025)
29	Acetameprid	70%	SP	ACETADE FORT	I.009-17	SANABEL Agro	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Agrume: Mineuse: 40g/100 l (COMM du 20/06/2017)
30	Acetameprid	70%	SP	Polysect	I.004-16	SOCOOPEC	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Agrume:Mineuse :40g/100 l
31	Acetamiprid	200 g/kg	SP	POtegon 20 SP	I.22-23	PLANETE VERTE	ASTRANOVA	TOMATE SOUS SERRE :Mouche blanche (<i>Bemisiatabaci</i>) :30 g/100 l DAR:03 jours (COMM 28/12/2023)

32	Acetamiprid	20%	SL	CAPILAN SL	I.07-25	NEGANOR	AGROW ALLIED	Agrumes :Mineuse des agrumes (<i>Phyllocnistris citrella</i>): 30 cc/hl Volume de bouillie :1000 l/ha -Traitement foliaire -Stade d'application: appliquer lorsque le niveau du ravageur au stade larvaire est maximal (dès l'apparition des mines),sur les nouvelles pousses printanières -Nbre d'app:4 applications au max -Durée entre les applications:03 jours -DAR: 14. Jours le produit est efficace contre les larves de la mineuse des agrumes, l'efficacité est observée à partir du 3^{ème} jour et elle dure 14 jours. (Comm 25/06/2025)
33	Acetamiprid	72.5%	WG	ACEGOALXTRA WG	I.08-25	NEGANOR FFT	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD CHINE	Agrumes : Mineuse des agrumes (<i>Phyllocnistris citrella</i>): 40 g/hl Nombre d'application :1 application Volume de bouillie:900-1000 l/ha Le produit est efficace contre les larves de la mineuse des agrumes, l'efficacité est observée à partir du 3^{ème} jour et elle dure 14 jours. (Comm 25/06/2025)
34	Acetamiprid	20%	SP	EKKA SP	I.14-25	FERTIPLANT	KR Lifesciences Pvt Ltd	Agrumes:Puceron (<i>aphis spp</i>) :100 cc/ha Traitement foliaire:2-3 Volume de bouillie:800-1000 l/ha Tems d'attente 15-21 j Le produit est efficace contre les pucerons, l'efficacité est observée à partir du 3^{ème} jour et elle dure 21 jours.(Comm 25/06/2025)
35	Acétamiprid	200 g/l	SL	TRISTAR SL SR/Changement de nom	I.44-25	ATLAS INDUSTRIE	NUFARM	Agrumes : Mineuse des agrumes (<i>Phyllocnistris citrella</i>) :35 cc/hl Application du BBCH 71-89 DAR:30 jours Le produit est efficace contre les larves de la mineuse des agrumes, l'efficacité est observée à partir du 3^{ème} jour et elle dure 14 jours. (Comm 25/06/2025) Tomate sous serre: mouche blanche Bemisia tabaci : 50 cc/hl Application BBCH 10-89 DAR:07 jours Le produit est efficace contre les œufs, les larves, les pupes et les adultes de Bemisia tabaci.

								(APV Comm 16/07/2025)
36	Acetamiprid + Flonicamid	15% + 20%	WG	FLOWPRID WG	L31-25	NEGANOR FFT	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	Piment sous serre: Pucerons <i>Aphis gossypii</i>: 22 g/hl Volume de bouillie:400-600 l/ha Nombre d'application :01 application (Comm 16/07/2025)
37	Acetamiprid + Flonicamid	15% + 20%	WG	ACTAMID WG	25-51.I	TASMID	NANJING AGROCHEMICA L Co., Ltd.	Tomate sous serre: Mouche Blanche <i>Bemisia tabaci</i> : 150 g/ ha Le produit est efficace contre les œufs, les larves, les pupes et les adultes de <i>Bemisia tabaci</i>. APV (Comm 16/07/2025)
38	Acetamiprid + Eamectin Benzoate	218 g/l + 37 g/l	DC	TRAMICS DC	25-39.I	SOLAGRI	SYNGENTA	Tomate sous serre: <i>Tuta absoluta</i>: 350 ml/ha 1 application -Stade: BBCH 21 to BBCH 89 Le produit est efficace contre les œufs et larves de <i>Tuta absoluta</i> Tomate sous serre: Mouche blanche <i>Bemisia tabaci</i> : 350 ml/ha 1 application -Stade: BBCH 21 to BBCH 89 Le produit est efficace contre les œufs, les larves, les pupes et les adultes de <i>Bemisia tabaci</i>. <u>Autorisation provisoire de vente</u> APV (Comm 16/07/2025)
39	Acetamiprid +pyriproxifen	186 g/l+124 g/l	DC	CANVION310 DC	L032-22	COTUGRAIN	Syngenta Crop Protection	Agrumes: cochenilles farineuses:40 ml/hl Appliquer le produit après la floraison lorsque la surveillance des cultures indique le début de sortie des larves mobiles. Ne pas appliquer sur des populations bien établies ou des insectes adultes matures dominant la population . Si nécessaire , une deuxième application supplémentaire peut être faite 23 jours après la première. Appliquer par pulvérisation foliaire, jusqu'au point de ruissellement, en assurant une couverture complète. Volume d'eau:1000-2000L/ha Ne pas dépasser 1.6L de produit par hectare en une seule application. (com 27/12/22)

40	Acetamipride	200 g/L	SL	Escort 20 SL	I.010-11/21	BIOPROTECTION	UPL/(NIPPON SODA)ARYSTA LIFESCIENCE	Agrumes : Mineuses : 30cc/hl (pulvérisation foliaires), Arbres âgés de moins de 4ans : 1 à 2 ml/ arbre (badigeonnage du tronc). Cultures sous serres : Mouches blanches: 50 cc/hl. Pommier, Agrumes : Pucerons: 12,5 cc / hl Fraisiers : Thrips : 40 cc/hl
41	Acetamipride	200 g/L	SL	Mospilan 20 SL	I.011-11/21	SEPCM	(NIPPON SODA) ARYSTA LIFESCIENCE /UPL	Agrumes : Mineuses : 30cc/hl (pulvérisation foliaires), Arbres âgés de moins de 4ans : 1 à 2 ml/ arbre (badigeonnage du tronc). Cultures sous serres : Mouches blanches: 50 cc/hl. Pommier, Agrumes : Pucerons: 12,5 cc / hl Fraisiers : Thrips : 40 cc/hl
42	Acetamipride	200 g/l	SL	DEPOT SL	I.037-22	PROTAGRI	MODERN INSECTICIDES LIMITED	Piment : Mouches blanches(Bemiiatabaci): 50 cc/hl Appliquer par pulvérisation à l'aide d'un appareillage conventionnel pour l'agriculture. -pulvérisation foliaire -traiter dès l'apparition des foyers. -DAR:7 jours(plein champ) DAR:3 jours (sous serre) (com 27/12/22)
43	Acrinathrine	75 g/L	EW	Orytis	I.135-11/21	ATLAS AGRICOLE	CHEMINOVA	Tomate de plein champs : Acariens : 60 cc/hl Olivier : Acariens Eriophydes : 60 cc/hl Pommier : Acariens : 60 cc/hl Pêcher : Thrips: 60 cc/hl (COMM23/04/2019)
44	Acrinathrine	75 g/L	EW	Rufast 7,5 EW	A.013-11/21	EL MOUSSEM AGRICOLE	CHEMINOVA	Tomate de plein champs : Acariens : 60 cc/hl Olivier : Acariens Eriophydes : 60 cc/hl Pommier : Acariens : 60 cc/hl Pêcher : Thrips: 60 cc/hl (COMM 18/10/2017) Palmiers dattier Acariens «Oligonychus afrasiaticus » :60 cc/hl Nbre max de traitement: 02 Période de traitement: curatif Calendrier des applications: début d'attaque des formes mobiles d'acariens avec intervalle de 7 à 10 jours Pas plus de 2 traitements consécutifs Alterner avec des acaricides appartenant à des familles chimiques différentes Persistance d'action:3-5 semaines DAR:14 jours LMR:0.02 Le produit a un effet limitant des populations d'O.afrasiaticus pour les formes mobiles et les formes œufs 21 jours après le traitement.

								(Comm 25/06/2025)
45	Acrinathrine +Abamectine	22.5 g/l+12.6 g/l	EW	TRIPSOL EW	I.010-19	AGROSYSTEME	Cheminova/fmc	Fraisiers: Thrips: 75cc/hl (l'efficacité de produit est de 07 jours au maximum); (COMM 23/04/2019)
46	Afidopyropen	100 g/l	DC	VERSYS DC	HOMOLOGATI ON I.30-23	AGRIPROTEC	BASF	TOMATE SOUS SERRE : Mouche blanche (<i>Bemisiatabaci</i>):35 cc/hl POIVRON SOUS SERRE : Mouche blanche (<i>Bemisiatabaci</i>):35 cc/hl Volume de bouillie :1000 l/ha Application foliaire Application dès les premières infestations Nbre d'app:4 Intervalle d'app:7-14 jours DAR:0 jours COMM 28/12/2023) (comm 22 mai 2024)
47	Alphacypermethrine	100 g/l	EC	ALPHATOP EC	I.39-23	SLDA	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	TOMATE SOUS SERRE : Noctuelles : 15 cc/hl Application foliaire 1 à 2 traitements alternés par cycle de culture. Traiter dès l'observation des premiers symptômes Durée de protection :5 à 7j suivant le degré d'attaque et les conditions climatiques (COMM 28/12/2023)
48	Alphacypermethrine	100 g/l	EC	REMAX EC	I.10.24	FERTITECH	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	TOMATE SOUS SERRE : Noctuelles : 15 cc/hl Application foliaire 1 à 2 traitements alternés par cycle de culture. Traiter dès l'observation des premiers symptômes Durée de protection :5 à 7j suivant le degré d'attaque et les conditions climatiques (COMM 22/05/2024)
49	Alphacypermethrine	100g/l	EC	ALLIGATOR	I.42-23	SSCC	GHARDA CHEMICALS LTD	TOMATE SOUS SERRE : Noctuelles : 15 cc/hl (COMM 28/12/2023)
50	Alphaméthrine	100 g/L	EC	Bonbard	I.176-11/21	COTUGRAIN IMPEX	BASF	Betterave : Casside : 60 cc/hl Tomate : Noctuelles : 15 cc/hl Poirier : Psylle : 50 cc/hl Arbres fruitiers à pépins : Carpocapse : 30 cc/hl
51	Azadirachtin	1%	EC	BIO-AZA EC	25-40.I	EL KHADRA	CROPSAFE PESTICIDES INDIA PRIVATE LIMITED/INDE	Tomate sous serre: Tuta absoluta : 400 cc/hl Pulvérisation foliaire Différents stades Volume de bouillie 800-100 l/ha DAR : 03 jours Nbre d'application/saison : 2-3

								Le produit est principalement efficace contre les larves de <i>Tuta absoluta</i> . APV (Comm 16/07/2025)
52	Azadirachtine	32 g/L	EC	OIKOS MAX	I.004-20	EL KHADRA	SIPCAM INAGRA	Piment, Tomate : Mouches blanches : 100 cc/hl Agrumes : Mineuses : 60 cc/hl Fraisiers : Thrips : 150 cc/hl Tomate :TutaAbsoluta :150 cc/hl; (COMM13/02/2020)&(COMM09/02/21)
53	Azadirachtine (0,03 %) + huile de neem	0 ,3 g/L+90,5%	EC	Nimbicidine	I.160-11/21	TASMID	T. STANES &Co.Ltd.	Tomate : Tuta Absoluta à la dose de 250 CC/HL Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :250 cc/hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
54	Bacillus thuringiensis	16x106I.U/g	SC	BELTHIRUL 16SC	I.09-21	AGRIPROTEC	PROBLETE	Tomate : Mineuse (Tutaabsoluta) :200 cc/hl(1000 l/ha) pulvérisation foliaire- -appliquer de préférence à l'observation des premières larves et essayer de bien mouiller toute la végétation. -nbre max :2 -stade d'applications: appliquer durant tout le cycle espacé de 7 à 14 jours.(COMM09/02/21)
55	Bacillus thuringiensis	32000UI/mg	WG	Delfin WG	I.131-11/21	AGROSYSTEMES	CERTIS	Tomate :Tutaabsoluta : 250 g/hl
56	Bacillus thuringiensis (spKurstaki),souche ABTS-351	32000UI/mg	WG	BACTOSPEINE DF	I.017-19	SEPCM	VALENT BIOSCIENCE CORPORATION/s umitomo chemical	Citronnier : Teigne : 75 g/hl (750g/ha); -Traitement parties aériennes sur jeunes stades larvaires; -Deux applications espacées de 07 à 10jours; (COMM23/04/2019) TOMATE : Noctuelles :75 g/hl (750g/ha) Traitement parties aériennes sur jeunes stades larvaires 02 applications ,Renouveler tous les 07-10j (COMM 28/12/2023)
57	Bacillus thuringiensis (spKurstaki),souche ABTS-351	16000UI/mg	WP	touta stop WP	I.025-11/21	etsmezhani	industrialquimica key	Tomate :Tutaabsoluta : 450 g/hl(COMM09/02/21)
58	Bacillus thuringiensis kurstaki	3200 UI/mg	WP	HALT WP	I.47-23	NEGANOR	BIOSTADT INDE	TOMATE : Noctuelles :50 g/hl Volume de bouillie:1000 l/ha Traitement des parties aériennes sur les jeunes stades larvaires Max 03 applications Min intervalle entre appm7 jours DAR: non requis (COMM 28/12/2023)
59	Bacillus thuringiensis subsp-	375 g/kg	WP	LEPINOX	I.019-22	COTUGRAIN	CBC	Tomate sous serre :Tuta absoluta:1 kg/ha

	kurstakissouche EG-2348			PLUS WP			(EUROPE)/BIOGARD	Volume de bouillie:500-1000 l Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur conventionnel et s'assurer de la couverture de l'ensemble des parties aériennes par le produit Appliquer le produit dès la présence des premiers oeufs et larves (stade L1-LII) Répéter l'application tous les 7 à 10 jours pendant la période de ponte Nbre d'applications:3 par saison. (COMM08/06/22) TOMATE : Noctuelles :1 kg/ha Volume de bouillie :500-1000 l Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur conventionnel et s'assurer de la couverture de l'ensemble des parties aériennes par le produit Appliquer le produit dès la présence des premiers œufs et larves (stade L1-LII) Répéter l'application tous les 7 à 10 jours pendant la période de ponte Nbre d'applications :3 par saison (COMM 28/12/2023)
60	Beauveria bassiana strain ATCC 74040	0.0185 %W/W)	OD	Naturalis	L.038-22	COTUGRAIN	CBC europe/italie	Piment, Tomate:Mouche blanche:1.5 l/ha Tomate:Acariens(Aculopslycopersici):2 l/ha Volume de bouillie :1000 l/ha Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur conventionnel et d'assurer de la couverture de l'ensemble des parties aériennes par le produit Répéter l'application tous les 5 à 7 jours pendant la période de ponte Nombre d'application :5/saison Mode d'action: par contact DAR:0 jour(com 27/12/22) PIMENT SOUS SERRE : Acariens :Aculopslycopersici : (acariose bronzé) :2 l/ha Volume de bouillie :1000 l/ha Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur conventionnel et d'assurer de la couverture de l'ensemble des parties aériennes par le produit Répéter l'application tous les 5 à 7 jours pendant la période de ponte Nbre d'app:5/saison Mode d'action: par contact DAR:0 jour(COMM 28/12/2023)

61	Beauveria bassiana strain PPRI 5339	80 g/l	OD	VELIFER OD	I.32-25	COTUGRAIN Impex	BASF	Concombre sous serre: Thrips <i>Frankliniella occidentalis</i> : 1.25 l/ha Concombre sous serre : mouche blanche Bemisia tabaci : 1.25 l/ha (Comm 16/07/2025)
62	Beauveria bassiana strain R444	2x109 spores	WP	Bb-Protec WP	I.08-21	ALOHA Agriculture	Plant Health Products (phy)/Sud d'Afrique/Andermat t PHP(Pty) Ltd/ANDERMAT T BIOCONTROL GROUP AG	Tomate: Mouche blanche (Bemisia tabaci) : 300 g/ha - pulvérisation foliaire - nbre max : 3/cycle-intervalle de 10 jours (COMM09/02/21)
63	Bifenazate	240 g/l	SC	COMITE 240 SC	I.024-22	BIOPROTECTION	CHEMTURA/AR YSTA	Agrumes : Acariens : 60 cc/hl Palmier dattier: Acariens (Oligonychusafrasiaticus): 60 cc/hl. (COMM09/02/21); COMM08/06/2022)
64	Bifenazate	240 g/l	SC	FLORAMITE 240 SC	I.008-16	AGRIMATCO	CHEMTURA/AR YSTA	Agrumes : Acariens: 60 cc/hl Palmier dattier: Acariens (Oligonychusafrasiaticus): 60 cc/hl (COMM09/02/21)
65	Bifenazate	50%	WG	BANTER WG	I.003-19	AGRIPROTEC	UPL limited	Agrumes: Acariens "Tetranychus urticae": 100 g/hl; - Traitement foliaire : en une seule application avec une couverture d'un mois; - Présence d'effets d'une écotoxicité inacceptable pour le prédateur Phytoseiulus persimilis durant quelques jours après le traitement (COMM 23/04/2019)
66	Bifenazate	494,8 g/L	SC	Acramite 480 SC	IA.030-11/21	SEPCM	CHEMTURA /UPL	Pommier : Acariens 100 cc/hl; Tomate en plein champs : Acariens 30 cc/hl; Agrumes : Acariens 100 cc/hl Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasiaticus " : 50cc/Hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
67	Bifenazate	494,8 g/L	SC	VIGILANT 480 SC	I.29-25	COTUGRAIN Impex	CHEMTURA /UPL	Pommier : Acariens 100 cc/hl; Tomate en plein champs : Acariens 30 cc/hl; Agrumes : Acariens 100 cc/hl Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasiaticus " : 50cc/Hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 25/06/2025)
68	Bifenazate + Etoxazole	30% + 15%	SC	MITOVER SC	I.01-25	NEGANOR FFT	SHANDONG WEIFANG RAINBOW	Agrumes : Acariens (<i>tetranychus urticae</i>): 100 ml/hl Volume de bouillie: 900-1000 l/ha

							CHEMICAL CO.LTD CHINE	Nombre d'application :1 application L'efficacité de produit contre les formes mobiles de l'acarien est observée à partir du 3^{ème} jour et elle dure 21 jours. (Comm 25/06/2025)
69	Borax	10 g/L	SL	Prev-am	I.A.F.031-11/21	EL MOUSSEM	ORO AGRI	Vigne, Fraisiers : Cochenille farineuse, Mildiou, Pourriture :300 cc/hl Tomate : Acariens : 300 cc/hl Tomate : Mouches blanches : 320 cc/hl Vigne : Oïdium : 200 cc/hl Palmier dattier : Dessèchement Foliaire(Alternaria alternata/Alternaria arborescens) :350 ml/hl traitement en curatif dès l'apparition des symptômes de dessèchement sur les palmiers,(COMM09/02/21)(APV) Palmier dattier :Acariens des dattes(Oligonychusafrasiaticus):350 ml/hl (APV COMM 08/06/22)
70	Borax	10 g/L	SL	Orotun	I.A.F.017-16	RAYEN PHYTAGRI	ORO AGRI	Vigne, Fraisiers : Cochenille farineuse, Mildiou, Pourriture :300 cc/hl Tomate : Acariens : 300 cc/hl Tomate : Mouches blanches : 320 cc/hl Vigne : Oïdium : 200 cc/hl
71	Buprofezin	25%	SC	Applaud 25 SC	I.23-23	AGRIPROTEC	SIPCAM INAGRA	TOMATE SOUS SERRE : Mouche blanche (<i>Bemisia tabaci</i>):100 cc/hl Volume de bouillie :1000 l/ha (COMM 28/12/2023)
72	Chlorantraniliprole	20%	SC	Virago	I.041-22	SHARDA CROP CHEM LIMITED Tunisia	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Tomate :Tuta absoluta: 15 cc/hl Application foliaire (com 27/12/22)
73	Chlorantraniliprole	20%	SC	PROPICE SC	I.54-23	SANABEL AGRO	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Tomate :Tuta absoluta: 15 cc/hl Application foliaire(com 27/12/22)'COMM 28 dec 2023)
74	Chlorantraniliprole	200 g/L	SC	Coragen 20 SC	I.033-11/21	SEPCM	DU PONT/FMC	Tomate : Tuta absoluta : 50 cc/hl
75	Chlorantraniliprole	350 g/kg	WG	ALTACOR 35 WG	I.015-22	AGRIPROTEC	FMC	Tomate sous serre :Tuta absoluta:10 g/hl (100g/ha) Volume de bouillie: 300-800 L/ha Pulvérisation foliaire -période de traitement : préventif -nombre maximum de traitements: 2 par saison -calendrier des applications:BBCH71-BBCH89 DAR: 1j. (COMM 08/06/22) TOMATE SOUS SERRE :Noctuelles :10 g/hl

								(100g/ha) Volume de bouillie: 300-800 L/ha Pulvérisation foliaire -période de traitement : préventif nombre maximum de traitements: 2 par saison -calendrier des applications: BBCH71-BBCH89 DAR: 1j (COMM 28/12/2023)
76	Chlorantraniliprole	200g/l	SC	COREGIS SC	I.025-22	PROMOCHIMIE	DU PONT/FMC	Tomate :Tuta absoluta:50 cc/hl(COMM 08/06/22)
77	Chlorantraniliprole	200 g/l	SC	CLEVEROLE SC	I.10-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE :Tuta absoluta:50 ml/ha -1 application -volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 28/12/2023)
78	Chlorantraniliprole	200 g/l	SC	KORTEX	I.06-24	NEGANOR FFT	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE :Tuta absoluta:50 ml/ha -1 application -volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 22/05/2024)
79	Chlorantraniliprole + Enamectin benzoate	12% + 4%	SC	PROPROLE (SC)	25-41.I	TASMID	Nanjing Agrochemical Co., Ltd.	Tomate sous serre :Tuta absoluta: 300 mL / ha Le produit est principalement efficace contre les larves de Tuta absoluta. Autorisation provisoire de vente APV (16/07/2025)
80	Chlorantraniliprole + lambdacyhalothrin	100 g/l+50 g/l	EC	LASTROLE EC	I.11-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE :Tuta absoluta:30 ml/hl -1 application -volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 28/12/2023)
81	Chlorantraniliprole + lambdacyhalothrin	100 g/l+50 g/l	EC	PLIGO ZC	I.07-24	NEGANOR FFT	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE :Tuta absoluta:30 ml/hl -1 application -volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 22/05/2024)
82	Chlorantraniliprole + Abamectine	45 g/L +18g/L	SC	VoliamTargo 063 SC	I.034-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Tomate : Tutaabsoluta : 60 cc/hl Tomate : noctuelles : 60 cc/ hl Poirier : Psylle : 60 cc/ hl Pommier : Acariens: 60cc/hl

83	Chlorantraniliprole +LambdaCyhalothrine	100 g/L+50 g/L	SC	BESIEGE 150 ZC	I.009-18	COTUGRAIN IMPEX	SYNGENTA	Tomate : Tutaabsoluta : 30 cc/hL Piment : Pucerons : 30 cc/hl Tomate : Noctuelle : 20 cc/hl(COMM18/10/2018)
84	Chlorantraniliprole +Lambda-cyhalothrine	100 g/l+ 50 g/l	SC	POLYVALENT SC	I.18-23	Sté El Khadra	EASTCHEM CO,Ltd CHINE	TOMATE SOUS SERRE :Tutaabsoluta :30 cc/hl Pulvérisation foliaire Volume de bouillie :800-1000 l/ha DAR:03 jour Nbre d'app:1à2 (COMM 28/12/2023)
85	Chlorantraniliprole +methoxyfénoside	4%+18%	SC	ABSOLUT SC	I.09-23	STEC	NANJING AGROCHEMICA L CHINE	TOMATE SOUS SERRE :Tutaabsoluta :50 cc/hl Volume de bouillie:800-1000 l/ha 02 traitements/cycle (COMM 28/12/2023)
86	Chromafénoside	50 g/L	SC	Matric	I.044-11/21	BIOPROTECTION	UPL/ARYSTA LIFESCIENCE	Pommier : Carpocapse : 0,2 L/hl (maximum 2 applications par an) Vigne : Tordeuse, Ver de la grappe : 0,2 L/hl (maximum 2 applications par an)
87	CINNAMALDHEYDE	238.78 g/L (22.96% p/p/)	EC	SEICAN EC	I.33-23	ATLAS AGRICOLE	SEIPASA S.A	TOMATE SOUS SERRE : Acariens rouges : 250cc/hl(2.5 l/ha) Volume de bouillie 1000 l/ha Application foliaire Appliquer en préventive ou dès l'apparition des œufs ou larves Répéter le traitement tout les 5 à 7 j DAR:0 j (COMM 28/12/2023) Vigne :oidium (Uncinula necator) :250 cc/hl Volume de bouillie :1000 l /ha -application foliaire (Comm 25/06/2025)
88	Clofentezine	500 g/L	SC	Apollo 50	A.045-11/21	STEC	AAKO BV	C. maraichères : Acariens : 100 cc/hl Pommier : Acariens : 40 cc/hl. Palmiers dattier Acariens « Oligonychus afrasiaticus » : 50cc/Hl (Comm 25/06/2025)
89	Cyantraniliprole	200g/kg	SC	VERIMARK SC	I.25-23	SEPCM	FMC	TOMATE SOUS SERRE :Mouche blanche (Bemisia tabaci):0.375 l/ha en goutte à goutte POIVRON SOUS SERRE :Thrips :0.5 l/ha en goutte à goutte Volume de bouillie :100 L/ha -Ne pas l'associer avec les engrais, biostimulants et oligoélément. - la conservation de la préparation ne dépasse pas 8heures. -Appliquer durant le premiers tiers(1/3) du temps de

								l'irrigation. -nbre d'application :2 -intervalle d'app :12 j -DAR :1j (COMM 28/12/2023)
90	Cyantraniliprole	200g/kg	SC	OKINA SC	I.05-23	SSCC	FMC	TOMATE SOUS SERRE :Mouche blanche (<i>Bemisia tabaci</i>):0.375 l/ha en goutte à goutte POIVRON SOUS SERRE : Thrips :0.5 l/ha en goutte à goutte Volume de bouillie :100 L/ha -Ne pas l'associer avec les engrais, biostimulants et oligoélément. - la conservation de la préparation ne dépasse pas 8heures. -Appliquer durant le premiers tiers(1/3) du temps de l'irrigation. -nbre d'application :2 -intervalle d'app :12 j -DAR :1j (COMM 28/12/2023)
91	Cyantraniliprole	100 g/L	OD	Benevia	I.014-16	AGRIMATCO	DU PONT	Tomates sous serre : mouche blanche : 0.6 l/ha (En Préventif : avant début de l'attaque)
92	Cyantraniliprole	100 g/L	OD	Preza OD	I.11-21	Agriprotec	DU PONT/FMC	Tomates sous serre : mouche blanche : 0.6 l/ha (En Préventif : avant début de l'attaque)(COMM09/02/21)
93	Cyantraniliprole +Acibenzolar-S-methyl	100 g/l+12,5 g/L	SC	PLESIVA ALPHA SC	I.011-22	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Tomate sous serre :Mouche blanche(<i>Bemisia tabaci</i>); Tuta absoluta:1 l/ha -Pulvérisation foliaire ou en goutte à goutte(COMM 08/06/22) Piment :Mouche blanche(<i>Bemisia tabaci</i>):1 l/ha -application en goutte à goutte(com 27/12/22)
94	Cyantraniliprole+Abamectine	60 g/l+18g/l	SC	MINECTO PRO SC	I.006-22	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Piment sous serre :Mouche blanche(<i>Bemisia tabaci</i>):0.75 l/ha -volume de bouillie:400-800 l/ha -Désles premiers individus de mouches blanches sont observés -Type: foliaire en préventif et en curatif -Nb de d'app:3 applications -Durée entre les applications:14 à 21 jours d'intervalle(en fonction de l'intensité de l'attaque) DAR:3 jours(COMM 08/06/22) TOMATE SOUS SERRE : <i>Tuta absoluta</i> :0.6 l/ha Volume de bouillie 400-800 l/ha Dés les premières larves ou mines sont présentes sur les plants de tomate

								Type: foliaire en préventif et en curatif Nbapp:3 applications Durée entre les applications :14 à 21 jours d'intervalle (en fonction de l'intensité de l'attaque) DAR:3 jours (COMM 28/12/2023) Agrumes : Acariens (tetranychus urticae) :0.75 l/ha Volume de bouillie : 500-1000 l/ha -Traitement foliaire -Stade d'application:seuil local -Nombre d'application:3 applications au max -Durée entre les applications:10-14 jours -DAR:14 jours L'efficacité du produit contre les formes mobiles de l'acarien est observée à partir du 7^{ème} jour et elle dure 14 jours. (comm 25/06/2025)
95	Cyflumetofen	100g/l	DC	DANIRANGER 10DC	I.001-22	AGRIMATCO	OAT AgrioCO.Ltd	Agrumes: Acariens(Tetranychusurticae):100 cc/hl -pulvérisation foliaire -application dès l'apparition de premières formes mobiles (COMM 08/06/22) Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :100 cc/hl Volume de bouillie:500 l/ha Application dès l'apparition de première formes mobiles Autorisation Provisoire de Vente (COMM 22/02/2024)
96	Cyflumetofen	193.5 g/l	SC	VELAR 20 SC	I.03-21	cotugrain	OAT agrio(fab)/Japo(LI DA PLANT RESEARCH/Fournisseur)	Agrumes: Acariens(TetranychusUrticae):1 l/ha BBCH:11-85 Durée de protection:7jours -App foliaire -02 applications le produit présente une efficacité qui COMMence au 3 ^{ème} jour (effet choc) et s'étale sur 21 jours avec une efficacité importante sur les œufs et les formes mobiles. (COMM09/02/21) TOMATE SOUS SERRE : Acariens rouges :1 l/ha Stade d'application BBCH:13-89 Durée de protection :3 jours -App foliaire -02 applications (COMM 28/12/2023)

97	Cypermethrine	100 g/l	EC	CYTHRINE 10 EC	I.41-23	AGRIPROTEC	ARYSTA LIFESCIENCE/IP L	TOMATE SOUS SERRE : Noctuelles :40 cc/hl Volume de bouillie :1000 l/ha -pulvérisation foliaire -en curatif -nbre max :1 -calendrier des applications :dés l'apparition de l'organisme nuisible -DAR:3 jours COMM 28/12/2023)
98	Cypermethrine	250 g/L	EC	SYNCHRO	I.004-15/25	EL KHADRA	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Tomate : Noctuelle défoliatrice : 50 cc/hl. Comm 25/06/2025
99	Cypermethrine	25%	EC	SINOCYPER	I.44-23	EL KHADRA	CROPSAVE PESTICIDES INDIAN PVT.LTD	TOMATE : Noctuelles : 50 cc/hl Mode d'action : contact et ingestion Pulvérisation foliaire Volume de bouillie :800-1000 l/ha DAR:3 jours Nbre d'applications :3/saison (COMM 28/12/2023)
100	Cypermethrine	25%	EC	CYPRINE	I.22-25	TASMID	CROPSAVE PESTICIDES INDIAN PVT.LTD	TOMATE : Noctuelles : 50 cc/hl Mode d'action : contact et ingestion Pulvérisation foliaire Volume de bouillie :800-1000 l/ha DAR:3 jours Nbre d'applications :3/saison (COMM 25/06/2025)
101	Cypermethrine	250 g/L	EC	CYPERNOVA	I.004-17	AGRINOVA	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Tomate : Noctuelle défoliatrice : 50 cc/hl(.COMM 20/06/2017)(COMM08/06/22)
102	Cypermethrine	500 g/l	EC	CYPGOLD 500 EC	I.029-22	EL MOUSSEM	ARYSTA LIFESCIENCE /UPL	Olivier : Dacus (Bactroceraeoleae):75 ml/ha (7.5 ml/ha) -application foliaire -DAR :28 jours -max 5 traitements /cycle -LMR :0.4mg/kg(com 27/12/22) Melon :Pucerons Aphis gossypii :75 ml/ha (7.5 ml/hl) application foliaire -DAR :3 jours -max 4 traitements /cycle -LMR : 0.2mg/kg (Comm 16/07/2025)
103	Cypermethrine	100 g/l	EC	CYRUX	I.003-17	PROTAGRI	UPL	Tomate : Noctuelle: 100ml/hl;(COMM du 20/06/2017)

104	Cypermethrine	0.86 %	MG	Belem 0.8 MG	002-16 L.	SEPCM	SBM FORMULATION/ CMPA	Pomme de terre: Taupins:12 kg/ha (T traitement localisé sur ligne)
105	Cyperméthrine	100 g/L	EC	Selene	I.048-11/21	ETS. MEZGHANI	INDUSTRIAL QUIMICA KEY	Betterave : Casside : 100 cc/hl C. maraîchères : Pucerons, tordeuse, altises, noctuelles défoliatrice : 100 cc/hl Céréales : Pucerons : 100 cc/hl P .de terre : Pucerons : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie : 100 cc/hl Arbres fruitiers : Scolytes : 100 cc/hl Poirier : Psylle :100 cc/hl Olivier : Dacus : 75 cc/hl
106	Cyperméthrine	100 g/L	EC	Sherpa	I.146-11/21	JADWA AGROTEC	CMPA	Betterave : Casside : 100 cc/hl C. maraîchères : Pucerons, tordeuse, altises, noctuelles défoliatrice : 100 cc/hl Céréales : Pucerons : 100 cc/hl P .de terre : Pucerons : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie : 100 cc/hl Arbres fruitiers : Scolytes : 100 cc/hl Poirier : Psylle :100 cc/hl Olivier : Dacus : 75 cc/hl
107	Cyperméthrine	250 g/L	EC	Cypercal 250 EC	I.046-11/21	BIOPROTECTION	UPL/ARYSTA LIFESCIENCE	C. maraîchères : Noctuelle défoliatrice : 50 cc/hl Olivier : Dacus : 30 cc/hl Betterave : Casside : 50 cc/hl Grandes cultures : Pucerons, Tordeuse, Altise : 50 cc/hl Céréales : Pucerons : 50 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie : 50 cc/hl Arbres fruitiers : Scolytes : 50 cc/hl Poirier : Psylle : 50 cc/hl
108	Deltamethrin	25 g/l	EC	CISTHRIN EC	I.45-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE:Noctuelles: 75 ml/hl Mode d'action : contact et ingestion (COMM 28/12/23)
109	Deltamethrin	25 g/l	EC	DELTOP EC	I.04-24	COTUGRAIN Impex	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE:Noctuelles: 75 ml/hl Mode d'action : contact et ingestion (COMM 22/05/24)
110	Deltamethrine	25 g/l	EC	D66	I.003-15/25	ETS MEZGHANNI	INDUSTRIAL QUIMICA KEY	Agrumes: Cochenilles : 50 cc/hl(COMM13/02/2020)(comm 25 juin 2025)

111	Deltamethrine	25 g/l	EC	Dextra 25 EC	16-016L	RAYEN PHYTAGRI	TAGROS CHEMICALS	Tomate : Noctuelle : 75 cc/hl
112	Deltamethrine	25 g/l	EC	Delmitox	16-011L	SANABEL AGRO	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Tomate : Pucerons : 100 cc/hl
113	Deltamethrine	25 g/l	EC	DOREMY	I.25-25	FERTITECH	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Tomate : Pucerons : 100 cc/hl (Comm 25/06/2025)
114	Deltamethrine	15 g/l	EC	Atrium	16-012L	EL MOUSSEM	ROTAM AGROCHEMICALS	Féverole : Sitonesphytonomes : 0.75 l/ha (Comm 25/06/2025)
115	Deltamethrine	25 g/l	EC	SCATTO EC	I.013-19	STIMA	ISAGRO SPA/GOWAN	Pêcher : Cératite:100 ml/hl ; COMM 23/04/2019
116	Deltamethrine	25 g/l	EC	CIDIAL	I.23-25	AGRIPROTEC	ISAGRO SPA/GOWAN	Pêcher : Cératite:100 ml/hl ; (COMM 25/06/2025)
117	Deltamethrine	100 g/l	EC	DEXTRA 100 EC	I.46-23	RAYEN PHYTAGRI	TRAGOS CHEMICOLS /INDE	TOMATE : Noctuelles : 15 cc/hl Mode d'action : contact et ingestion Application foliaire 1 à 2 traitements/cycle chaque 7 à 10 jours Traiter dès l'observation des premiers dégâts (COMM 28/12/2023)
118	Deltaméthrine	100 g/L	EC	Decis Expert	I.056-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPS SCIENCE	Tomate de pleins champs : Noctuelles (chenilles défoliatrices) : 15 cc/hl ; Olivier : Neiroun : 15 cc/hl; Tomates/Piments : Pucerons : 15 cc/hl; Pêcher : Pucerons : 20 cc/hl; Arbres fruitiers : Scolytes : 15 cc/hl
119	Deltaméthrine	25 g/l	EC	COBRA EC	I.43-23	SSCCokina	GHARDA CHEMICALS LTD	TOMATE SOUS SERRE : Noctuelles :75 cc/hl (COMM 28/12/2023)
120	Deltaméthrine	25 g/l	EC	SERISS 25 EC	I.40-23	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRASA S.A / ALBAUGH EUROPE SARL	TOMATE SOUS SERRE :Noctuelles :50 cc/hl -Traitement foliaire - Volume de bouillie :700 à 1000 l d'eau/ha -2 Traitements espacés de 14 jours par cycle de la culture. -1er traitement au stade BBCH 72-73 (COMM 28/12/2023) Agrumes :Puceron (aphis spp) :50 cc/hl Traitement foliaire Volume de bouillie : 700 à 1000 l d'eau/ha Le produit est efficace contre les pucerons, l'efficacité est observée à partir du 7^{ème} jour et elle dure 21 jours. (Comm 25/06/2025)

121	Deltaméthrine	25 g/L	EC	Deltacal	I.053-11/21	BIOPROTECTION	UPL/ARYSTA LIFESCIENCE	Céréales : Pucerons : 100 cc/hl C. maraîchères : Noctuelle, Pucerons : 75 cc/hl Vigne : Tordeuse, Pyrale, Cicadelle, Thrips : 50 cc/hl Olivier : Psylle, Dacus, Teigne, Hylésine Cochenille, Neiroun, Pyrale de jasmin : 50 cc/hl (T.aérien /terrestre) P.de terre : Teigne : 100 cc/hl Poirier : Psylle : 75 cc/hl Arbo : Pucerons, Mineuse, Carpocapse, Tordeuse, Zeuzère, Scolytes, Cératites : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie, Cicadelle, Thrips: 50 cc/hl Légumineuses : Sitonesphytonomes : 125 cc/hl Grenadier : Ectomeylois : 50 cc/hl Forêt : Limantriadispar : 50 cc/hl 2s pèlerins (adultes et larves) : 0,3 à 0,4 L/ha Toutes cultures : Cigales : 100 cc/hl Agrumes : Cochenilles noires : 50 cc/hl
122	Deltaméthrine	25 g/L	EC	Decis EC 25	I.054-11/21	EL MOUSSEM AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Céréales : Pucerons : 100 cc/hl C. maraîchères : Noctuelle, Pucerons : 75 cc/hl Vigne : Tordeuse, Pyrale, Cicadelle, Thrips : 50 cc/hl Olivier : Psylle, Dacus, Teigne, Hylésine Cochenille, Neiroun, Pyrale de jasmin : 50 cc/hl (T.aérien /terrestre) P.de terre : Teigne : 100 cc/hl Poirier : Psylle : 75 cc/hl Arbo : Pucerons, Mineuse, Carpocapse, Tordeuse, Zeuzère, Scolytes, Cératites : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie, Cicadelle, Thrips: 50 cc/hl Légumineuses : Sitonesphytonomes : 125 cc/hl Grenadier : Ectomeylois : 50 cc/hl Forêt : Limantriadispar : 50 cc/hl Criquets pèlerins (adultes et larves) : 0,3 à 0,4 L/ha Toutes cultures : Cigales : 100 cc/hl Agrumes : Cochenilles noires : 50 cc/hl
123	Deltaméthrine	25 g/L	EC	Fruithrine	I.166-11/21	PROTAGRI	United Phosphorus Ltd	Betterave : Cassides, Pucerons : 50 cc/hl Céréales : Pucerons : 100 cc/hl C. maraîchères : Noctuelle, Pucerons : 75 cc/hl Vigne : Tordeuse, Pyrale, Cicadelle, Thrips : 50 cc/hl Olivier : Psylle, Dacus, Teigne, Hylésine Cochenille, Neiroun, Pyrale de jasmin : 50 cc/hl (T.aérien/terrestre) P.de terre : Teigne : 100 cc/hl

								Poirier : Psylle : 75 cc/hl Arbo : Pucerons, Mineuse, Carpocapse, Tordeuse, Zeuzère, Scolytes, Cératites : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie, Cicadelle, Thrips: 50 cc/hl Légumineuses : Sitonesphytonomes : 125 cc/hl Grenadier : Ectomeylois : 50 cc/hl Forêt : Limantriadispar : 50 cc/hl Criquets pèlerins (adultes et larves) : 0,3 à 0,4 L/ha Toutes cultures : Cigales : 100 cc/hl Agrumes : Cochenilles noires : 50 cc/hl
124	Deltaméthrine	25 g/L	EC	Delta	I.055-11/21	STEC	BAYER CROPS SCIENCE	Céréales : Pucerons : 100 cc/hl C. maraîchères : Noctuelle, Pucerons : 75 cc/hl Vigne : Tordeuse, Pyrale, Cicadelle, Thrips : 50 cc/hl Olivier : Psylle, Dacus, Teigne, Hylésine Cochenille, Neiroun, Pyrale de jasmin : 50 cc/hl (T.aérien /terrestre) P.de terre : Teigne : 100 cc/hl Poirier : Psylle : 75 cc/hl Arbo : Pucerons, Mineuse, Carpocapse, Tordeuse, Zeuzère, Scolytes, Cératites : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie, Cicadelle, Thrips: 50 cc/hl Légumineuses : Sitonesphytonomes : 125 cc/hl Grenadier : Ectomeylois : 50 cc/hl Forêt : Limantriadispar : 50 cc/hl Criquets pèlerins (adultes et larves) : 0,3 à 0,4 L/ha Toutes cultures : Cigales : 100 cc/hl Agrumes : Cochenilles noires : 50 cc/hl
125	Deltametrine	2.5 %	EC	DELTAPROTEKT EC	I.13-25	LIEN AGRICOLE	Protekting	Agrumes: Puceron(aphis spp) : 100 cc /hl Foliaire Le produit est efficace contre les pucerons, l'efficacité est observée à partir du 3^{ème} jour et elle dure 21 jours. (Comm 25/06/2025)
126	Diafenthuron	500 g/L	SC	Pegasus 500 SC	I.057-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Pommier, Agrumes : Acariens, Pucerons : 60 ml/hl Tomate : Mouches blanches, Acariens : 60 ml/hl Cucurbitacées : Pucerons, Mouches blanches, Acariens : 60 ml/hl Tomate :TutaAbsoluta :100 cc/hl
127	Diafenthuron	500 g/l	SC	MIRACO SC	I.12-25	SOLAGRI	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL	Agrumes:Puceron (aphis spp) :60 ml/hl Volume de bouillie:400-600 l/ha 01 application Le produit est efficace contre les pucerons, cette

							CO.LTD CHINE	efficacité est observée à partir du 3^{ème} jour et elle dure 21 jours. Tomate sous serre: Tuta absoluta : 100 ml/hl Volume de bouillie:400-600 l/ha Nombre d'application : 01 application Le Produit est efficace contre les œufs et larves de Tuta absoluta. <u>AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE</u> (Comm 25/06/2025)
128	Difenoconazole	250 g/l	EC	NANJI 250 EC	F.19-23	STEC	JIANGSU FENGDENG(fab) NANJING AGROCHEMICAL (DIS)	MELON SOUS SERRE :Oidium (Sphaerothecafuliginea) : 40 cc/hl Volume de bouillie :600 l/ha -pulvérisation foliaire -nbre max :2/cycle -DAR:3 jours (COMM28/12/23)
129	Dinotefuran	20%	SG	STARKLE 20SG	I.30-22	AGRIMATCO	Mitsui Chemicals Agro,Inc	Agrumes : Cochenille farineuse :75 g/hl Volume de bouillie :1000 L/ha -pulvérisation foliaire -application dès l'apparition des 1 ^{ère} formes mobiles (COMM 27/12/22) Cactus : cochenille :75g /hl Pulvérisation foliaire App dès l'apparition de première formes mobiles APV(COMM28/12/23)
130	Enamectin benzoate	50 g/L	EC	Proact 50 EC	I.128-11/21	TASMID	ASTRACHEM	Tomate : Tutaabsoluta : 30 cc/hl
131	Enamectin benzoate	50 g/L	EC	PROFAST EC	I.046-22	PLANETE VERTE	ASTRACHEM/AS TRANOVA	Tomate : Tutaabsoluta : 30 cc/hl (COMM27/12/22)
132	Enamectin benzoate	5%	SG	Proclaim 05 SG	I.063-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Tomate : Noctuelles : 250 g/ha; Tomate : TutaAbsoluta :30 g/hl
133	Enamectin benzoate	5%	SG	JEMSTAR	I.049-22	FERTIPLANT	Krishlifescience	Tomate:Tuta absoluta:30 g/hl Traitement foliaire(com 27/12/22)
134	Enamectin benzoate + Spinosad	40 g/l+160 g/l	EC	SPANVIC PLUS SC	I.11-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE :Tuta absoluta :20 ml/hl 1 application Volume de bouillie :450-500 l/ha (COMM 28/12/2023)
135	Enamectin benzoate + Spinosad	40 g/l+160 g/l	EC	SMECTO SC	I.05-24	NEGANOR FFT	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL	TOMATE SOUS SERRE :Tuta absoluta :20 ml/hl 1 application Volume de bouillie :450-500 l/ha (COMM 22/05/2024)

							CO.LTD	
136	Eamectin Benzoate + Pyriproxyfen	20 g/l+60 g/l	EC	Prifenup EC	I.03-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	Agrume : Cochenille : Pou rouge de floride (<i>chrysomphalusonidum</i>):50 ml/hl Volume de bouillie:800-1000 l/ha 01 application (COMM 28/12/2023)
137	Eamectin Benzoate + Pyriproxyfen	20 g/l+60 g/l	EC	PROXYSAFE EC	I.11-24	PLANETE VERTE	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	Agrume : Cochenille : Pou rouge de floride (<i>chrysomphalusonidum</i>):50 ml/hl Volume de bouillie:800-1000 l/ha 01 application (COMM 22/05/2024)
138	Eamectine benzoate	5.7 %	WG	EMATOP	I.19-23	Sté El Khadra	HANGZHOU TOPAGRO BIOSCIENCE CHNINE	TOMATE SOUS SERRE :Tuta absoluta:30 g/hl Pulvérisation foliaire Volume de bouillie :800-1000 l/ha Nbre d'app:1à2 (COMM 28/12/2023)
139	Etofenprox	30%	EC	TREBON EC	I.012-19	ATLAS AGRICOLE	SIPCAM INAGRA S.S	Agrumes :Cératite:100 ml/hl;-Pulvérisation foliaire;- Durée de protection :7 à 10j suivant le degré d'attaque et les conditions climatiques;(COMM23/04/2019). Tomate :Tuta absoluta:50 cc/hl Volume de bouillie :400 à 1000 l/ha Max application par an DAR:3 jours(com 27/12/22)
140	Etoxazole	110g/l	SC	Borneo 10 SC	I.A.017-17	BIOPROTECTION	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S	Pommier : Acarien rouge Panonychusulmi : 25 cc/hl (Mode d'action : translaminaire); (COMM du 18/10/2017)
141	Etoxazole	110g/l	SC	EXPELER SC	I.01-25	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD CHINE	Agrumes : Acariens (<i>tetranychus urticae</i>) :25 ml/hl Nombre d'application :1 application/an Volume de bouillie:900-1000 l/ha L'efficacité de produit contre les formes mobiles de l'acarien est observée à partir du 3^{ème} jour et elle dure 21 jours. (Comm 25/06/2025)

142	Fenazaquin	200 g/L	SC	MAGISTER	A.I.003-20	SEPCM	GOWAN Espagne	Olivier : Acariens Eriophydes : 50cc/hl Pommier : Acariens : 50 cc/hl Tomate de plein champs : Acariens : 50 cc/hl.(COMM13/02/2020) Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :50cc/Hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
143	Fenazaquin 20%	20%	SC	QUEEN SC	I.49-23	SHARDA CROPChem LIMITED TUNISIA	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	TOMATE SOUS SERRE : Acariens rouges:50 cc/hl 1 application DAR:03 jours (COMM 28/12/2023)
144	Fenazaquin 20%	20%	SC	QUEEN PRO SC	I.09-24	SHARDA CROPChem LIMITED TUNISIA	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	TOMATE SOUS SERRE : Acariens rouges:50 cc/hl 1 application DAR:03 jours (COMM 22/05/2024)
145	Fenpyroximate	51,2 g/L	SC	FLASH EVO	I.012-18	EL KHADRA	SIPCAM INAGRA (ancien fabricant: NIHON NOHYAKU Co. Ltd)	Pommier : Acariens : 75 cc/hl Tomate en plein champs : Acariens : 75 cc/hl (COMM18/10/2018) Agrumes : Acariens (<i>Tetranychus Urticae</i>) :0.75 l/ha (75 cc/hl) -Application foliaire -volume de bouillie 1500-2000 l/ha -nombre d'application:1 à 2 applications L'efficacité de produit contre les formes mobiles de l'acarien est observée à partir du 3^{ème} jour et elle dure 14 jours. (Comm 25/06/2025)
146	Flometoquin	100g/l	SC	GLADIUS 10 SC	25-39.I	EL MOUSSEM AGRICOLE	Nippon kayaku Co.,Ltd/Summit Agro international Ltd	Tomate sous serre: Mouche blanche <i>Bemisia tabaci</i> : 100 cc/hl (1 l/ha) application foliaire -DAR :1 jour -nbre max d'app/cycle :3 Le produit est efficace contre les œufs, les larves, les pupes et les adultes de <i>Bemisia tabaci</i> (AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE) (Comm 16/07/2025)

147	Flonicamid	500 g/kg	WG	TEPPEKI WG	I.10-21	AGRIPROTEC	ISK Biosciences Europe N.V(fabricant)/upl(fournisseur)	Tomate :Mouche blanche (Bemisiatabaci) :160 g/ha -Mode de traitement : goutte à goutte -stade d' app: dès les premiers signes d'infestation -DAR :3 jours(COMM09/02/21) PIMENT SOUS SERRE : Mouche blanche (Bemisiatabaci) : 160 g/ha -Mode de trait: goutte à goutte -Calendrier des applications :dès les premiers signes d'infestation -DAR :3 jours TOMATE SOUS SERRE :Pucerons : 100 g/ha PASTEQUE SOUS SERRE :Pucerons : 100 g/ha -Mode de traitement: foliaire Calendrier des applications:dès les premiers signes d'infestation -DAR :3 jours TOMATE SOUS SERRE :Thrips : 60 g/ha -Mode de trait: foliaire -Calendrier des app:dès les premiers signes d'infestation DAR :3 jours (COMM 28/12/2023)
148	Flonicamid	20%	WG	FLOPUS WG	25-53.I	NEGANOR FFT	NANJING(D)SHA ANXI HENG TIAN BIOLOGICAL Agriculture(fab)	Tomate sous serre: Mouche Blanche Bemisia tabaci : 400 g/ha Volume de bouillie:1000 l/ha Application foliaire en préventif et curative Nbre d'app:2-3 app /cycle Intervalle entre app:7 jours DAR:03 jours Le produit est efficace contre les œufs, les larves, les pupes et les adultes de Bemisia tabaci Autorisation provisoireP de vente (Comm 16/07/2025)
149	Flubendiamide	480 g/l	SC	FAME 480 SC	I.020-22	ATLAS AGRICOLE	BAYER	Tomate sous serre : Tuta absoluta :125 ml/ha, Volume de bouillie :300-800 l/ha Application foliaire--stade d'application : BBCH13 à BBCH 89 (COMM 08/06/22).
150	Flubendiamide	24%	WG	TAKITOP WG	I.17-23	Sté EL KHADRA	EASTCHEM CO,Ltd CHINE	TOMATE SOUS SERRE : Tutaabsoluta :25 g/hl Pulvérisation foliaire Volume de bouillie:800-1000 l/ha DAR:1 jour

								Nbre d'app:1à 2 (COMM 28/12/2023)
151	Flubendiamide	20%	WG	Takumi 20 WG	I.070-11/21	EL MOUSSEM AGRICOLE	NIHON NOHYAKU / NICHINO EUROPE	Tomate : Tuta Absoluta : 30 g/hl; Piment :Noctuelles : 12,5 g/hl
152	Flufenoxuron	100 g/L	EC	Qatar	I.071-11/21	AGROSYSTEMES	GLOBACHEM	Agrume : Mineuses : 60 cc/hl ou 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Pommier : Carpocapse, acariens : 75 cc/hl Tomate : Acariens, noctuelles : 60 cc/hl
153	Flupyradifurone	200g/l	SL	SIVANTO PRIME 200 SL	I. 016-17	ATLAS AGRICOLE	Bayer A.G	Pêcher : Pucerons : 0.6 l/ha Vigne : Cicadelle : 0.3 l/ha (COMM du 18/10/2017) Piment sous serre :Mouche blanche (Bemisiatabaci): 0.75 l/ha Rectification de la dose .60cc à 0.75 l/ha (COMM08/06/22)
154	Fluxametamide	10%	EC	GRACIA 100 EC	I.38-23	AGRIMATCO	NISSAN CHEMICAL CORPORATION	TOMATE SOUS SERRE : Noctuelles :0.5 l/ha (50 cc/hl) Pulvérisation foliaire, dès l'apparition des premières larves 02 applications par saison Durée de protection 02 semaines au minimum (COMM 28/12/23) Tomate sous serre: Mouche blanche <i>Bemisia tabaci</i> : 50 cc/hl Volume de bouillie:500 l Nbre d'app max:2 Application dès l'apparition de premières formes Le produit est efficace contre les œufs, les larves, les pupes et les adultes de Bemisia tabaci (Comm 16/07/2025)
155	Gamma-cyhalothrine	60 g/l	CS	Vantex	16-018L	AGROSYSTEMES	FMC	Pommier : Carpocapse : 20 cc/hl
156	Helicoverpaarmigeranucleopolyhe drovirus	7.5 10 ¹² cfu/l	SC	BOLLDEX SC	I.010-17	ALOHA Agriculture	ANDERMATT BIOCONTROL	Tomate :Noctuelles : 200 cc/ha (COMM du 20/06/2017)
157	Hexythiazox	10%	WP	Jalisco	IA.010-16	AGRIPROTEC	PROPLAN/QUME TICA AGRICULTURAL SOLUTIONS SPAIN SLU	Agrumes : Acariens : 50g/hl; Tomate :Acariens" Tetranychusurticae": 50g/hl;-Le produit montre une écotoxicité inacceptable pour le prédateur Phytoseiuluspersimilis durant quelques jours après le traitement;-Mode d'action : contact (COMM 23/04/2019)
158	Hexythiazox	10%	WP	Diablo	I.A.175-11/21	EL KHADHRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAU	Tomate : Acariens : 50 g/hl Piment : Acariens : 50 g/hl

							GH EUROPE SARL	Agrumes, pommier : Acariens : 50 g/hl Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :50 g/hl -Application foliaire -volume de bouillie 800-1000 l/ha -nbre d'application:1 à 2 applications AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
159	Hexythiazox	10%	WP	Cesar	I.A.075-11/21	EL MOUSSEM AGRICOLE	NIPPON SODA CO., LTD/ARYSTA/UP L/Aristeas	Tomate : Acariens : 50 g/hl Piment : Acariens : 50 g/hl Agrumes, pommier : Acariens : 50 g/hl Palmier dattier : Acariens des dattes:Oligonychus afrasiaticus:50 g/hl (COMM08/06/22 : APV)
160	Hexythiazox	10%	WP	Exitox	I.A.177-11/21	Ets MEZGHANI	INDUSTRIAL QUIMICA KEY	Pommier : Acariens : 50 g/hl(COMM13/02/2020) Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :50 g/hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
161	Hexythiazox	258,7 g/l	SC	ACRUX SC	I.005-22	AGROSYSTEMES	Ascenza Agro	Agrumes : Acariens (Tetranychusurticae):20 ml/hl volume de bouillie :1000 l/ha Appliquer au début du printemps à l'eclosion des oeufs d'hiver des acariens ou dès l'apparition des premières formes mobiles(COMM 08/06/2022)
162	Hexythiazox	258.7 g/l	SC	DIABLO MAX SC	I.004-22	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAU GH EUROPE SARL	Agrumes : Acariens(Tetranychusurticae):20 cc/hl volume de bouillie :800-1000 l -avec l'apparition de l'infestation,au début de l'eclosion des œufs d'hiver(couleur rose des bourgeons) -pulvérisation foliaire -DAR:28 jours -nbre d'app:1 à 2 applications. (COMM 08/06/22) Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :20 cc/Hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
163	Hexythiazox	50%	WG	MITADOR WG	I.05-25	AGRINOVA	/Sharda Cropchem INDE	Agrumes :Acariens(Tetranychus Urticae) :10 g/hl (100 g/hl) Volume de bouillie:1000 l/ha Le produit est efficace contre les formes mobiles de l'acarien à partir du 7^{ème} jour et elle dure 21 jours.(Comm 25/06/2025)
164	Hexythiazox +Abamectine	50 g/L+18g/l	SC	ROCINANTE	I.04-21	AGRIPROTEC	PROPLAN/QUME TICA	Agrumes :Acariens (TetranychusUrticae) :0.75 l/ha(2000 l)

							AGRICULTURAL SOLUTIONS SPAIN SLU	Le présente un effet sur les formes mobiles qui dure 14 jours, et ne présente pas un effet significatif sur les œufs.(COMM09/02/21) Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :75 cc/Hl Volume de Bouillie :1000L/Ha Période de traitement: curatif Nbre de traitement: 01 Calendrier des applications: début d'attaque DAR:14 JOURS AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
165	Huile d'essence d'orange	600 g /L	EC	OLEORA EC	I.04-23	BIOPROTECTION	UPL	Agrumes : Cochenille : Pou rouge de floride (<i>chrysomphalusaonidum</i>):100 ml/hl(max. 2 L/ha) Volume de bouillie:1000 l/ha stade d'application: BBCH 71-81 Nbre d'app:2 au max Intervalle d'app:07 jours(Comm 28 dec 2023)
166	Huile de paraffine	800 g/l	EC	OVI PRON TOP	I.003-22	BIOPROTECTION	UPL	Agrumes : Acariens(Tetranychusurticae):1.5 l/hl (1500 l/ha) -Stade de culture BBCH 72 -nbre d'application:1-2 -durée entre les applications:>60 jours -DAR:20 jours (COMM 08/06/22)
167	Huile de paraffinique	79 %	EC	LAINCOIL EC	I.033-22	FERTITECH	LAINCO	Agrumes : Cochenilles farineuses:15 l/ha Volume de bouillie:1000 l/ha -Appliquer avant la coloration du fruit (avant BBCH81) -fréquence d'application: une seule application -méthode d'application: par pulvérisation foliaire(com 27/12/22)
168	Huile de paraffinique	79 %	EC	OLEO CAP EC	I.047-22	NEGANOR	LAINCO	Agrumes :Cochenille farineuse : 1.5 l/hl(15l/ha)(com 27/12/22)
169	Huile de paraffinique	830g/l	EC	AGROIL BLEU EC	I.034-22	PROMOCHIMIE	SIPCAM INAGRA	Agrumes : Traitement d'hiver et d'été (cochenilles farineuses <u>ovicide</u> à partir du3 ^{ème} jour et cet effet se poursuit jusqu' à 3 ^{ème} semaines après l'application du traitement.);20l/ha Volume de bouillie:2000-3000 l/ha Pulvérisation foliaire

								2 traitement/10 jours(com 27/12/22)
170	Huile de paraffinique	830g/l	EC	SIP-OIL	I.24-25	AGRIPROTEC	SIPCAM INAGRA	Agrumes: Traitement d'hiver et d'été (cochenilles farineuses <u>ovicide</u> à partir du 3 ^{ème} jour et cet effet se poursuit jusqu' à 3 ^{ème} semaines après l'application du traitement.):20l/ha Volume de bouillie: 2000-3000 l/ha Pulvérisation foliaire 2 traitement/10 jours (com 25/06/25)
171	Huile minérale	850 g/L	EC	SunOIL	I.008-13/23	AGRIMATCO	PETRONAS LUBRICANTS BELGIUM NV	Agrumes : Mineuses :1 L/hl (seul, 0,4L/hl en association avec un insecticide homologué sur mineuse Vigne : Cochenilles floconneuses : Trait.d'hiver :1,5 L/hl Pommier : Acariens trait. D'hiver : 1,5 L/hl(COMM 19 avril 2023)
172	Huile minérale	817 g/L	EC	Oviphyt	I.127-11/21	ATLAS INDUSTRIE	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS/S ANGOSSE	Agrumes : Mineuses :1 L/hl (seul, 0,4L/hl en association avec un insecticide homologué sur mineuse Vigne : Cochenilles floconneuses : Trait.d'hiver :1,5 L/hl Pommier : Acariens trait. D'hiver : 1,5 L/hl (COMM23/04/2019)
173	Huile minérale	850 g/L	EC	Citrole	I.076-11/21	EL MOUSSEM AGRICOLE	TotalEnergies Fluides	Agrumes : Mineuses :1 L/hl (seul, 0,4L/hl en association avec un insecticide homologué sur mineuse Vigne : Cochenilles floconneuses : Trait.d'hiver :1,5 L/hl Pommier : Acariens trait. D'hiver : 1,5 L/hl
174	Huile minérale	850 g/L	EC	LUMIERE EC	I.50-23	COTUGRAIN	TotalEnergies Fluides <u>A travers</u> KOPPERT	Agrumes : Mineuses :1 L/hl (seul, 0,4L/hl en association avec un insecticide homologué sur mineuse Vigne : Cochenilles floconneuses : Trait.d'hiver :1,5 L/hl Pommier : Acariens trait. D'hiver : 1,5 L/hl (COMM 28/12/2023)
175	Huile minérale	830 g/l	EC	Insecticida KEY	I.001-14/24	ETS MEZGHANI	IndustrialQuimica Key	Agrumes : Mineuses : 1L/ha (Produit seul) OU 0.4 L/ha (En association avec un insecticide). (comm22mai2024)

176	Huile minérale	850 g/L	EC	PetrOil	I005-17	SOCOOPEC	PETRONAS LUBRICANTS	Agrumes : Mineuses :1 L/hl (seul, 0,4L/hl en association avec un insecticide homologué sur mineuse Vigne : Cochenilles floconneuses : Trait.d'hiver :1,5 L/hl Pommier : Acariens trait. D'hiver : 1,5 L/hl COMM 20/06/2017
177	Huile minérale	850 g/L	EC	Plant oil	I.149-11/21	STE EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Agrumes : Mineuses :1 L/hl (seul, 0,4L/hl en association avec un insecticide homologué sur mineuse Vigne : Cochenilles floconneuses : Trait.d'hiver :1,5 L/hl Pommier : Acariens trait. D'hiver : 1,5 L/hl
178	Indoxacarb	150 g/l	SC	PIXEL SC	I.043-22	FERTITECH	TOPAGRO BIOSCIENCE	Tomate :Tuta absoluta:50 ml/hl 03 applications au minimum 7 jours d'intervalle Première applications: développement des premières pousses Volume de bouillie:1000 l/ha DAR:42 jours(com 27/12/22)
179	Indoxacarb	150 g/l	SC	POTER	I.07-23	PROTAGRI	NANJING AGROCHEMICAL	TOMATE SOUS SERRE :Tutaabsoluta :50 cc/hl Intervalle entre les applications 8 jours DAR:3 jours (COMM 28/12/2023)
180	Indoxacarb	30 %	WDG	INDOXAL XTRA WDG	I.15-23	AGRINOVA	AGROBEATS TECH CHINE	TOMATE SOUS SERRE :Tutaabsoluta :150 g/ha 1 à 2 applications Volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 28/12/2023)
181	Indoxacarb	30 %	WDG	VEROX WDG	I.08-24	SANABEL AGRO	AGROBEATS TECH CHINE	TOMATE SOUS SERRE :Tutaabsoluta :150 g/ha 1 à 2 applications Volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 22/05/2024)
182	Indoxacarbe	150 g/l	SC	OXAL SC	I.035-22	NEGANOR	Jingboagrochemicals technologie	Choux :Piéride de choux:30 cc/hl(300 cc/ha) Volume de bouillie:1000 l/ha -application par pulvérisation foliaire -appliquer dès le stade cotylédons étalés de la culture, avec un seuil de 25 % de plants qui présentent des dégâts. -4 applications max/cycle -intervalle entre les applications:3 jours -DAR:3 jours30 cc/hl(300 cc/ha) (com 27/12/22)

183	Indoxacarbe	150 g/l	SC	INDO SUPER SC	I.039-22	Sté ELKHADRA	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO .LTD/cropidea	Tomates: Tuta absoluta:50 cc/hl Volume de bouillie:500-1000 l/ha -DAR:03 jours -Nombre de traitements:2 -intervalle:14 jours(com 27/12/22)
184	Indoxacarbe	30%	WG	VIRTUOZ WG	I.52-23	NEGANOR	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL	Tomate: Tuta absoluta:170 g/ha Application foliaire (COMM 28/12/2023)
185	Indoxacarbe	30%	WG	HoproleXtra	I.040-22	UNIAGRO	Shandong weifang rainbow chemical0	Tomate: Tuta absoluta:170 g/ha Application foliaire(com 27/12/22)
186	Indoxacarbe	30%	WG	JOKARI 30WG	I.37-23	SEPCM	AAKO	TOMATE SOUS SERRE : Noctuelle(<i>Asparagus caterpillar</i>) :15 g/hl(150g/ha) Volume de bouillie: 600-800 L/ha -02 applications/cycle -appliquer dès les premières éclosions. Renouveler le traitement 7-14 jours plus tard si nécessaire -DAR:3 jours (COMM 28/12/2023)
187	Indoxacarbe	150 g/L	SC	TALENT 150 SC	I.016-18	Ets MEZGHANI	ASTRACHEM/AS TRANOVA	Tomate : TutaAbsoluta :50 cc/hl(COMM 18/10/2018)
188	Indoxacarbe	150 g/L	SC	Amiral	I.087-11/21	EL MOUSSEM AGRICOLE	PARIJAT INDUSTR./ariestas	Tomate : TutaAbsoluta :50 cc/hl
189	Indoxacarbe	150 g/L	SC	GENERAL SC	I.045-22	RAYEN PHYTAGRI	PARIJAT INDUSTR.	Tomate : TutaAbsoluta :50 cc/hl(COMM27/12/22)
190	Indoxacarbe	150 g/L	EC	AVATAR EC	I.023-22	ATLAS AGRICOLE	DU PONT/FMC	Tomate : Noctuelle : 30 cc/hl (300 cc/ha); Tomate :TutaAbsoluta :50 cc/hl (COMM 08/06/22)
191	Indoxacarbe	150 g/L	EC	Avaunt	I.089-11/21	SEPCM	DU PONT/FMC	Tomate : Noctuelle : 30 cc/hl (300 cc/ha); Tomate :TutaAbsoluta :50 cc/hl
192	Indoxacarbe	150 g/l	SC	STARCARB	I.021-22	SSCC	GARDA CHEMICAL	Tomate sous serre: Tuta absoluta:25 cc/hl. (COMM 08/06/22)
193	Indoxacarbe	15%	SC	KING DOXA 15 SC	I.21-23	RAYEN PHYTAGRI	GHARDA HOUSE INDE	TOMATE SOUS SERRE: Tuta absoluta:50 ml/hl(0.5 l/ha) Volume de bouillie :400-1000 l/ha Nbre d'application:3 DAR:5 jours (COMM 28/12/2023)
194	Indoxacarbe	150 g/L	SC	Vaulent	I.086-11/21	TASMID	ASTRACHEM	Tomate : Tuta Absoluta :50 cc/hl
195	Lambada cyhalothrine	5%	EG	Kempo EG	I. 14-21	BIOPROTECTION	NUFARM	Agrumes : Pucerons : 200 g/ha(COMM 09/02/21)

196	Lambda cyhalothrine	5%	EG	KAISO 5%	I. 014.-17	EL MOUSSEM AGRICOLE	NUFARM	Agrumes : Pucerons : 200 g/ha(COMM18/10/2017)
197	Lambda cyhalothrin	2,50%	WDG	JUDO	I. 013-17	STIMA	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Agrumes : Cératite:75 g/hl Pêcher : Cératite: 75 g/hl Mode d'action :Par contact et ingestion (COMM du 18/10/2017)
198	Lambda cyhalothrin	2,50%	WDG	INDIGO WDG	I. 15-21	AGRIMED DISTRIBUTION	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Agrumes : Cératite:75 g/hl Pêcher : Cératite: 75 g/hl(COMM09/02/21) COMM028 dec2023
199	Lambda-cyhalothrin	50 g/l	EC	LASTING EC	I.08-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE : <i>Tuta absoluta</i> :300 ml/ha -1 à 2 applications -volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 28/12/2023)
200	Lambda-cyhalothrin	50 g/l	EC	LATHRIN EC	I.14-24	PLANETE VERTE	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE : <i>Tuta absoluta</i> :300 ml/ha -1 à 2 applications -volume de bouillie:500-600 l/ha (COMM 22/05/2024)
201	Lambda-cyhalothrin	25 g/l	EC	KEYLAM EC	I.003-18	EtsMezghanni	Industrialquimica Key	Betterave à sucre : Pucerons, Casside : 75 cc/hl (12/01/2018)
202	Lambda-cyhalothrine	100 g/l	SC	ALLEYA ME	I.28-23	EL KHADRA	AUGUST inc/CORPORATE	TOMATE SOUS SERRE : Mouche blanche (<i>Bemisiatabaci</i>):20 cc/hl Volume de bouillie :500-1000l/ ha Pulvérisation foliaire DAR:7 jours Mode de contact:contact, ingestion et inhalation -nbre d'app:2 à 3 app/saison (COMM 28/12/2023)
203	Lambda-cyhalothrine	100 g/l	ME	SIAL ME	I.43-25	NEGANOR FFT	AUGUST inc/CORPORATE	TOMATE SOUS SERRE : Mouche blanche (<i>Bemisiatabaci</i>):20 cc/hl Volume de bouillie :500-1000l/ ha Pulvérisation foliaire DAR:7 jours Mode de contact:contact, ingestion et inhalation -nbre d'app:2 à 3 app/saison (COMM 16/07/2025)
204	Lambda-cyhalothrine	0.4 %	GR	POINTER GEO GR	I.07-21	AGRIPROTEC	SIPCAM INAGRA	Pomme de terre :insecte du sol (taupins)15 kg/ha Localisé à la ligne de semis à coté de la graine et/ou repart et enterré dans le sillon pendant le buttage.(COMM09/02/21)

205	Lambda-cyhalothrine	0,4 %	GR	TRIKA EXPERT GR	I.06-21	PROMOCHIMIE	SIPCAM INAGRA	Pomme de terre :insecte du sol (taupins)15 kg/haLocalisé à la ligne de semis à coté de la graine et/ou repartit et enterré dans le sillon pendant le buttage.(COMM09/02/21)
206	Lambda-cyhalothrine	10g/l	CS	LAMBDATROL	I.007-18	AGRIPROTEC	SIPCAM INAGRA	Tomate : Noctuelle : 10 cc/hl;(COMM 18/10/2018)
207	Lambda-cyhalothrine	100g/l	CS	POINTER100 CS	I.002-17	promochimie	SIPCAM INAGRA	Tomate : Noctuelle : 10 cc/hl;(COMM du 20/06/2017)(COMM09/02/2021)
208	Lambda-cyhalothrine	25 g/l	EC	Pulsar	I.168-11/21	PROTAGRI	United Phosphous Ltd	Olivier : Teigne : 250 cc/ha Betterave : pucerons, casside : 75 cc/hl Arbres fruitiers : Carpocapse : 75cc/hl Pommiers : Pucerons :75 cc/hl
209	Lambda-cyhalothrine	50 g/L	EC	Ravane	I.091-11/21	AGROSYSTEMES	GLOBACHEM	Pommier : Carpocapse : 25 cc/hl
210	Lambda-cyhalothrine	50 g/L	EC	Markate	I.016-15/25	AMINCO	GLOBACHEM	Pommier : Carpocapse : 25 cc/hl(comm 25 juin 2025)
211	Lambda-cyhalothrine	50 g/L	EC	Expert	I.007-15/25	SANABEL AGRO	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Pommier : Carpocapse : 25 cc/hl (comm 25 juin 2025)
212	Lambda-cyhalothrine	50 g/L	EC	lalion EC	I.16-21	deltaagricole plus	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Pommier : Carpocapse : 25 cc/hl(COMM09/02/21)
213	Lambda-cyhalothrine	50 g/L	EC	Jackpot	16-013L	SANABEL AGRO	ROTAM AGROCHEMICALS(rivale)	Féverole : sitones et phytonomes : 300 cc/ha
214	Lambda-cyhalothrine	100 g/L	CS	Kung Fu	I.005-18	SOLAGRI	SYNGENTA	Toutes cultures : Noctuelles : 80 cc/ha; Pommier, poirier : Carpocapse, ceratite : 150 cc/ha; Pommier, poirier : Pucerons : 80 cc/ha; Vigne : Cicadelles, Thrips : 200 cc/ha; C. maraichères : Pucerons, Mouches blanches : 150 cc/ha
215	Lambda-Cyhalothrine	5 %	EC	LAMDA MAX EC	I.15-25	LIEN AGRICOLE	UNITED CHEMICALS	Agrumes :Puceron (<i>aphis spp</i>) : 40 cc/hl Foliaire Le produit est efficace contre les pucerons, l'efficacité est observée à partir du 3^{ème} jour et elle dure 21 jours. (Comm 25/06/2025)
216	Lambda-cyhalothrine + Acétamiprid	1,5% + 6%	EC	LAMBDAFAST EC	I.11-25	ATLAS Agricole	Nanjing(shandong caoda chemicals/chine)	Agrumes : Mineuse des agrumes (<i>Phyllocnistis citrella</i>):100 ml/hl Max 2 applications par saison Dar :21 Jours Le produit est efficace contre les larves de la mineuse des agrumes, l'efficacité est observée à partir du 3^{ème} jour et elle dure 14 jours(Comm 25/06/2025)

217	Manipropamide +Oxychlorure de cuivre	2.5%+13.95%	WG	REVUS C	F.05-23	BIOPROTECTION	SYNGENTA	TOMATE SOUS SERRE :Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>) :5 k/ha Volume de bouillie :200-600 l App foliaire BBCH11-BBCH89 04 app/saison Durée entre les app:07 jours DAR:3 jours(COMM 28/12/23) (comm22/05/2024)
218	Metaflumizone	240 g/l	SC	VERSIMO 240 SC	I.13-21	AGRIPROTEC	BASF	Tomate :Tutaabsoluta: 1 L/ha (stade larvaire L1, traitement foliaire, 2 fois par cycle max)(COMM 09/02/21)
219	Métam sodium	510 g/L	SL	Fumical	IN.098-11/21	BIOPROTECTION	UPL/ARYSTA LIFESCIENCE	Tomate : Insectes du sol, Nématodes : 1L PC/10Ld'eau/10m²;Soit 1000 L/ha (traitement des planches de semis); Tabac : Insectes du sol, Nématodes : 1L PC/10Ld'eau/10m²,Soit 1000 L/ha (30 jours avant transplantation)
220	metarhiziumrileyi strain	PHP1705:1x108 CFU/g (1.0 W/W %)		Nomu-Protec	I.48-23	ALOHA	ANDERMATT PHP (Pty) AFRIQUE DE SUD	TOMATE : Noctuelles :300 g/ha Pulvérisation foliaire 09 applications au max/cycle Intervalle entre application:07 jours DAR:0 j (COMM 28/12/23)
221	Methoxyfenozone	240 g/l	SC	Runner	I.019-16	PROMOCHIMIE	DOW AGROSCIENCES/ corteva	Pommier : Carpacapse: 40 cc/hl(COMM09/02/2021)
222	Milbemectin	10 g/L	EC	Milbeknock	IA.103-11/21	AGRIPROTEC	Mitsui Chemicals Agro,Inc/summit agro	C.maraîchères, Arboriculture fruitière : Acariens, mouches mineuse, mouche blanche : 70 cc/hl Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :70 cc/Hl Volume de Bouillie :1000L/Ha Période de traitement: curatif Nbre de traitement: 01 Calendrier des applications début d'attaque DAR:14 jours AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
223	Natural Pyrethrin	20 g/l	EC	PULSEI EC	I.24-23	COTUGRAIN	SPEISA SA ESPAGNE	TOMATE SOUS SERRE : Mouche blanche (<i>Bemisiatabaci</i>):120 ml/100 litres PIMENT SOUS SERRE : Pucerons :120 ml/100 litres Réaliser 1 à 3 applications à l'intervalle de 07 jours COMMencer les traitements dès le début de

								l'infestation Les traitements doivent être effectués en ajustant le volume de bouillie pour avoir une bonne couverture de la plante. (COMM 28/12/23)
224	Oxamyl	100 g/l	SL	Vydate 10 L	128-11/21 I.	AGRIPROTEC	DU PONT/cortevaagris cience	Tomate: mouche blanche: 10 l/ha
225	Phosmet	50%	WP	Imidan 50 A	I.152-11/21	AGRIPROTEC	GOWAN/Espagne	Arbo: Carpocapse, teigne, ver de jeunes fruits, psylle :100 g/hl Poirier : Carpocapse:100 g/hl; Agrumes : Cératites : 100 g/hl (COMM 17/05/2016) Pêcher : Cératite : 150 g/hl, Mode d'action : contact, ingestion et inhalation;(COMM18/10/2017) Olivier: Dacus oleae:150 g/hl Volume de bouillie:1000 L/ha -pulvérisation foliaire en préventif -nombre d'application:2/an Calendrier d'application:dés le début du vol DAR:28 jours (com 27/12/22)
226	Phosmet	50%	WP	Foslete 50	I.011-13/23	EL KHADHRA	SIPCAM INAGRA	Arbo: Carpocapse, teigne, ver de jeunes fruits, psylle :100 g/hl; Poirier : Carpocapse:100 g/hl; Pêcher : Cératite: 150 g/hl (Ext : COMM 18/10/2017); Agrume: Cératite:100 g/hl ;-Pulvérisation foliaire avec 1 app/an (COMM 23/04/2019)(COMM 19 avril 2023)
227	Phosphure d'Al.	77,50%	ET	Quickphlo-R	I.153-11/21	PROTAGRI	UNITED PHOSPHORUS LTD	Amande, pistache, noisette, pignon, cacao, ect... : Insectes des denrées agro-alimentaires stockés Céréales, légumineuses : Insectes des denrées stockés Dattes stockées : Pyrale : Sachet de 125 gr pour 15 m3 soit 4 Tonnes (Fumigation par générateur de gaz en milieu hermétiquement fermé).
228	Phosphure d'Al. +Phosphure d'Hy.	57 % +33%	FU	Quickphos	I.154-11/21	PROTAGRI	UNITED PHOSPHORUS LTD	Désinfection des denrées stockées;Désinfection des dattes : 1 à 2 g/m3
229	Phosphure d'Al. +Phosphure d'Hy.	57 % +33%	ET	Detia Gas	I.142-11/21	STIMA	DETIA DEGUECH	Désinfection des denrées stockées;Désinfection des dattes : 1 à 2 g/m3 Fumigation des tomates fraîches stockées : 1.5 g/m3(Comm 16/07/2025)

230	Phosphure de Magnésium +Phosphure d'Hy.	57%+33%	PL	Magnaphos	I.171-11/21	PROTAGRI	UNITED PHOSPHORUS LTD	Dattes : Pyrale, ectomeyloïsciratonia :1 plaq./10m3 Tabac au stockage : Lasioderma serricorne : 1 plaq./30 m3 pendant 72 heure
231	Phosphure de Magnésium +Phosphure d'Hy.	57%+33%	PL	Deguech plate	I.143-11/21	STIMA	DETIA DEGUECH	Dattes : Pyrale, ectomeyloïsciratonia :1 plaq./10m3 Tabac au stockage : Lasioderma serricorne : 1 plaq./30 m3 pendant 72 heure
232	Pyradaben	200 g/kg	WP	RHAMSES 20 WP	I.34-23	PLANETE VERTE	ASTRANOVA	TOMATE SOUS SERRE : Acariens rouges:100 g/100 l DAR:03 jours (COMM 28/12/23)
233	Pyréthrine	40g/l	EC	ABANTO 40 EC	I.008-19	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAU GH EUROPE SARL	Piment : Mouche blanche(Aleurodes) :75cc/hl (30 g s.a/ha);-pulvérisation foliaire avec deux traitements au maximum.-stade d'app :au début de l'attaque, lorsque les premiers symptômes sont visibles, avant le rejet du NTA,-L'efficacité de produit s'étale sur 7 jours,, Pêcher : Pucerons: 75 cc/hl (30 g s.a/ha) -pulvérisation foliaire,-Nbre d'app :1 à 2 traitements par saison.-stade d'app :au début de l'attaque, lorsque les premiers symptômes sont visibles.L'efficacité de produit s'étale sur 15 jours(COMM23/04/2019) TOMATE SOUS SERRE : Mouche blanche : 75cc/hl 1à 2 applications par saison Volume de bouillie:800 à1000 l/ha (COMM 28/12/2023)
234	Pyrethrines	40 g/l	EC	KRISANT EC	I.31-23	PROMOCHIMIE	SIPCAM INGRA ESPAGNE	PIMENT SOUS SERRE :Mouche blanche (<i>Bemisiatabaci</i>):0.75 l/ha Appliquer le produit pendant tout le cycle de culture au début de l'infestation Nbre d'appli:2 avec intervalle entre les applide 07 j au min Volume de bouillie:1000 l/ha DAR:3 j (COMM 28/12/2023)
235	Pyrethrins	20 g/l	EC	PIRECRIS	I.008-22	ATLAS AGRICOLE	SeipasaS.A	Piment sous serre :Mouche blanche Bemisia tabaci:120cc/hl (1.2 l/ha) avec volume de bouillie:1000 l/ha Application foliaire en 3 application/cycle Intervalle 7 jours entre applications DAR:1j (COMM 08/06/22)
236	Pyrethrins	18, 61 g/l	EC	Piretro Verde	I. 012-17	STIMA	COPYR S.p.A	Agrumes :Mineuses : 160 cc/hl En trois (03) applications espacées de 7 jours.

								Mode d'action : contact et ingestion (COMM 18/10/2017) Tomate : Mouche blanche : 160 cc/hl (comm12/01/2018)
237	Pyridabène	100 g/l	SC	NEXTER 10 SC	25-35.I	AGRIPROTEC	NISSAN CHEMICAL CORPORATION/ BASF	Tomate sous serre: Acariens rouges <i>Aculops lycopersici</i> : 150 cc/hl Volume de bouillie:1000 Mode de traitement: foliaire Période de traitement (Préventif ou Curatif) : Curatif Nombre de traitements: 01 Calendrier des applications: dès le début de l'infestation DAR : 03 jours Tomate sous serre: Mouche Blanche <i>Bemisia tabaci</i> : 150 cc/hl Volume de bouillie:1000 l Mode de traitement: foliaire Période de traitement (Préventif ou Curatif) : Curatif Nombre de traitements: 01 Calendrier des applications: dès le début de l'infestation DAR : 03 jours Le produit est efficace contre les œufs et les formes mobiles des acariens Autorisation Provisoire de Vente (Comm 16/07/2025)
238	Pyridalyl	500 g/l	EC	Sumipleo50EC	I.015-16	AGRIMATCO	SUMITOMO	Tomate : Noctuelle : 0.2 l/ha TOMATE SOUS SERRE : <i>Tuta absoluta</i> :40cc/hl -pulvérisation foliaire au début de l'infestation (COMM 28/12/23)
239	Pyrifluquinazon	20%	SC	RYCAR SC	I.007-22	EL KHADRA	SIPCAM INAGRAS	Piment sous serre : Mouche blanche(<i>Bemisia tabaci</i>):25 cc/hl volume de bouillie:700-1000 l/ha -pulvérisation foliaire -Traitement: *1 ier quand un seuil de 10 insectes (larves et adultes) par plante est atteint *2ème 7 à 10 jours après le premier traitement (COMM 08/06/22) Agrumes : Cochenilles farineuses:25 cc/hl Volume de bouillie:600-1000 l/ha -pulvérisation foliaire -Traitement: appliquer au stade phénologique BBCH

								65(plein floraison:50% des fleurs sont ouvertes les premiers pétales tombant. (com 27/12/22) PIMENT SOUS SERRE : Thrips :25 cc/hl Volume de bouillie :700-1000 l/ha -pulvérisation foliaire -Traitement: *1 ier quand un seuil de 10 insectes (larves et adultes) par plante est atteint *2ème 7 à 10 jours après le premier traitement (COMM 28/12/2023)
240	Pyrimicarbe	50%	WG	y	L110-11/21	AGROSYSTEMES	GLOBACHEM	Betterave, Céréale, P.de terre, Arbo,C. ornementale : Pucerons : 70 g/hl
241	Pyrimicarbe	50%	WG	Tornado	L017-15/25	AMINCO	GLOBACHEM	Betterave, Céréale, P.de terre, Arbo,C. ornementale : Pucerons : 70 g/hl (comm 25 juin 2025)
242	PYRIMIPHOS METHYL	500 g/l	EC	ACTELIC EC	L02-24 Restriction d'usage: utilisation uniquement pour les sociétés productrices des semences	AGRIPROTEC	SYNGENTA	Grains de Céréales :Ravageurs des denrées stockées (Insectes Et Acariens) *100 ml/5 Litres d'eau/ 100 m2 (traitements des surfaces : Locaux Et Sacs Vides) *20 ml/Tonne dans 1 à 2 Litres d'eau (Traitement des denrées stockées) (COMM 22/02/2024)
243	Pyriproxifene	50 cc/hl	EC	DRASSEN	L06-23	AGRONOMIC LAND	jiangsukuaida/shan ghai shengnong pesticide	Agrume : Cochenille : Pou rouge de floride (<i>chrysomphalusaonidum</i>):50 cc/hl Pulvérisation foliaire Appliquer au début de l'incubation des nymphes et renouveler l'application à un intervalle de 7-15 jours DAR :28 jours (COMM 28/12/23)
244	Pyriproxifen	100 g/l	EC	LYNO EC	L27-23	PROTAGRI	NANJING CHINE(dis)/jiangs u (fab)	TOMATE SOUS SERRE : Mouche blanche:50 cc/hl 02 applications max durant 7 j d'intervalle DAR:7jours (COMM 28/12/23)
245	Pyriproxifen	100 g/l	EC	MAGIC EC	L009-22	Fertitech	HANGZHOU TOPAGRO BIOSCIENCE	Piment sous serre :Mouche blanche (Bemisiatabaci):0.5 l/havolume de bouillie:1000 l/ha-intervalle d'application:7 jours-fréquence:2 fois par saison-méthode d'application: par pulvérisation-DAR:3 jours. (COMM 08/06/22)

246	Pyriproxyfen + Spirotetramate	98 g/L + 98 g/L	OD	SPIROMAX OD	25-47.I	BIOPROTECTION	ALBAUGH	Tomate sous serre: Mouche blanche <i>Bemisia tabaci</i> : 45 ml/hl soit 450 ml/ha Volume de bouillie:1000 l Nbre d'app:1 dès l'apparition du ravageur DAR:7 jours Le produit est efficace contre les œufs, les larves, les pupes et les adultes de <i>Bemisia tabaci</i> APV (Comm 16/07/2025)
247	Pyriproxyfene	100 g/l	EC	MULIGAN	I.001-18	AGRIPROTEC	PROPLAN/QUME TICA AGRICULTURAL SOLUTIONS SPAIN SLU	Tomate : Mouche blanche :50 cc/hl (12/01/2018)
248	Pyriproxyfene	100 g/l	EC	PROXIMO EC	I.002-18	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Tomate : Mouche blanche /75 cc/hl (12/01/2018) Agrumes: Cochenille australienne:50 cc/hl -Pulvérisation foliaire avec une seule application par compagne (COMM 23/04/2019)
249	Pyriproxyfene	100g/l	EC	BRAI EC	I.006-19	RAYEN PHYTAGRI	LAINCO SA	Agrumes: Cochenilles australienne: 50 cc/hl ; -Avec restriction d'usage deux application au maximum par cycle de culture (COMM 23/04/2019)
250	Pyriproxyfene	100g/l	EC	PROXYGOLD EC	I.044-22	NEGANOR	LAINCO SA	Agrumes: Cochenilles australienne : 50 cc/hl (com 27/12/22)
251	Sesame oil + Clove oil + Sunflower oil, Horseradish oil & Polyglyceryl oleate	5% + 1% + 94%		ARMOREX	25-42.I	ALOHA	SOILTECHNOLOGIE/AMERIQUE	Tomate sous serre: Tuta absoluta: 0.33 l/ha Nombre d'application :03 app de 14 j entre 2 app DAR:0 jour Le produit est principalement efficace contre les larves de Tuta absoluta. Autorisation Provisoire de Vente (Comm 16/07/2025)
252	Spinetoram + Methoxyfenozone	60g/l+300g/l	SC	UPHOLD SC	I.36-23	ATLAS AGRICOLE	CORTIVA	TOMATE SOUS SERRE : Noctuelles : 35 cc/hl Application foliaire 1 à 3 traitements par cycle de culture Traitement dès l'observation des larves Durée de protection 10 à 15j suivant le degré d'attaque et les conditions climatiques (COMM 28/12/2023)
253	Spinetoram + Sulfoxaflor(Isoclast TM active)	100g/kg+300g/kg	WG	FIDELITY WG	I.32-23	SEPCM	CORTEVA	TOMATE SOUS SERRE :Pucerons : 0.08 kg/ha -3 trait. dès l'apparition des ravageurs -Intervalle de trait 7j -répéter selon l'ampleur de l'infestation -volume de bouillie 1000 l/ha -DAR :7j TOMATE SOUS SERRE: Thrips: 0.25 kg/ha

								-3 trait. dès l'apparition des ravageurs -Intervalle de trait 7j -répéter selon l'ampleur de l'infestation -volume de bouillie 1000 l/ha -DAR :7j(COMM 28/12/2023)
254	Spinosad	10%	SC	SUCCESS SC	I.16-23	PROTAGRI	NANJING AGROHEMICAL CHINE	TOMATE SOUS SERRE :Tutaabsoluta :120 cc/hl Traitement des parties aériennes Intervalle de traitement 7-14 jours DAR:35 jours (COMM 28/12/2023)
255	Spinosade	480 g/l	SC	SPINO 480 SC	I.017-22	EL KHADRA	BAICO BIOTECH CO,LTD/	Tomate sous serre :Tuta absoluta:0.25l/ha (25 cc/hl) Volume de bouillie:800-1000 l -pulvérisation foliaire -1 à 2 traitements par saison -au début de l'attaque, lorsque les premiers symptômes sont visibles. -DAR:0 jours. (COMM 08/06/22) Pomme de terre de conservation :Teigne :5cc/hl -pulvérisation sur tubercules, par trempage -moment: pendant la conservation. -DAR:0 jours AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (comm22/05/2024)
256	Spinosade	480 g/l	SC	Spanvic	I.13-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE :Tutaabsoluta :25 ml/hl 1 à 2 applications Volume de bouillie:600-900 l/ha (COMM 28/12/2023)
257	Spinosade	480 g/l	SC	SPINOZAR 480 SC	I.12-24	PLANETE VERTE	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE :Tutaabsoluta :25 ml/hl 1 à 2 applications Volume de bouillie:600-900 l/ha (COMM 22/05/2024)
258	Spinosade	240 g/L	SC	LASER 240 SC	I.010-13/23	ATLAS AGRICOLE	DOW AGROSCIENCE/c orteva agriscience	Tomate : Tutaabsoluta : 50 cc/hl Tomates s/serres : Mouches mineuses : 60 cc/hl Cultures s/serres : Mouches blanches : 60 cc/hl Vigne, fraisier : Thrips: 40 cc/hl P. de terre de conservation : Teigne : 10 cc/hl par pulvérisation ou trempage(COMM 19 avril 2023)

259	Spinosade	0,24 g/L	CB	Spintor	I.007-14/24	ATLAS AGRICOLE	DOW AGROSCIENCE/ CORTEVA	Agrumes : Cératite : - 1 L/ha T.Terrestre- - 1.25 L/ha T.Aérien Olivier : Mouches de l'olivier:1L/ha T.Terrestre 10 à 50 L bouillie1L/ha T.Aérien 1 L/0,5 ha par bande (comm 22 mai 2024)
260	Spinosade	480 g/l	SC	SPINOBEST	I.53-23	TASMID	BAICO BIOTECH CO,LTD/	Tomate sous serre :Tuta absoluta:0.25l/ha (25 cc/hl) Volume de bouillie:800-1000 l -pulvérisation foliaire -1 à 2 traitements par saison -au début de l'attaque, lorsque les premiers symptômes sont visibles. -DAR:0 jours. (COMM 28/12/2023)
261	Spinosade	480 g/l	SC	PLATINUM SC	25-38.I	NEGANOR FFT	HEBEI VEYONG BIO HEMICAL(fab/N ANJING/dis)	Tomate sous serre:Tuta absoluta: 25 cc/hl (0.25 l/ha) Volume de bouillie:1000 l/ha Application foliaire en préventif et curative Nbre d'app:1-2 app /cycle DAR:03 jours Le produit est efficace contre les œufs et larves de Tuta absoluta. AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (Comm 16/07/2025)
262	Spirodiclofen	24%	SC	SPIRIDOR 240 SC	I.01-21	SHARDA CROPChem LIMITED Tunisie	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Agrumes :Acariens(TetranychusUrticae) :40 cc/hl le produit présente un effet toxique significatif sur les prédateurs respectivement aux 14ème et 21ème jours après traitement.(COMM09/02/21)
263	Spirodiclofen	24%	SC	SPIDER EXTRA SC	I.026-22	SANABEL AGRO	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Agrumes :Acariens(TetranychusUrticae) :40 cc/hlle produit présente un effet toxique significatif sur les prédateurs respectivement aux 14ème et 21ème jours après traitement (COMM 08/06/22) Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :40ml/Hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
264	Spirodiclofen	240 g/L	SC	Bolido 240 SC	IA.114-11/21	PROMOCHIMIE	BAYER CROPSCIENCE/G OWAN	Poirier : Psylle : 60 cc/hl Pommier, tomate, vigne,Agrumes : Acariens : 40 ml/100 L soit 0,4 L/ha Tomate : Mouches blanches : 40 ml/100 L soit 0,4 L/ha
265	Spirodiclofen	240 g/L	SC	Envidor	IA.115-11/21	STEC	BAYER CROPSCIENCE/g	Pommiers; Agrumes : Acariens : 40 cc/hl Poirier : Psylle : 60 cc/hl

							owan	Pommier, tomate, vigne : Acariens : 40 ml/100 L soit 0,4 L/ha Tomate : Mouches blanches : 40 ml/100 L soit 0,4 L/ha
266	Spirodiclofen	240 g/l	SC	ASKARI 240 SC	I.002-22	SEPCM	AAKO	Agrumes :Acariens(Tetranychusurticae):40 cc/hl -volume de bouillie :1000 l/ha Intervention:dés que les œufs sont en cours d'éclosion pour obtenir une efficacité optimale. Stade d'application: à la chute des pétales jusqu'au début de maturation des fruits. DAR:14 jours(COMM 08/06/22)
267	Spirodiclofen	240 g/l	SC	PROSPIRO	I.28-25	BIOPROTECTION	AAKO	Agrumes :Acariens(Tetranychusurticae):40 cc/hl -volume de bouillie :1000 l/ha Intervention:dés que les œufs sont en cours d'éclosion pour obtenir une efficacité optimale. Stade d'application: à la chute des pétales jusqu'au début de maturation des fruits. DAR:14 jours (COMM 25/06/25)
268	Spirodiclofen	240 g/l	SC	ACAROS SC	I.012-22	STEC	Shandong Kangqiao NANJING Agrochemical	Tomate sous serre :Mouche blanche(Bemisiatabaci):40 cc/hl Volume de bouillie:600-1000 l -pulvérisation foliaire -01 app par cycle (COMM 08/06/22)
269	Spirodiclofen	240 g/l	SC	SPOZINE SC	25-45.I	COTUGRAIN Impex	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD CHINE	Tomate sous serre: Mouche blanche Bemisia tabaci : 40 ml/hl Volume de bouillie:400-600 l/ha Nombre d'application : 01 application Le produit est efficace contre les œufs, les larves, les pupes et les adultes de Bemisia tabaci. APV (Comm 16/07/2025)
270	Spirodiclofen	240 g/l	SC	SPIROFEN	01-24.I	Ste ELKHADRA	EASTCHEM CO.Ltd	Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :40 cc/Hl Volume de Bouillie :800-1000L/Ha DAR 14 jours Nbre d'app :1à 2 applications/saison AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
271	Spirodiclofen +Abamectine	240 g/l + 10g/l	SC	MISKY SC	I.03-25	PROTAGRI	NANJING CHINE	Agrumes :Acariens (TETRANYCHUS URTICAE) :25cc/hl Nombre d'application :1 app maximum/saison DAR:30 jours L'efficacité de produit contre les formes mobiles de l'acarion est observée à partir du 3^{ème} jour et

								elle dure 21 jours. (Comm 25/06/2025)
272	Spirodiclofene	240 g/l	SC	BRINKA SC	I.04-25	EL MOUSSEM	UPL	Agrumes :Acariens (TETRANYCHUS URTICAE) :20 ml/hl (200 ml/ha) Nombre d'application :1 app maximum/saison Débuter les applications dès l'observation de la forme mobile des acariens DAR:30 jours L'efficacité de produit contre les formes mobiles de l'acarien est observée à partir du 14^{ème} jour et elle dure 21 jours. (Comm 25/06/2025)
273	Spiromesifen	240 g/L	SC	Oberon 240 SC	IA.116-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Tomate : Acariens : 60 cc/hl Piment : Mouches blanches : 50 cc/hl Pommier : Acariens : 40 cc/hl Concombre : acariens : 50 cc/hl (comm12/01/2018) Agrumes:Acariens (Tetranychusurticae):50 cc/hl avec un volume de bouillie :1000-2500 l/ha Stade d'application:BBCH85-89 (Ext ; COMM 08/06/22) Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :50 cc/Hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
274	Spiromesifen	24%	SC	SPYRITE SC	25-52.I	FERTITECH	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Tomate sous serre: Mouche Blanche Bemisia tabaci : 50 cc/hl Volume de bouillie 800 l/ha Le produit est efficace contre les œufs, les larves, les pupes et les adultes de Bemisia tabaci APV (Comm 16/07/2025)
275	Spiropidion	300g/l	SC	ELESTAL300 SC	I.01-23	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Agrumes :Cochenille : Pou rouge de floride (chrysomphalusaonidum) ;Pou rouge de Californie aonidiella Aurantii:0.8l/ha Volume de bouillie:500-600 l/ha 1 à 2 applications (COMM 28 dec 2023) (COMM22/05/2024)
276	Spirotetramat	150 g/L	OD	Movento 150 OD	I.117-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Agrumes : Cochenilles : 120 cc/hl soit 1,2 L/ha Pecher : Pou de San Jose :1 l /ha Tomate : Tutaabsoluta : 50 cc/hl Vigne : Cochenille farineuse : 1,2 L/ha (COMM 06/12/2012) PIMENT SOUS SERRE :Thrips :0.5 l/ha Volume de bouillie :400-1000 l/ha pulvérisation foliaire

								Dés l'apprition des symptômes(COMM28/12/2023)
277	Spirotetramat	240g/l	SC	Natramat 240SC	I.02-23	AGRIPROTEC	Jiangsu United Agrochemical/nanjing	Agrume: Cochenille : Pou rouge de floride (<i>chrysomphalusonidum</i>):1.2 L/ha Volume de bouillie:1000 l Mode de traitement: foliaire Période de traitement (Préventif ou Curatif) : Curatif Nombre de traitements : 02 Calendrier des applications : Utilisez avec un intervalle de 21-35 jours DAR : 20 jours(COMM 28/12/2023)
278	Spirotetramat	22.4%	SC	MAGNUS SC	I.29-23	STEC	AAKO	TOMATE SOUS SERRE : Mouche blanche (Bemisiatabaci):0.4 l/ha 800-1000 l/ha Appliquer au tout début des infestations et /opudés l'arrivée des adultes sur la culture Repeter l'application selon intervalle de 14 jours en cas de forte pression du ravageur DAR:3 jours(COMM 28/12/2023)
279	Spirotetramat	22.4%	SC	MAXIMUS SC	I.26-25	BIOPROTECTION	AAKO	TOMATE SOUS SERRE : Mouche blanche (Bemisiatabaci): 0.4 l/ha Volume de bouillie :800-1000 l/ha Appliquer au tout début des infestations et /opudés l'arrivée des adultes sur la culture Repeter l'application selon intervalle de 14 jours en cas de forte pression du ravageur DAR:3 jours (COMM 25/06/2025)
280	Spirotetramat	10%	SC	OPTIMUM PRO SC	I.18-25	SOLAGRI	Sharda Cropchem INDE	Agrumes : Cochenille « pou rouge de californie A. aurantii » : 1.5 l/ha 02 applications DAR:14 jours Le produit est efficace contre les stades matures et immatures d'A. aurantii l'efficacité est observée à partir du 7^{ème} jour et elle dure 21 jours. (Comm 25/06/2025)
281	Spirotetramat +buprofezin	11% + 22%		ULTOR 33 SC	I.16-25	PROMOCHIMIE	Shaanxi hengtian biological agriculture/chine	Agrumes : Cochenille « pou rouge de californie A. aurantii » : 50 cc/hl Volume de bouillie:1000 l/ha Appliquer le produit pendant tout le cycle Nbre max d'appli:2 DAR:35 jours Le produit est efficace contre les stades matures et immatures d'A. aurantii l'efficacité est observée à partir du 7^{ème} jour et elle dure 21

								jours. (Comm 25/06/2025)
282	SpliNPV (Spodopteralittoralisnucleopolyhedrovirus)	5 x 1011 corps viraux/litre	SC	LITTOVIR	I.007-19	ALOHA AGRICULTURE	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Fraisier: Noctuelle: 200 cc/hl;(COMM 23/04/2019)
283	Spores de lecanicillumuscarium souche 1979	48 g/kg (1.1*1010 spores/g)	WG	MYCOTAL WG	I.004-18	NUTRIPLANT	KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEM	Tomate: Aleurodes;(mouches blanches) 1g/l de produit + 2.5 ml/l de adpro (adjuvant) (12/01/2018)
284	Sulfoxaflor	240 g/l	SC	Closer 240 SC	L.008-15/25	SEPCM	DOW AGROSCIENCE/c orteva	Agrumes : Cochenilles : 20 cc/hl Agrumes : Pucerons : 12.5 cc/hl Tomate : Mouche blanche : 250 ml/ha (COMM 12/01/2018)(comm25 juin 2025)
285	Sulfoxaflor	240 g/l	SC	TRANSFORM SC	L.55-23	AGRIPROTEC	DOW AGROSCIENCE/c orteva	Agrumes : Cochenilles : 20 cc/hl Agrumes : Pucerons : 12.5 cc/hl Tomate : Mouche blanche : 250 ml/ha (COMM 12/01/2018)(COMM 28 dec2023)(comm 25 juin 2025)
286	Tau-fluvalinate	240 g/L	EW	Mavrik 2 F	I.173-11/21	STEC	AAKO	Tomate, piment, pommier : Pucerons : 100 cc/hl Pommier : Carpocapse : 100 cc/hl
287	Tau-fluvalinate	240 g/L	EW	ARPEGE	I.27-25	BIOPROTECTION	AAKO	Tomate, piment, pommier : Pucerons : 100 cc/hl Pommier : Carpocapse : 100 cc/hl (Comm 25/06/2025)
288	Tebufenozide	240 g/l	SC	MIMIC 240 SC	I.09-25	EL MOUSSEM AGRICOLE	/NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH/Allemagne (NIPPON SODA/Japan)	Agrumes :Mineuse des agrumes (<i>Phyllocnistis citrella</i>): 60 cc/hl (0.6l/ha) -pulvérisation foliaire -nbre max :2/cycle -réaliser le traitement dès l'apparition des premiers larves.les meilleurs efficacités sont observées lorsque le traitement intervient avant l'apparition des premières mines. Sur la période estivale.une seconde application peut être nécessaire. Dans ce cas, retirer l'application après 10-14 jours. DAR:14 jours LMR:2 mg/Kg (agrumes) Le produit est efficace contre les larves de la mineuse des agrumes, l'efficacité est observée à partir du 3^{ème} jour et elle dure 14 jours. (Comm 25/06/2025)
289	Tebufenpyrad	20%	WP	MASAI	I.A.007-13/23	AGRIPROTEC	BASF/belchim/CeratisBelchimN.V	Pommier: Acariens: 50 g/hl Agrume: Acariens:50g/hl (COMM 17/05/2016). Fraisier: Acariens "Tetranychusurticae" -Mode d'action : contact et ingestion:50g/hl - Le produit montre une écotoxicité inacceptable

								pour le prédateur <i>Phytoseiulus persimilis</i> durant quelques jours après le traitement (COMM 23/04/2019) (COMM 19 avril 2023) Palmier dattier : acarien " <i>Oligonychusafrasicus</i> " :50 g/Hl Volume de Bouillie :1000 L/Ha Période de traitement: curatif Nbre de traitement: 01 Calendrier des applications: début d'attaque DAR:21 jours AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
300	Tefluthrine	0,50%	GR	VOLTRA 0.5 G	I.005-20	COTUGRAIN	SYNGENTA	Piment : Insectes du sol : 15 Kg/ha Pomme de terre : Taupins : 15 kg/ha (application localisée par ligne au stade 2-3 feuilles) Betterave : Taupins (Vers fil de fer) : 15 Kg/ha (COMM13/02/2020).
301	Tefluthrine	0.5%	GR	DIASTAR MAXI GR	I.05-21	RAYEN PHYTAGRI	DIACHEM	Pomme de terre: Insectes du sol (vers fil de fer) :15Kg/ha -Epandage localisé sur la ligne de plantation -1 Application par cycle de culture - Appliqué à la plantation (repiquage) ou au semis (COMM09/02/21)
302	Tolfenpyrade	150 g/l	EC	HACHI-HACHI EC	I.20-23	EL KHADRA	SIPCAM INAGRA	TOMATE SOUS SERRE: <i>Tuta absoluta</i>:50 cc/hl PIMENT SOUS SERRE: Mouche blanche (<i>Bemisia tabaci</i>):50 cc/hl -Traitement foliaire -Bouillie : 700 à 1000 l d'eau/ha Traitement : *1^{er} trait. Quand un seuil de 10 insectes (larves et adultes) par plante est atteint *2^{ème} trait. De 7 à 10 jours après le premier traitement. (COMM 28/12/2023)

II. FONGICIDES

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
01	Adepidyn+ Difenconazole	75 g/l+125 g/l	SC	Miravis duo Sc	F.11-21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Tomate: Alternaria(Alternariasolani):0.75 l/ha -Trois applications /cycle/15 jours Pastèque: Oidium (Sphaerothecafuliginea);0.75 l/ha 03 traitement/cycles/ 15 jours -1ere application après 15 jours de repiquage Vigne: Oidium(Uncinulanecator):0.65 l/ha (COMM09/02/21)
02	Ametoctradin+ Dimethomorph	300 g/L + 225 g/L	SC	Orvego	F.002-14/24	AGRIPROTEC	BASF	Pomme de terre : Mildiou : 0.8 l/ha(comm 22 mai 2024)
03	Ametoctradine	200 g/l	SC	SNOOKER SC	F.003-19	STIMA	BASF	Tomate: Mildiou:150 cc/hl(1.5 l/ha),-pulvérisation foliaire;-nbre de traitement max :3 (COMM23/04/2019)
04	Amisulbrom	200g/l	SC	LEIMAY 20 SC	F.014-17	EL MOUSSEM AGRICOLE	NISSAN CHEMICAL EUROPE SAS/ARYSTA LIFESCIENCES/UPL	Tomate : Mildiou: 600 ml/ha; Pomme de terre : Mildiou : 500 ml/ha;(COMM du 20/06/2017); Vigne : Mildiou : 375 ml/ha(COMM 18/10/2017)
05	Aureobasidiumpullulans DSM 14940 et aureobasidiumpullulans DSM 14941	500g/kg(2.5*109 CFU/g)500g/kg(2.5*109 CFU/g) ou 50%+50%	WG	BOTECTOR WG	F.22-21	STIMA	BIOFERM/SAN AGROW/autriche	Vigne: Pourriture grise(Botrytis cinerea): 1 kg/ha 04 Applications au total: -BBCH 68-89 (soit 80% des chapeaux floraux tombés, -BBCH77 soit avant la fermeture de la grappe, -BBCH85 soit avant la véraison, pendant le ramollissement des baies ,ou pendant la maturation, -BBCH85-89 entre la véraison et le vendange(COMM09/02/21)
06	Azoxystrobin + Flutriafol	25%+12.5%	SC	CURAX EXTRA SC	F.009-20	SHARDA CROPChem LIMITED TUNISIE	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Blé: Rouille(puccinia spp):0.5 l/ha -2 applications d'intervalle 3 semaines (COMM13/02/2020)
07	Azoxystrobin + Flutriafol	25%+12.5%	SC	CURATEX EXTRA SC	F.63-21	AGRIMED DISTRIBUTION	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Blé: Rouille (puccinia spp):0.5 l/ha -2 applications d'intervalle 3 semaines (COMM09/02/21)(COMM08/06/22)(COMM 28 dec2023)
08	Azoxystrobine	25%	SC	SORBISTAR	F.040-22	SOCOOPEC	ZHEJIANG E-TONG CHEMICAL	Melon: Oidium:30 cc/hl (COMM 08/06/22)
09	Azoxystrobine	25%	EC	ASTRO EC	F.26-23	TASMID	ZHEJIANG E-TONG CHEMICAL	Melon: Oidium:30 cc/hl (COMM 28/12/23)

10	Azoxystrobine	250 g/l	SC	LEGADO 250 SC	F.014-18	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Blé : Rouille : 0.8 l/ha (300-400 l/ha) (Pulvérisation foliaire; nbre de Trait. :2 au max (intervalle min de 14 j)/par cycle de culture; Calendrier des applications :1 ^{er} trait à BBCH31-39 et le 2 ^{ème} à la fin de la floraison (BBCH69) (la s.adoit être appliquée avant ou au début de l'infection);DAR : 35 j;(COMM 18/10/2018)
11	Azoxystrobine	250 g/l	SC	Azox SC	F.039-17	Ets MEZGHANNI	JIANGYIN SULI CHEMICAL CO.LTDi,Q.Key	Blés : Septoriose: 0.8 l/ha (300 l/ha)(COMM 18/10/2017); Blé : Rouille : 0.8 l/ha;traitement foliaire; DAR : 42 jours)(COMM 18/10/2018)
12	Azoxystrobine	50%	WG	AXYTOP 50WG	F.060-22	EXCEL AGRI	SHARDA CROP CHEM INDE	Blé dur : Septoriose : 0.4 kg/ha (COMM 08/06/2022)
13	Azoxystrobine	50%	WG	Cayen 500 WG	F.035-16	RAYEN PHYTAGRI	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Blé dur : Septoriose : 0.4 kg/ha
14	Azoxystrobine	250 g/l	SC	SINSTAR SC	F.030-17	SANABEL AGRO	SINON CORPORATION	Blés : Septoriose: 0.8 l/ha (COMM 18/10/2017); Féverole :Botrytis : 0.75 l/ha ;(300 l/ha)(Pulvérisation foliaire;01 traitement par cycle à l'apparition des premiers symptômes; 4 semaines de protection)(COMM18/10/2018)
15	Azoxystrobine	250 g/L	SC	Globaztar 250 SC	F.017-13/23	AGROSYSTEMES	Globachem	Blé : Septoriose : 0,8 l/ha(COMM 19 avril 2023)
17	Azoxystrobine	250 g/L	SC	Zaftra SC	F.034-15/25	AMINCO	Globachem	Blé : Septoriose : 0,8 l/ha(comm 25 juin 2025)
18	Azoxystrobine	250 g/L	SC	azimut SC	F.48-21	ATLAS AGRICOLE	NUFARM	Blé : Septoriose, rouille : 0,8 l /ha Orge : Helminthosporiose ,Rinchosporiose: 0.8 l /ha(COMM09/02/21)
19	Azoxystrobine	250 g/L	SC	Affix 250SC	F.030-16	PROTAGRI	UPL	Blé dur : rouilles : 0,8 l /ha
20	Azoxystrobine	250 g/L	SC	Aroxy 250SC	F.074-22	AGRIMATCO	UPL	Blé dur : rouilles : 0,8 l /ha (COMM 27/12/22)
21	Azoxystrobine	250 g/L	SC	HYDO 250 SC	F.34-21	STEC	nanjing agrochemical/JIANGYIN SULI CHEMICAL	Blé dur :Septoriose(Septoriatritici) :0.8 l/ha(300 l/ha) -pulvérisation foliaire -nbre max :2/an -DAR:42 jours(COMM09/02/21)
22	Azoxystrobine +Cyproconazole	200g/l + 80 g/l	SC	COUGAR SC	F.016-18	PROTAGRI	UPL LIMITED	Blé : septoriose : 0.5 l/ha (Traitement par pulvérisation)(COMM 18/10/2018)
23	Azoxystrobine +Cyproconazole	200g/l + 80 g/l	SC	DOUBLE FORCE	F. 029-17	SANABEL AGRO	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Blés : Septoriose: 0.75 l/ha (COMM 18/10/2017)
24	Azoxystrobine +Difenoconazole	200 g/l+125 g/l	SC	ALLIANCE TOP SC	F.011-22	AGRI PLUS	NANJING AGROCHEMICAL	Vigne : Mildiou Plasmopara viticola : 50 cc/hl -le produit s'applique en préventif et curatif par pulvérisation foliaire, juste avant ou au début de l'infection. -une bonne efficacité après 10 jours de la dernière

								application -DAR :7 jours (COMM 08/06/22)
25	Azoxystrobine +Difenoconazole	200 g/l+125 g/l	SC	AMISCORE SC	F.014-22	PROTAGRI	NANJING AGROCHEMICAL	Vigne: Mildiou (Plasmopara viticola):50 cc/hl Appliquer dès l'apparition des premières symptômes.lorsque le risqué d'infection est grand repete à intervalles réguliers-DAR:14 jours (COMM 08/06/2022)
26	Azoxystrobine + Tebuconazole	200g/l + 200 g/l	SC	START-UP	F.038-15/25	BIOPROTECTION	AAKO	Blé: Septoriose:1 l/ha (COMM 04/11/2015) (Comm 25/06/2025)
27	Azoxystrobine + Tebuconazole	80 g/l + 160g/l	SC	Altitud Gold 240SC	F.025-16	SANABEL AGRO	ROTAM AGROCHEMICALS/rival e	Blé dur : Rouilles : 1l/ha; Vigne : Oïdium : 50 cc/hl (COMM 18/10/2017)
28	Azoxystrobine +Difeconazole	125 g/l+125 g/l	SC	PRIORI GOLD 250 SC	F.40-21	SOLAGRI	SYNGENTA Crop Protection	Blé dur: Septoriose(Septoriatriitici) ,Rouille :1 l/ha(250-350 l/ha) :1 l/ha(250-350 l/ha) -application foliaire -nombre max :2 -intervalle d'application minimale : 14 jours -DAR:35jours(COMM09/02/21)
29	Azoxystrobine +difenoconazole	200 g/l+125 g/l	SC	Black panther SC	F.009-22	FERTITECH	HANGZHOU TOPAGRO BIOSCIENCE	Vigne: Oïdium(Uncinulanecator): 450 ml/ha -volume de bouillie:1000 l/ha - Traitement foliaire Nombre max de traitement 3 app Intervalle entre les traitements :7-15 jours DAR :7 jours(COMM 08/06/22)
30	Azoxystrobine +difenoconazole	200 g/l+125 g/l	SC	FULL TOP SC	F.08-25	NEGANOR	NANJING Agrochemical /chine	Vigne :oidium (Uncinula necator) : 50 cc/hl Volume de bouillie:1000 l/ha --Produit à action curative -Par pulvérisation foliaire -Débuter les applications dès l'apparition des premiers symptômes du champignon. -Max 6 applications/saison DAR:15 jours (Comm 25/06/2025)
31	Azoxystrobine +Difenoconazole	200 g/L +125 g/L	SC	AZ-TOP SC	F.003-20	SLDA	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Féverole: Anthracnose (Aschochyta fabae):0.5l/ha; -Application foliaire (un seul traitement par cycle);-Traiter dès l'observation des premiers symptômes d'attaque. -La durée de protection est variable de 14 à 21j suivant le degré d'infestation et les conditions climatiques(COMM13/02/2020)

32		200 g/L +125 g/L	SC	Ortiva TOP	F.004-18	SOLAGRI	SYNGENTA	Vigne :Oïdium, black-rot : 50 cc/hl; Légumineuses : Anthracnose : 50 cc/hl; Cucurbitacées : Mildiou, oïdium : 50 cc/hl; Tomate :Mildiou, oïdium : 50 cc/hl; Oignon, ail : Rouille : 50 cc/hl; Vigne : Mildiou : 50 cc/hl. Betterave : Cercosporiose : 50 cc/hl,
33	Azoxystrobine +flutriafol	125 g/l+125 g/l	SC	Impact max SC	F.037-22	AGRIPROTEC	Cheminova/FMC	Blé tendre: Rouille:0.6 l/ha Volume de bouillie:200-400 l/ha Pulvérisation foliaire Période de traitement :préventif ou curatif Nombre max de traitement :2 Stade d'application :dès l'apparition des premiers symptômes DAR :30 jours(com 27/12/22)
34	Azoxystrobine +flutriafol	296 g/l+218 g/l	SC	NANOK	F.16-23	AGRIPROTEC	FMC	TOMATE SOUS SERRE :Oïdium(<i>Leveillulataurica</i>) :0.3 l/ha Volume de bouillie :500-1000 l Pulvérisation foliaire Préventif en conditions favorables du développement de la maladie nbre d'app:4/saison app à un intervalle de 7-21 jours DAR:1 jour (COMM 28/12/2023) Vigne :oidium (<i>Uncinula necator</i>) : 5 kg/ha 6 applications/an Stade d'application: BBCH11-82 7 jours DAR:1 jour DRE:6 heures ZNT:5 m (Comm 25/06/2025)
35	Azoxystrobine +Mefenoxam(metalaxyl-M)	322 g/l + 124 g/l	SE	UNIFORM 446	F.132-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Pastèque,Melon :Monosporascus, Macrophomina (pourriture charbonneuse): 1 l/ha ; Fraisier : déperissement (Phytophthora spp) : 1l/ha; Tomate,Piment : pourriture brune du collet : 1l/ha
36	Bacillus amyloliquefaciens QST713SCmin	1.0 x109 cfu/g de bacillus subtilis QST 713	SC	SERENADE PRIME	F.13-21	EL MOUSSEM	Bayer AG	Tomate sous serre :Pourriture grise(Botrytis cinerea) :6 L/ha -3 applications à un intervalle de 10-15 jours.(COMM09/02/21) Laitue : Pourritures (Sclerotiniasclerotiorum&Botrytis cinerea: 6 L/ha par pulvérisation foliaire(COMM 08/06/22)

								COURGETTE SOUS SERRE : pourriture grise(Botrytis cinerea): 6 l/ha (comm 28/12/2023)
37	Bacillus amyloliquefaciens souche FZB24:	130 g/kg	WP	Taegro	F.006-22	COTUGRAIN	Novozymesbiologicalsinc/ syngenta	Vigne: Oidium(Uncinulanecator):370 g/ha nbre d'app:10 app à un intervalle de 07 jours stade d'app:BBCH11-BBCH89 DAR:4 heures Tomate sous serre: Oidium(Leveillulataurica):185 g/ha Nbre d'app:12 avec un intervalle de 03 jours entre les applications Stade d'app:BBCH11-BBCH89 DAR:4 heures(COMM 08/06/22) Piment : oidium (Leveillula taurica): 370 g/ha Tomate : pourriture grise (Botrytis cinerea) :370 g/ha (Comm 16/07/2025)
38	Bacillus subtilis de souche Y 1336	1x10 ⁹ CFU/g	WP	BIOBAC	F.131-11/21	BIOPROTECTION	BION TECH INC/ AAKO	Fraisier, Tomate: Botrytis : 150 g/hl soit 1.5 kg/ha Palmer dattier : Dessèchement Foliaire(Alternariaaliet ,Alternariaarborescens) :150g/hl traitement en curatif dès l'apparition des symptômes de dessèchement sur les palmiers(APV)(COMM09/02/21)
39	Bacillus subtilis strain IAB/BS03	1x10 ⁸ ufc/g	SL	Fungisei SL	F.008-22	ATLAS AGRICOLE	SEIPASA S A/	Vigne: Oidium Uncinulanecator:150 ml/hl(1.5 l/ha) -volume de bouillie:400 l/ha Application foliaire Intervalle entre application :7 à10 jours Tomate sous serre: Pourriture grise (Botrytis cinerea):150 ml/hl ou 1.5 l/ha) Application foliaire ; Intervalle entre application :7 à10 jours (COMM 08/06/22)
40	Borax	10 g/L	SL	Orotun	I.A.F.017-16	RAYEN PHYTAGRI	ORO AGRI	Vigne, fraise :Mildiou,Cochenillefarineuse,pourriture :300 cc/hl; Vigne : Oidium : 200 cc/hl; Tomate : Acariens : 300 cc/hl; Tomate : Mouches blanches : 320 cc/hl
41	Boscalid	50%	WG	Cantus WG	F.005-11/21	STIMA	BASF	Vigne : Botrytis : 75 g/hl
42	Boscalid	50%	WG	MASTOR WG	F.47-21	rayenphytagri	BASF	Vigne : Botrytis : 75 g/hl(COMM09/02/21)
43	Boscalid + Cyprodinil	220 g/l + 65 g/l	SC	BOSPEL PLUS SC	F.35-25	NEGANOR FFT	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL	Tomate : pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>) :0,8 L/ha

							CO.LTD CHINE	Volume de bouillie:600-800 l/ha 01 application Dés l'apparition des symptômes (Comm 16/07/2025)
44	Boscalid + Pyraclostrobin	25.2%+ 12.8%	WG	BOOSTER WG SOUS RESERVE DE CHANGEMENT DE NOM COMMERCIAL	F.013-25	NEGANOR	NANJING Agrochemical /chine	Vigne :Pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>) :650 g/ha Volume de bouillie:1000 l/ha -Produit à action préventive et curative -Par pulvérisation foliaire -Débuter les applications avant le développement de la maladie et poursuivre en respectant un intervalle de 7 à 14 jours. -Max 4 applications/saison DAR:15 jours (Comm 25/06/2025)
45	Boscalid + Pyraclostrobin	25.2%+ 12.8%	WG	ESSENCE Xtra WG	F.14-25	SOLAGRI	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD CHINE	Vigne : Pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>) :650 g/ha -volume de bouillie 800-1000 l/ha -dés l'apparition des symptômes (Comm 25/06/2025)
46	Boscalid +Krésoxym-Methyl	200 g/L +100 g/L	SC	hexagon SC	F.45-21	cotugrain	BASF	Vigne : Botrytis, oïdium : 40 cc/hl (au stade floraison à la véraison de la culture) (COMM09/02/21)
47	Boscalid +Krésoxym-Methyl	200 g/L +100 g/L	SC	Collis 300SC	F.007-11/21	STIMA	BASF	Vigne : Botrytis, oïdium : 40 cc/hl (au stade floraison à la véraison de la culture)
48	Boscalid +Pyraclostrobin	25,2 % +12,8%	WG	Pristine WG	F.006-11/21	AGRIPROTEC	BASF	Vigne : Botrytis, oïdium : 650 g/ha; Poirier : Maladies de conservation : 800g/ha; Pommier :Tavelure :50g/hl;COMM17/05/2016). Pêcher : cloque : 50 g/hl (COMM 12/001/2018)
49	Boscalid +Pyraclostrobin	267 g/kg +67 g/kg	WG	Signum WG	015-14/24F.	COTUGRAIN IMPEX	BASF	Tomate, Fraisier :Botrytis 125 g/hl en 3 applications au max. (comm22mai2024)
50	Bupirimate	250 g/L	EC	Nimrod	F.008-11/21	SEPCM	AAKO BV	Arbo, cucurbitacées : Oïdium : 100 cc/hl TOMATE SOUS SERRE :Oidium (Leveillulataurica) :100 cc/hl Nbre de traitement :2 (COMM 28/12/2023)
51	Captane	80%	WG	CAPITOL 80 WG	F.023-17	EXCEL AGRI	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Pommier :Tavelure: 200g/hl (COMM 28/12/2023)
52	Captane	80%	WG	Malvin80 WG	F.135-11/21	BIOPROTECTION	UPL/ARYSTA LIFESCIENCE	Poirier : Tavelure : 200 g/hl soit 2 kg/ha; Pomme de terre : Mildiou : 2 kg/ha
53	Captane	500 g/kg	WP	PROTHANE	F.020-16	DELTA AGRICOLE PLUS	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Pommier : Tavelure : 350g/hl

54	Captane	80%	WG	MITANE	F.016-16	SOCOOPEC	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Pommier: Tavelure: 200g/hl
55	Captane	480 g/l	EC	CAPLANT EC	F.008-19	FERTIPLANT	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Pommier: Tavelure: 300 ml/100l d'eau (3 l/ha) -Pulvérisation foliaire L'efficacité de produit s'étale sur 7 jours(COMM23/04/19)
56	captane	480 g/l	EC	KAPI-TOP 48 EC	F.67-21	Agrinova	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Pommier: Tavelure:300 ml/100l d'eau (3 l/ha) -Pulvérisation foliaire L'efficacité de produit s'étale sur 7 jours(COMM09/02/21)
57	Captane	83%	WP	FILDER	F.058-22	EL MOUSSEM	ARYSTA LIFESCIENCE/UPL	Vigne,P de Terre : Mildiou : 200 g/hl; Pommier, Poirier : Tavelure : 200 g/hl (COMM08/06/22)
58	Captane	83%	WP	Captan 83 WP	F.009-11/21	AGRIPROTEC	ARYSTA LIFESCIENCE/UPL	Vigne,P de Terre : Mildiou : 200 g/hl; Pommier, Poirier : Tavelure : 200 g/hl
59	Captane	83%	WP	Akotan 830 WP	F.010-11/21	SEPCM	AAKO	Vigne,P de Terre : Mildiou : 200 g/hl; Pommier, Poirier : Tavelure : 200 g/hl
60	Chinozole	500 g/L	SL	Beltanol-L	F.011-11/21	AGRIPROTEC	PROBELTE	Cucurbitacées : Fusarium : 4 L/ha dans l'eau d'irrigation goutte à goutte juste après le repiquage
61	Chinozole	500 g/L	SL	V-NOL	F.025-18	AGROSYSTEMES	PROBELTE	Cucurbitacées : Fusarium : 4 L/ha dans l'eau d'irrigation goutte à goutte juste après le repiquage (COMM18/10/2018)
62	CINNAMOMUM ZEYLANICUM :Extrait de Cannelle (Cinnamaldehyde)	22.03% (équivalent à 232,50 g d'aldéhyde cinnamique/L)	EC	TINAMOL	F.004-22	COTUGRAIN	LIDA	Vigne: oidium(Uncinulanecator):2.5 l/ha -volume de bouillie:500-600 l/ha -03 app à un intervalle de 07 jours. (COMM 08/06/22) (comm 25 juin 2025)
63	Cuivre	360 g/L	SC	Hydro Flo	F.209-11/21	BIOPROTECTION	NUFARM	Arbo : Traitement d'hiver : 5 L/ha; Tomate : Mildiou : 200 cc/hl; Vigne: Mildiou:200 cc/hl;(COMM 18/10/2017); Tomate : Bactériose : 400 cc/hl (COMM 12/01/2018)
64	Cuivre	600 g/l	SC	Siscop 60 SC	F.041-17	SEPCM	AAKO BV	Vigne: Mildiou: 1,5 l/ha; (COMM 18/10/2017)
65	Cuivre +cymoxanil	200 g/l+40 g/l	WG	Cuprofix C WG	F.019-22	EL MOUSSEM	UPL	Vigne: Mildiou(Plasmopara viticola):2 kg/ha(200 g/hl) -App foliaire -nbre max d'app par cycle:4 app -Débuter l'app avant le dvp de la maladie et continuer à un intervalle de 7 à10 jours -stade d'app sur la culture :BBCH13-BBCH83

								DAR:28 jours LMR:cymoxanil:0.01mg/kg ; Cuivre:5 mg/kg. (COMM 08/06/22) TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (Phytophthora infestans) :2,5 kg/ha (250 g/hl) -App foliaire -nbre max d'app par cycle:6 app Débuter l'app avant le dvp de la maladie etcontinuer à un intervalle de 7 à 9 jours -stade d'app sur la culture :BBCH21-BBCH95 DAR:7 jours LMR:cymoxanil:0.01mg/kg Cuivre:5 mg/kg (COMM 28/12/2023)
66	Cuivre +Metalaxyl	40% + 8%	WP	Mevaxil Cuivre WP	F.043-22	NEGANOR	IQV DEL VALLES	Vigne : Mildiou : 250 g/hl; (COMM 08/06/22)
67	Cuivre Métal	35%	WG	AIRONE	F.004-17	AGRIMATCO	ISAGRO/distribute par frarimpex GOWAN CROP	Pomme de terre : Mildiou : 150 g/hl;(COMM 20/06/2017)
68	Cuivre Métal	20%	WP	Comac	F.214-11/21	AGRIPROTEC	NUFARM	Vigne : Mildiou : 1,5 Kg/hl
69	Cuivre Métal	50%	WP	OSSICLOR 50 PB MANICA	F.015-17	ATLAS AGRICOLE	MANICA Spa	Tomate: Mildiou: 400 g/hl (COMM 20/06/2017)
70	Cuivre Métal	20%	WP	Super Bordeaux	F.003-13/23	BIOPROTECTION	NUFARM	Vigne : Mildiou : 1,5 Kg/hl; Pomme de Terre : Mildiou : 500 g/hl (COMM 17/05/2016); Olivier : (Eil de paon (Tavelure) : 375g/hl (comm20/06/2017); Tomate : Bactériose, mildiou : 500 g/hl (COMM 12/01/2018) (COMM 19 avril 2023)
71	Cuivre Métal	75%	WG	COBRE NORDOX	F.047-17	COTUGRAIN	NORDOX INDUSTRIER A(fabricant)/S;COMMerCi alquimecamasso(four)	Vigne:Mildiou: 1 kg/ha;(COMM 18/10/2017)
72	Cuivre Métal	20%	WP	POLTIGLIA 20 PB	F.035-17	ATLAS AGRICOLE	MANICA S.P.A	Vigne:Mildiou: 1.5 kg/ha;(COMM 18/10/2017)
73	Cuivre Métal	20%	WG	Cuperval WG	F.005-13/23	SANABEL AGRO	I.Q.V. DELVALLES	Vigne : Mildiou : 1,5 Kg/hl(COMM 19 avril 2023)
74	Cuivre Métal	20%	WG	Bouillie Bordelaise	F.203-11/21	SEPCM	Cerexagri/UPL Ltd	Vigne : Mildiou : 1,5 Kg/hl
75	Cuivre Métal	20%	WG	Bordo valles WG	F.154-11/21	SOCOOPEC	I.Q.V. DELVALLES	Vigne : Mildiou : 1,5 Kg/hl
76	Cuivre Métal	35%	WG	Kocide 2000	F.019-11/21	AGRIPROTEC	MITSUI & Co Ltd/kocide LLC/cosacoLLC(japon)	Pommier : Tavelure : 150 g/hl; Pêcher : Cloque : 200 g/hl ; Tomate, P.de terre,Vigne : Mildiou : 150 g/hl; Vigne : Bactériose : 150 g/hl; Arbres fruitiers : Traitement d'hiver : 400 g/hl

77	Cuivre Métal	50%	WP	COPSIP	F.019-18	AGRIPROTEC	SIPCAM INAGRA	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo: bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl(COMM18/10/18)
78	Cuivre Métal	50%	WP	Inacop PM	F.003-14/24	ATLAS AGRICOLE	SIPCAM INAGRA	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo: bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl (comm 22 mai 2024)
79	Cuivre Métal	50%	WP	Copezine 50	F.023-16	EL KHADRA	SIPCAM QUIMAGRO	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo: bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
80	Cuivre Métal	50%	WP	CobreKey	F.018-11/21	ETS MEZGHANI	INDUSTRI. QUIMICAKEY	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo: bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
81	Cuivre Métal	50%	WP	Cuprene	F.167-11/21	promochimie	SIPCAM QUIMAGRO	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo: bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl (COMM09/02/21)

82	Cuivre Métal	50%	WP	Roxon 50	F.008-13/23	SANABEL AGRO	I.Q.V. – Espagne	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d’hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo :bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl(COMM 19 avril 2023)
83	Cuivre Métal	50%	WP	Cuprocuivre	F.151-11/21	SEPCM	I.Q.V. – Espagne	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d’hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo :bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
84	Cuivre Métal	50%	WP	Curenox	F.152-11/21	SOCOOPEC	I.Q.V. – Espagne	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d’hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo :bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
85	Cuivre Métal	50%	WP	Hidrocobre 50 valles	F.153-11/21	SOCOOPEC	IQV DEL VALLES	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d’hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo :bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl Agrumes:Black spot -maladies des taches noires des agrumes (Phyllosticta citricarpa) :200 g/hl Pulvérisation foliaire en post floraison- -2 applications à 16 semaines d'intervalle -Volume de bouillie:700-1000 l/ha DAR:1 jour. (COMM 08/06/22)
86	Cuivre Métal	50%	WP	Cuivox	F.150-11/21	STEC	I.Q.V. – Espagne	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d’hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl

								Arbo: bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
87	Cuivre métal(xyde de cuivre)	40%	WG	HYDRO 40 WG	F.001-19	SANABEL AGRO	IndustriasQuimicas Del Vallés (IQV)	Pomme de terre : Mildiou :300 g/hl(3 kg/ha) -Pulvérisation foliaire -2 traitements/cycle en préventif ou curatif -14j de protection(COMM 23/04/2019)
89	Cuivre(Oxychlorure de cuivre)	57%	WP	50	F.066-22	AGRIMED DISTRIBUTION	Shyhamchemical /FITOGAL	Pomme de terre : Mildiou :500 g/hl Parties aériennes, conditions favorables à l'apparition de la maladie (COMM09/02/21), (COMM08/06/22)
91	Cuivre(oxychlorure de cuivre)	57%	WP	COOPOX WP	F.02-21	AMINCO	Shyhamchemical	Pomme de terre : Mildiou :500 g/hl Parties aériennes, conditions favorables à l'apparition de la maladie(COMM09/02/21)
92	Cuivre(oxychlorure de cuivre 605 g/kg)	350g/kg	WG	RAMCU 35 WG	F.002-19	STIMA	Manica S.P.A	Pomme de terre: Mildiou:350 g/hl; -3 applications; -durée de protection : 7-10j; (COMM 23/04/2019)
93	Cuivre+ Métalaxyl	40% + 8%	WP	Armetil cuivre	F.159-11/21	SOCOOPEC	IQV DEL VALLES	Vigne : Mildiou: 250 g/hl
94	Cyazofamid	160g/l	SC	RANMAN TOP SC	F.05-21	AGRIPROTEC	ISK Biosciences Europe N.V	Pomme de terre: Mildiou:50 cc/hl(0.5 l/ha) -Mode de traitement. : foliaire-stade des app :dés les premiers signes d'infestation.-DAR :7 jours Tomate : Mildiou(Phytophthora infestans):50 cc/hl (0.5 l/ha) APV(produit de contact)-Mode de trait. : foliaire- Calendrier des app :dés les premiers signes d'infestation.-DAR : 7 jours(COMM09/02/21)
95	Cyazofamid + Dimethomorph	100 g/l + 300 g/l	SC	DOWNMID SC	F.27-25	SOLAGRI	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD CHINE	Tomate : Mildiou (Phytophthora infestans) : 50 ml/hl Volume de bouillie:500-600 l/ha (Comm 16/07/2025)
96	Cyazofamid + Fluopicolide	150 g/l + 100 g/l	SC	GERLIDA SC	F.28-25	PLANETE VERTE	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD CHINE	Tomate : Mildiou (Phytophthora infestans) : 450 ml/ha Volume de bouillie:500-600 l/ha 01 application Dés l'apparition des symptômes (Comm 16/07/2025)

97	Cyflufenamid	50g/l	EW	CONFIRM 5 EW	F.25-21	EL MOUSSEM	NIPPON SODA/ Nisso Chemical Europe GmbH	Vigne: oidium(Uncinulanecator) 0.35 l/ha (35 ml/hl) -app foliaire -periode d'app : à partir du stade feuilles étalées jusqu'au stade véraison -Renouveler les app en 12 à 14 jours en période de faible pression et de 10 à 12 jours en cas de forte pression -3 app au max/cycle -DAR :21 jours -LMR :0.05 mg/kg
98	Cymoxanil	450 g/kg	GR	Cymbal 45	F.09-21	NEGANOR	BELCHIM CROP PROTECTION/CERITIS BELCHIM NV	Pomme de terre: Mildiou:0.2 kg/ha -Stade d'application :emergence-défanage(COMM09/02/21)
99	Cymoxanil +oxychlorure de cuivre	4.2% + 39.7%	WP	SYNERGY WP	F.30-25	EL MOUSSEM AGRICOLE	ARISTEAS Agro(fournisseur)/INDOFI L INDUSTRIES LIMITED(fabricant)	Tomate :Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>) :2,5 Kg/Ha soit 250 gr/hl Nb d'applications 2 Intervalle entre applications 10-12 jours Stade d'application BBCH 12-85 DAR:7 j(Comm 16/07/2025)
100	Cymoxanil + Métirame de Zinc	4,8 % +64%	WG	BATO	F.61-21	AGRIMATCO	BASF	P. de terre, vigne : Mildiou : 150 g/hl(COMM09/02/21)
101	Cymoxanil + Métirame de Zinc	4,8 % +64%	WG	Aviso DF	F.023-11/21	STIMA	BASF	P. de terre, vigne : Mildiou : 150 g/hl
102	Cymoxanil +Bouillie bordelaise	3% + 22.5 %'exp en cu)	WP	FESTIVAL WP S/R de changement de nom	F.25-25	RAYEN PHYTAGRI	LAINCO, S, A/ESPAGNE	Tomate : Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>) :0.4 %(soit 400 g/hl) Dés l'apparition des symptômes ou dans des conditions favorables Appliquer entre BBCH 16-18 et BBCH 21-22 (Comm 16/07/2025)
103	Cymoxanil +Famoxad one	30 % +22,5%	WG	Equation Pro	F.020-11/21	SEPCM	DU PONT (Taiwan) AGRISCIENCE/CORTEV A	P. de terre : Mildiou : 40 g/hl TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>) :400 g/ha Nbre d'app :3(COMM 28/12/2023)
104	Cymoxanil +Famoxad one	30 % +22,5%	WG	FAMOXATE	F.16-25	AGRIPROTEC	DU PONT (Taiwan) AGRISCIENCE/CORTEV A	P. de terre : Mildiou : 40 g/hl TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>) :400 g/ha Nbre d'app :3 (COMM 25/06/2025)
105	Cymoxanil +folpet	80 g/kg (8%) + 660 g/kg (60%)	WG	VITIPEC ADVANCE WG	F.29-25	EL MOUSSEM AGRICOLE	ASCENZA Agro/PORTUGAL	Tomate :Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>) :1,5 Kg/Ha soit 150 gr/Hl Stade d'application BBCH 12-81 Nb d'applications 3 Intervalle entre applications 7-10j

								DAR:7j (Comm 16/07/2025)
106	Cymoxanil +Oxychlorure de cuivre	4% (40 g/kg)+ 40% (400 g/kg)		CIMOXATE C WG	F.12-23	AGROSYSTEMES	ASCENZA GRO S.APORTUGAL	TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>) :3 kg/ha (300 g/hl) -Des applications préventives à la première apparition des symptômes -nbre d'application:3 DAR :03 jours (COMM 28/12/2023)
107	Cymoxanil+ Zoxamid	33%+33%	WG	REBOOT WG	F.013-22	AGRIMATCO	GOWAN CROP PROTECTION LIMITED	Vigne: Mildiou (plasmoporaviticola):45 g/hl (soit 450g/ha) -pulvérisation foliaire -application dès le début d'infestation -intervalle d'application:7-10 jours (COMM 08/06/22)
108	Cyproconazole	10%	WG	Xpert WG	F.013-16	EL KHADRA	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Vigne: Oïdium : 12g/hl
109	Cyproconazole +Azoxytrobine	80 g/L +200 g/L	SC	Priori Xtra	F.003-18	SOLAGRI	SYNGENTA	Blé : Oïdium, Rouille, Septoriose : 0,5 L/ha (12/01/2018)
110	Cyproconazole + chlorothalonil	4% + 37.5 %	SC	CHAMPION	F.019-17	SOCOOPEC	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les légumineuses (date d'effet:13/07/2023)
111	Cyproconazole +chlorothalonil	4%+37.5 %	SC	CYCLONE	F.015-19	SANABEL AGRO	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Restriction d'usage:utilisation uniquement pour les légumineuses (date d'effet:13/07/2023)
112	Cyprodinil	50%	WG	arnatin WG	F.68-21	SOLAGRI	SYNGENTA	Pommier, Poirier : Tavelure : 50 g/hl; Pêcher : Moniliose : 50g/hl (COMM09/02/21)
113	Cyprodinil + Fludioxonil	37.5 %+ 25%	WG	SHAOLIN XTRA WG	F.12-25	PLANETE VERTE	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD CHINE	Vigne :Pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>) :120 g/hl Volume de bouillie : 800-100 l/ha (Comm 25/06/2025)
114	Diethofencarb	250 g/l	SC	FRUGICO SC	F.019-16	AGROSYTEME	LOBACHEM	Pommier : Botrytis : 1.5 L/ha
115	Difenoconazole	250 g/L	EC	Difcor	F.027-11/21	AGROSYSTEMES	LOBACHEM	Pommier, Poirier : Tavelure : 20 cc/hl ; Vigne : Oïdium : 20 cc/hl; Arbo : Moniliose : 20 cc/hl
116	Difenoconazole	30 g/L	FS	Difender 30 FS	006-14/24F.	AGROSYSTEMES	LOBACHEM	Semences de blé : Carie, Charbon : 200 cc du Produit + 0,75 L d'eau/Ql
117	Difenoconazole	250 g/L	EC	Protector	F.032-15/25	AMINCO	LOBACHEM	Pommier, Poirier : Tavelure : 20 cc/hl ; Vigne : Oïdium : 20 cc/hl; Arbo : Moniliose : 20 cc/hl (comm 25 juin 2025)
118	Difenoconazole	250 g/L	EC	Score 250 EC	F.028-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Pommier, Poirier : Tavelure : 20 cc/hl ; Vigne : Oïdium : 20 cc/hl; Arbo : Moniliose : 20 cc/hl; Cucurbitacées : Oïdium : 40 cc/hl (COMM 06/12/2012) Olivier : œil de paon(<i>spilocaeaoleagina</i>) :50cc/hl

								Volume de bouillie :800-1000 l/ha -Stade d'application:En préventif -Type:foliaire -Nbre d'application:2/saison -Durée entre les applications:10-14 jours DAR:30 jours TOMATE SOUS SERRE : Alternaria (<i>Alternariasolani</i>) :0.5 l/ha Volume de bouillie:200-600 l/ha -BBCH19 nbre d'application/saison:03 Durée entre les applications:07 jours DAR:03 jours(COMM 28/12/2023)
119	Difenoconazole	30 g/L	FS	Spectro 30 FS	F.029-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Semences de blé :Carie, Charbon : 200 cc/Ql + 0,5 à 0,75 L d'eau; Blés : Charbon, carie : 200 ml PC + 600 ml eau/Ql; Orge : Charbon, Charbon nu, Helminthosporiose : 200 ml PC + 600 ml eau/Ql.
120	Difenoconazole	250 g/L	EC	CURYGEN EC	F.015-20	EL KHADRA	JSC AVGUST INC	Vigne : Oïdium : 20 cc/hl (COMM3/02/2020)
121	Difenoconazole	250 g/L	EC	PROZOLE 250 EC	F.022-18	Ets MEZGHANI	ASTRACHEM	Pommier, Poirier : Tavelure : 20 cc/hl ; Vigne : Oïdium : 20 cc/hl; Arbo : Moniliose : 20 cc/hl;(COMM 18/10/2018)
122	Difenoconazole	250 g/L	EC	RAYOK	F.046-17	HALAB TUNISIE	JSC AUGUST INC	Vigne : Oïdium : 20 cc/hl
123	Difenoconazole	250 g/L	EC	Festival 250 EC	F.006-15/25	SANABEL AGRO	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Vigne : Oïdium : 20 cc/hl; Pommier : Tavelure : 20cc/hl (COMM 17/05/2016)(comm 25 juin 2025)
124	Difenoconazole	30 g/l	FS	SITARA FS	F.001-20	SANABEL AGRO	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Semence de blé :Carie, Charbon:200 cc/Ql; Volume de bouillie:800 ml eau (COMM13//02/2020)
125	Difenoconazole	250 g/L	EC	Divisole	F.194-11/21	TASMID	ASTRACHEM	Pommier, Poirier : Tavelure : 20 cc/hl ; Vigne : Oïdium : 20 cc/hl;Arbo : Moniliose : 20 cc/hl PIMENT SOUS SERRE :Oïdium (Leveillulataurica):50 cc/hl -Nbre max de traitement:3(COMM 28/12/23)
126	Difenoconazole	250 g/l	EC	ORION EC	F.05-25	EL MOUSSEM	ARISTEAS Agro (fournisseur)/ INDOFIL INDUSTRIES LIMITED(fabricant)	Vigne :oidium (Uncinula necator) :20 cc/hl(0.2 l/ha) -application foliaire -stade d'application : débiter les applications avant le développement de la maladie et continuer un intervalle de 10 à 14 jours.

								-utiliser le taux le plus élevé et l'intervalle le plus court lorsque la pression de la maladie est élevée -ne pas faire plus de 2 applications séquentielles du produit avant de passer à un fongicide ayant un mode d'action différent -nbre max d'app:3/cycle -commencer les applications avant le dvp de la maladie et continuer à un intervalle de 7 jours - DAR:21 j - LMR:3mg/kg(Comm 25/06/2025)
127	Difenoconazole + Cyprodinil	87.2g/l+251.1 g/l	EW	INSPIRE PLUS EW	F.03-23	BIOPROTECTION	SYNGENTA	POMMIER : Tavelure (<i>Venturia inaequalis</i>) :0.7 l/ha Volume de bouillie :500-1000 l/ha -stade d'application : préventif -Type: foliaire Nb de d'application : 2/saison -Durée entre les applications :10-14 jours DAR:14 jours (COMM 28/12/23)
128	Difenoconazole + Fludioxonil	25 g/l +25 g/l	FS	DIFEND EXTRA FS	F.017-18	AGROSYSTEMES	Globachem	Semence de blé : septoriose : 0.1 l/q (100ml+600 à 800 ml d'eau/ql de semences) ; - Semence de blé : Carie & charbon: 0.2 l/q(200ml+600 à 800 ml d'eau/ql de semences) ; - Semence de blé : Fusariose : 0.2 l/q(200ml+600 à 800 ml d'eau/ql des semences) ; Semencé d'orge : Helminthosporiose : 0.2l/q (200ml+600 à 800 ml d'eau/ql de semences (COMM : 18/10/18)
129	Difenoconazole + Fludioxonil	25 g/L + 25 g/L	FS	Celest Extra 50 FS	F.030-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Blés : Carie, charbon, septoriose, fusarium des semences, provenant des semences : 100 ml+600 à 800 ml d'eau/ql de semences; Blés : fusarium des semences, provenant du sol : 200 ml+600 à 800 ml d'eau/Quintal de semences; Orge : Helminthosporiose : 100 ml+600 à 800 ml d'eau/ql de semences
130	Difenoconazole + Fludioxonil +Sedexane	25 g/l + 25 g/l + 50 g/l	FS	Vibrance Gold	F.013-15/25	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Semences de blé : Maladies transmissibles par les semences (Carie, charbon, septoriose, fusariose) : 200 ml/100 kg(COMM 25 JUIN 2025)
131	Difenoconazole +Cyflufenamid	125g/L +15g/L	DC	CIDELY TOP 140 DC	F.026-17	AGRIPROTEC	SYNGENTA	Vigne : Oidium: 0.75 l/ha;(COMM 18/10/2017)
132	Difenoconazole +Cyflufenamid	125g/L +15g/L	DC	MELCAR TOP 140 DC	F.027-18	COTUGRAIN IMPEX	SYNGENTA	Vigne : Oidium: 0.75 l/ha;(cmm18/10/2018) Tomate : Oidium (<i>Leveillula taurica</i>): 0.75 l/ha Tomate : Alternariose (<i>Alternaria solani</i>) :0.75 l/ha Melon : oidium (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) :

								0.75 l/ha (Comm 16/07/2025)
133	Difenoconazole +Métalaxyl-M	92 g/l + 23 g/l	FS	SpectroExtreme 115 FS	F.008-14/24	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Semences de blé : Carie, Charbon : 65 cc du Produit + 0,5 L d'eau/Ql(comm22/05/2024)
134	Difenoconazole +Métalaxyl-M	92 g/l + 23 g/l	FS	DIVIDEND EXTREME 115 FS	F.006-18	SOLAGRI	SYNGENTA	Semences de blé : Carie, Charbon : 65 cc du Produit + 0,5 L d'eau/Ql;(COMM 18/10/2018) Semences des féveroles: Anthracnose, Fusariose, Pythium:150cc/0.5l eau/Ql(COMM 08/06/22)
135	Difenoconazole+Cyflufenamid	60g/l+30g/l	DC	DYNALI DC	F.002-22	SOLAGRI	SYNGENTA	Vigne: Oidium(Uncinulanecator):0.6 l/ha pour un volume de bouillie de 400 à 600 L d'eau/ha -Application foliaire-maximum 2 fois durant la saison à un intervalle de 14 jours-BBCH 61 à BBCH 75 (COMM 08/06/22)
136	Diméthomorphe +Fluazinam	200 g/l +200 g/l	SC	FOLY STAR 400 SC	F.007-16	SEPCM	AAKO	Pomme de Terre : Mildiou :75 cc/hl
137	Dimetomorphe +Folpel	11.3% +60%	WG	MORPHEE 71.3 WG	F.036-17	BIOPROTECTION	AAKO	Vigne : Mildiou : 2 Kg/ha; (COMM 18/10/2017)
138	Dimetomorphe +Folpel	11.3% +60%	WG	DENIM	F.007-17	RAYEN PHYTAGRI	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Pomme de terre : Mildiou : 200 g/ha(COMM20/06/2017)
139	Dimetomorphe +Folpel	11.3% +60%	WG	FLOPY DUO	F.65-21	AGRINOVA	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Pomme de terre : Mildiou : 200 g/ha(COMM09/02/21)
140	Dimeyhomorph+ cymoxanil	50%+20%	WG	DIMANYL WG	F.07-23	EL KHADRA	HANGZOU TOPAGRO BIOSCIENCE	TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (Phytophthora infestans) :50 g/hl Volume de bouillie : 800-1000 l/ha -application foliaire - Nbre d'app :3(COMM 28/12/2023)
141	Dinocap Meptyl + Myclobutanil	105 g/L + 45 g/L	EC	AGRIKAR STAR	F.029-18	ATLAS AGRICOLE	DOW AGROSCIENCES	Vigne : Oidium : 100 cc/hl (COMM 18/10/2018)(COMM09/02/21)
142	Dithianon	500 g/l	SC	DELAN 500 SC	F.050-22	BIOPROTECTION	BASF	Pommier: Tavelure (Venturia inaequalis): 0.5 l/ha -volume de bouillie: 1000 l/haApplication foliaire- -Eclatement des bourgeons-avant floraison-nbre d'application:6-Durée entre application:7 à 14 jours. DAR:21 jours. (COMM08/06/22)
143	Dithianon	70%	WG	ASTRONE	F.056-22	SANABEL AGRO	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Pommier: Tavelure (Venturia inaequalis) :0.75 kg/ha avec un volume de bouillie de 1000 l d'eau/ha. -stade BBCH 53-79 -3 applications avec un intervalle de 20jrs(COMM 08/06/22)
144	Dithianon	12 % + 4%	WG	shanon	F.32-21	AGRIMED DISTRIBUTION	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Pommier: Tavelure (Venturia inaequalis) :0.75 kg/ha avec un volume de bouillie de 1000 l d'eau/ha. -stade BBCH 53-79

								-3 applications avec un intervalle de 20j (COMM09/02/21)'COMM28 dec2023
145	Dithianon +Pyrachlostrobin	70%	WDG	MACCANI	F.014-16	COTUGRAIN IMPEX	BASF	Pommier :Tavelure;oidium : 2.5 Kg/ha
146	Dodine	400 g/L	SC	Syllit 400 SC	F.172-11/21	PROTAGRI	ARYSTA Life Science Benelux / Belgique/UPL	Pêcher : Clôque : 0,8 L/ha Pommier : Tavelure : 1,2 L/ha Poirier : Tavelure : 1,5 L/ha Olivier :(Eil De Paon(<i>Spilocaea oleaginum</i>) :150 ml/hl 03 applications: -01 app en automne (mi-octobre) -2eme applications au printemps en mi-mars -3eme applications au printemps en mi- mai.(COMM09/02/21)
147	Dodine	400 g/L	SC	Efluzin 400 SC	F.010-15/25	SEPCM	ARYSTA Life Science Benelux / Belgique/ARYSTA	Pêcher : Clôque : 0,8 L/ha Pommier : Tavelure : 1,2 L/ha Poirier : Tavelure : 1,5 L/ha)(comm25 juin 2025)
148	Eugenol +géraniol +thymol	3.3%(33g/l)+ 6.6%(6.6 g/l) +6.6%(66 g/l)	CS	ARAW CS	F.09-25	PROMOCHIMIE	SIPCAM	Vigne :oidium (<i>Uncinula necator</i>) :300 cc/hl (3 l/ha) Volume de bouillie : 1000 l/ha Appliquer dès l'apparition des premiers capuchons floraux, séparées du réceptacle jusqu'à ce que les baies soient prêtes à être récoltées (BBCH 60-89). usage en plein air avec un total maximal de 4 pulvérisations avec intervalle de 7 jours entre les applications DAR:7 jours pour les raisins de table DAR:3 jours pour les raisins de cuve Vigne : Pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>) :300 cc/hl (3 l/ha) Volume de bouillie : 1000 l/ha Appliquer dès l'apparition des premiers capuchons floraux, séparées du réceptacle jusqu'à ce que les baies soient prêtes à être récoltées (BBCH 60-89). usage en plein air avec un total maximal de 4 pulvérisations avec intervalle de 7 jours entre les applications DAR:7 jours pour les raisins de table DAR:3 jours pour les raisins de cuve (Comm 25/06/2025)
149	EXTRAIT de SWINGLEA GLUTINOSA	820g/l(82%)	SL	PERIMETER SL	F.22-23	AGRIPROTEC	GOWAN CROP PROTECTION LIMITED	Fraise :Pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>) :3l/ha Volume de bouillie:1000 l/ha Traitement foliaire Traitement préventif

								Nbre de traitement:01 Stade d'app:début d'attaque DAR:0j (COMM 28/12/2023) Vigne : Pourriture grise (Botrytis cinerea) :3l/ha Volume de bouillie:1000 l/ha Traitement foliaire Traitement préventif Nombre de traitement:01 Stade d'application: en maturation DAR:0j (Comm 25/06/2025)
150	Famoxadone +cymoxanil	22,5%+30%	WG	VENUS WG	F.045-22	STIMA	Shengnong Pesticide, Co. Ltd/hangzhouTopagro Bioscience	Concombre :Mildiou (Pseudoperonospora cubensis): 450 g/ha 02 app max au cours du cycle végétatif. (COMM08/06/22)
151	Famoxadone +cymoxanil	22,5%+30%	WG	EQUALIZER WG	F.20-25	RAYEN PHYTAGRI	Shengnong Pesticide, Co. Ltd/hangzhouTopagro Bioscience	Concombre :Mildiou (Pseudoperonospora cubensis): 450 g/ha 02 app max au cours du cycle végétatif. (COMM 25/06/25)
152	Famoxadone +cymoxanil	22.5% + 30%	WG	CYMOFLEX WG	F.24-25	PROTAGRI	NANJING AGROCHEMICAL	Tomate : Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>) :40 g/hl Max 03 applications /saison DAR 7 jours (Comm 16/07/2025)
153	Fenhexamide	53,70%	WG	Teldor	F.040-11/21	PROMOCHIMIE	BAYER CROPSCIENCE	Vigne, Tomate, Fraisier : Botrytis : 75 g/hl; Pêcher : Moniliose : 100 g/hl;comm 20/06/2017
154	Fenpyrazamine	50%	WG	PROLECTUS 50WG	F.040-17	SEPCM	SUMITOMO CHEMICAL AGRO Europe	Vigne : Botrytis: 100 g/hl;(COMM 18/10/2017)
155	Florypicoxamid	100 g/l	SC	VERPIXO	F.33-25	ATLAS AGRICOLE	CORTEVA AGRISCIENCE	Vigne : Oidium (Uncinula necator): 1.5 l/ha (Comm 16/07/2025)
156	Fluazinam	500 g/l	SC	Nando	F.045-11/21	BIOPROTECTION	NUFARM	Pomme de terre ; Tomate : Mildiou :0.4 l/ha; Vigne : Botrytis : 1.5 L/ha
157	Fluazinam	500 g/l	SC	VERTIGO	F.208-11/21	Sanabel agro	NUFARM	Pomme de terre ; Tomate :Mildiou :0.4 l/ha(COMM27/12/22)
158	Fluazinam +Azoxystrobine	375 g/l+150 g/l	SC	VENDETTA SC	F.055-22	STEC	FMC	Pomme de terre :Mildiou (Phytophthora infestans):0.5 l/ha -pulvérisation foliaire -conditions favorables à l'apparition de la maladie -03 applications max -positionnement au stade végétation stabilisée -DAR:3 jours. (COMM 08/06/22)
159	Fluazinam +Azoxystrobine	375 g/l+150 g/l	SC	DRABANT	F.19-25	PROMOCHIMIE	FMC	Pomme de terre :Mildiou (Phytophthora infestans):0.5 l/ha

								-pulvérisation foliaire -conditions favorables à l'apparition de la maladie -03 applications max -positionnement au stade végétation stabilisée -DAR:3 jours. (COMM 25/06/25)
160	Fludioxinil	230 g/l	SC	SCHOLAR 230 SC	F.052-22	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Agrumes:Penicillium SPP:150 ml en Post-récolte Volume:Bouillie 100-200 l d'eau(COMM 08/06/22) Pommier : Maladies de conservation (penicillium expansum;colletotrichumgloeosporioides; Cacutatum ;Botrytis cinerea;) :150 ml/100 l En Post récolte Trompage/douchage Nbre d'application:1(COMM 28/12/2023)
161	Fludioxonil	100 g/L	FS	Maxim 100 FS	F.042-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	P.de terre (Traitement des semences) : Rhizoctoniasolani, fusarium spp, Helminthosporium solani : 200 cc PC/T de semences
162	Fludioxonil +Cyprodinil	25% +37,5%	WG	switch 62,5 WG	F.043-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Vigne : Botrytis cinerea : 120 g/hl Vigne : Pourriture grise (Botrytis cinerea) :0.8 Kg/ha (comm25 juin 2025)
163	Fludioxonil +Cyprodinil	25% +37,5%	WG	Chorus Double	F.044-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Tomate s/serre : Pourriture : 60 g/hl ; Cucurbitacées : Botrytis : 60 g/hl; Fraisier : Botrytis : 800 g/ha: Arbo : Moniliose : 30 g/hl
164	Fluopicolide + PropamocarbHydrochloride	62.5 g/l+ 625 g/l	SC	PICOCARB SC	F.11-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (Phytophthora infestans) : 150 ml/ha Nbre d'app :3 -volume de bouillie 500-600 l/ha -dés l'apparition des symptômes (COMM 28/12/2023)
165	Fluopicolide + PropamocarbHydrochloride	62.5 g/l+ 625 g/l	SC	ULTIMA SC	F.10-24	NEGANOR FFT	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (Phytophthora infestans) : 150 ml/ha Nbre d'app :3 -volume de bouillie 500-600 l/ha -dés l'apparition des symptômes (COMM 22/05/2024)
166	Fluopyram + Tebuconazole	200 g/L + 200 g/l	SC	Luna Experience 400 SC	F.023-13/23	SEPCM	BAYER CROPSCIENCE	Vigne : Oïdium : 0.4 l/ha; Pommier :Tavelure :0.25L/ha; Pommier : Oïdium : 0.25 L/ha;(comm 17/05/2016); Pêcher : Moniliose : 0.5 l/ha;(comm20/06/2017) (COMM 19 avril 2023)

167	Fluopyram + Tebuconazole	200 g/L + 200 g/l	SC	Moon Experience SC	F.04-24	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Vigne : Oïdium : 0.4 l/ha; Pommier :Tavelure :0.25L/ha; Pommier : Oïdium : 0.25 L/ha;(comm 17/05/2016); Pêcher : Moniliose : 0.5 l/ha; (COMM 22/ 05/ 2024)
168	Fluopyram + Trifloxystrobine	250 g/L + 250 g/L	SC	Luna sensation	F.019-13/23	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Frasier : Botrytis : 60 cc/hl ; Tomate : Botrytis : 50 cc/hl; Vigne : Botrytis : 50 cc/hl; Piment :Oïdium :25 ml/hl;(comm17/05/2016) (COMM 19 avril 2023)
169	Fluoxastrobine	480g/l	SC	EVITO 480 SC	F010-17	EL MOUSSEM AGRICOLE	ARYSTA LIFESCIENCE/UPL	Tomate, Pomme de terre : Mildiou : 500 ml/ha(COMM 20/06/2017)
170	Fluoxastrobine + Tebuconazole	200 g/l + 277 g/l de	SC	Evito T	F.033-16	EL MOUSSEM AGRICOLE	ARYSTA LIFESCIENCE/UPL	Blé dur : rouille, septoriose : 0.5 l/ha (entre stade 2 nœuds et floraison)
171	Fluoxastrobine + Propamocarbhydrochloride	75 g/l+400 g/l	SC	EVITO P	F.044-22	EL MOUSSEM	ARYSTA LIFESCIENCE/UPL	Melon :Mildiou de cuba(Pseudoperenosporacubensis):0.45 l/ha (45 ml/hl) -Application foliaire -DAR:28 jours -ne pas dépasser 5 traitements/cycle -LMR: fluox:0.01 mg/kg P-HCl:5 mg/kg -l'application se fait lorsque les conditions environnementales favorables ou les premiers symptômes de la maladie pour le développement de la maladie se produisent Tomate :Mildiou du sol(fente de semis):Pythium spp:1.5 l/ha (100 ml/hl) -Application goutte à goutte -DAR: 3 jours -effectuer 2 applications par cycle, la première est au moment de la plantation jusqu'au fond de la rainure et la deuxième suivra 30 jours après -LMR: fluox:0.01 mg/kg(COMM 08/06/22) Oignon : Mildiou de l'oignon (Peronospora destructor):1 l/ha Soit 100 ml/hl -Application foliaire -DAR: 3 jours -ne pas dépasser 5 traitements /cycle -LMR: fluox:0.04 mg/kg P-HCl: 2 mg/kg(Comm 16/07/2025)

171	Flutriafol	125 g/L	SC	Impact SC	F.047-11/21	AGRIPROTEC	CHEMINOVA/FMC	Blé : Rouille, Oidium, Septoriose : 1 L/300 à 500 L d'eau Betterave : Cercosporiose : 1 L /ha Féverole : Anthracnose : 1 l/ha (Traitement foliaire) (COMM 18/10/2018) Avoine : Rouille couronnée : 1l/ha en Traitement foliaire (COMM09/02/21) Pommier : Tavelure (Venturia inaequalis) + Oidium (Podosphaera leucotricha) : 25 ml/hl -volume de bouillie : 1000 l/ha -Mode de trait : pulvérisation foliaire -période de trait : préventif ou curatif -Nbre max de trai : 3 -DAR : 3 jours Vigne de cuve : Oidium (Uncinula necator) : 25 ml/hl -volume de bouillie : 1000 l/ha -Mode de trait : pulvérisation foliaire période de trait : préventif ou curatif -Nbre max de trai : 3 -DAR : 21 jours. (COMM 08/06/22) PIMENT SOUS SERRE : Oidium (<i>Leveillula taurica</i>) : 750 ml/ha Volume de bouillie 1000 l/ha -Mode de trait : pulvérisation foliaire période de trait : préventif ou curatif -Nbre max de trai : 3 -DAR : 3 jours (COMM 28/12/2023)
172	Flutriafol	125 g/L	SC	Radikal SC	F.73-21	AGRIMED DISTRIBUTION	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Légumineuses : Rouille : 1 l /ha (COMM09/02/21)
173	Flutriafol	125 g/L	SC	Flutri 125 SC	F.032-16	RAYEN PHYTAGRI	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Légumineuses : Rouille : 1 l /ha
174	Flutriafol + Thiabendazole	25 g/L + 25 g/L	FLO (FS)	Vincit F	F.048-11/21	AGRIPROTEC	CHEMINOVA/FMC	Blé : Carie : 200 cc/Ql Blé : Charbon : 200 cc/Ql Semences d'orge : Maladies charbonneuses : 200 cc + 600 ml d'eau/Ql (comm23/10/2014) Semences de blé : Fusariose (Fusarium spp) : 400 ml/ql dans 600 à 800 litres d'eau (COMM09/02/21)
175	Flutriafol + Tébuconazole	75 g/l + 225 g/l	SC	Pointer Duo	F.028-16	AGROSYSTEMES	CHEMINOVA/FMC	Blé dur : Rouilles : 0.75 l/ha; Vigne : Oïdium : 20 cc/hl (comm18/10/2017)
176	Flutriafol + Azoxystrobin	20% + 20%	SC	VANGUARD SC	F.02-25	EL KHADRA	HANGHZOU TOPAGRO BIOSCIENCE	Vigne : oïdium (<i>Uncinula necator</i>) : 50 cc/hl Volume de bouillie : 600-1000 l/ha -01 application/saison

								(Comm 25/06/2025)
177	Fluxapyroxad + Pyraclostrobine	75 g/l+150 g/l	SE	PRIAXOR SE	18-010F.	COTUGRAIN IMPEX	BASF	Blé : Rouille; septoriose: 0.8 l/ha; (Application foliaire; stade d'application BBCH 32 à 59; nbre d'application : 2;DAR : 35 jours) ;(COMM 18/10/2018)
178	Fluxapyroxad +difenoconazole	75 g/l + 50 g/l	SC	SERCADIS PLUS SC	F.37-25	AGRIPROTEC	BASF	Melon : oidium (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) : 0.6 l/ha 1000 l -pulvérisation foliaire -stade d'app: growth stage 14-89 -En curatif et préventif -nbre d'app:2 -intervalle d'application:10-14 -DAR: 3 jours (Comm 16/07/2025)
179	Folpel	80%	WP	Solfol	F.034-17	ATLAS AGRICOLE	BELCHIM CROP PROTECTION	Vigne :Mildiou: 300 g/ha;(COMM 18/10/2017)
180	Folpet+ Foséthyl-Al	25%+50%	WG	Mikal Flash	F.049-11/21	SEPCM	BAYER CROPSCIENCE	Vigne : Mildiou : 200 g/hl
181	Folpet+ Foséthyl-Al	25%+50%	WG	DUO Flash WG	F.01-24	El Mousseem Agricole	BAYER CROPSCIENCE	Vigne : Mildiou : 200 g/hl (Comm 22/05/24)
182	Foséthyl –Al	80%	WG	FILAL PLUS WG	F.051-22	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Agrumes :Gommose (phytophthora spp):250 g/hl -pulvérisation foliaire -3 traitements au cours des mois d'avril, juillet et octobre/novembre : *1 ère application : pendant la floraison (avril) *2 ème application :en juillet *3 ème application : en octobre/novembre . (COMM08/06/22)
183	Foséthyl al + Folpel + Iprovalicarbe	50 % +25 % + 4%	WG	CASSIOPEE WG	F.044-17	PROMOCHIMIE	BAYER AG	Vigne :Mildiou: 2 kg/ha;(COMM 18/10/2017)
184	Foséthyl-Al	80%	WP	Filal	F.175-11/21	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Agrumes : Gommose : 250 g/hl; Melon : Mildiou de cuba : 300 g/hl; Vigne : Mildiou : 300 g/hl (COMM 18/10/2017)
185	Foséthyl-Al	80%	WP	Alial	F.050-11/21	AGRIPROTEC	PROPLAN/QUMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS SPAIN SLU	Agrumes : Gommose : 250 g/hl; Melon : Mildiou de cuba : 300 g/hl
186	Foséthyl-Al	80%	WP	ROMERAL	F.08-24	NEGANOR FFT	PROPLAN/QUMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS SPAIN SLU	Agrumes : Gommose : 250 g/hl; Melon : Mildiou de cuba : 300 g/hl (Comm 22/05/24)

187	Foséthyl-Al	80%	WG	Aliette express	F.051-11/21	SEPCM	BAYER CROPSCIENCE	Agrumes : Gommose : 250 g/hl; Melon : Mildiou de cuba : 300 g/hl
188	Foséthyl-Al	80%	WG	ELIOS	F.02-24	El Moussem Agricole	BAYER CROPSCIENCE	Agrumes : Gommose : 250 g/hl; Melon : Mildiou de cuba : 300 g/hl (Comm 22/05/24)
189	Fosethyl-Al +Cymoxanil + Folpel	50 % +4 % + 25%	WP	BELKAP EXTRA	F.026.18	AGROSYSTEMES	PROBELTE	Vigne, P.de terre, Tomate : Mildiou : 300 g/hl; Vigne : Black-rot : 300 g/hl;(COMM. 18/10/18)
190	Fosethyl-Al +Cymoxanil + Folpel	50% +4% + 25%	WG	Anteor flash	F.019-14/24	ATLAS AGRICOLE	BAYER AG	Tomate :Mildiou : 2.5 kg/ha :250 g/hl; Pomme de Terre : Mildiou : 2.5kg/ha (comm17/05/2016); Vigne :Mildiou: 2.5 kg/ha;(COMM 18/10/2017) (comm 22 mai 2024)
191	Fosethyl-Al +Cymoxanil +Folpet	50 % +4 % +25%	WP	Fosbel extra	F.052.11/21	AGRIPROTEC	PROBELTE	Vigne, P.de terre, Tomate : Mildiou : 300 g/hl; Vigne : Black-rot : 300 g/hl
192	Fosethyl-Al +Cymoxanil +Folpet	50 % +4 % +25%	WP	Magma Triple	F.137-11/21	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Vigne, Pomme de terre : Mildiou (Stade de nouaison) à la dose de 300 g/hl;
193	Fosethyl-Al +Cymoxanil +Folpet	50 % +4 % +25%	WP	Katanga Triple WP	F.04-21	NEGANOR	PROPLAN/QUMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS SPAIN SLU	Pomme de terre :Mildiou :300 g/hl -Nbre des trait. :1 -stade d'app:Début de l'attaque -Durée de protection :14 j (COMM09/02/21) (COMM 08/06/22)
194	Fosétyl -Al +Cymoxanil +Folpet	50%+4%+25%	WG	Magma Triple SOUS RESERVE DE CHANGEMENT DE NOM	F.23-25	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Tomate : Mildiou (Phytophthora infestans) 250 g/hl Volume de bouillie 800-1000 l/ha Nbre d'app:1-2 app Stade végétatif: différents stade
195	Fosethyl-Al +Fluopicolide	66,7 % +4,4%	WG	Profiler	F.053-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER AG	Vigne : mildiou (stade de nouaison à la grappe « petit pois ») à la dose de 200 g/hl soit 02Kg/ha
196	Fosethyl-al +sulfate de cuivre tribasique	200 g/kg+150 g/kg	WG	Optix R WG	F.021-22	BIOPROTECTION	UPL	Vigne :Mildiou: 5 kg/ha -volume de bouillie:100-1000 l/ha Nbre d'app :6/saison Durée entre les app :10 jours Traitement foliaire BBCH13-BBCH12-95 DAR :28 jours. (COMM 08/06/22) Agrumes : phytophthora : 05 kg /ha Nbre max : 04 01 à 02 applications en automne avant la récolte avec un intervalle min de 21 jours 01 application en hiver avant la reprise végétative DAR : 04 jours (COMM 22/05/24)

197	Fosetyl –al	80%	WP	ALU-VITE WP	F.74-21	TASMID	LIMIN CHEMICAL CO.LTD	Agrumes: Gommose:250 g/hl(COMM09/02/21)
198	Fosetyl –al	80%	WG	ALLUM WG	F.009-16	EL MOUSSEM AGRICOLE	NUFARM	Agrumes: Gommose: 250g/hl; Melon : Mildiou de cuba: 300 g/hl (comm12/01/2018)
199	Fosetyl –al	80%	WG	lotus	F.49-21	SANABEL AGRO	NUFARM	Agrumes: Gommose: 250g/hl; Melon : Mildiou de cuba: 300 g/hl (COMM09/02/21)
200	Fosetyl aluminium	80%	WP	CLEANER WP	F.017-22	FERTITECH	HANGZHOU TOPAGRO BIOSCIENCE	Vigne en plein champ: Mildiou:350 g/hl (3500 g/ha) le produit doit être appliqué sur les raisins au stade initial de la mildiou de la vigne. Intervalle d'application:14 jours Fréquence d'application:3 fois Méthode d'app:par pulvérisation DAR:21 jours.(COMM 08/06/22)
201	Fosetyl-Al	80%	WP	KEYFOL 80 WP	F.004-19	Ets MEZGHANI	LIMIN CHEMICAL CO.LTD	Agrumes: Gommose:250 g/hl;COMM 23/04/2019
202	Fostetyl –aluminium	80% (800 g/kg)	WP	STIN 80 WP	F.06-23	PLANETE VERTE	ASTRANOVA	TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (Phytophthora infestans) :250 g/hl Nbre d'app :3 DAR:7 jours(COMM 28/12/2023)
203	Hexitiazox	25 %	SC	SHOSHI 25 SC	I.20-25	RAYEN PHYTAGRI	LAINCO-Espagne	Palmiers dattier Acariens « Oligonychus afrasiaticus » : Acaricide spécifique de contact et d'ingestion contre les œufs et les larves d'acariens tétrarques 25 ml/hl d'eau(COMM 25/06/2025)
204	Huile essentielle de thym (thymol)	81.87 g/l	EW	NOPATH EW	F.006-19	NUTRIPLANT	KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEM	Fraisier: Pourriture grise (Botrytis cinerea) :1,5 L/ha au stade de jeunes plants;-Application par pulvérisation ;-Application via le système d'irrigation goutte à goutte;-Répéter le traitement tous les 14j à 21j;(COMM 23/04/2019)
205	Hydrogénocarbonat de potassium	994.9 g/kg	WP	VITISAN WP	F.11-25	ALOHA	BIOFA	Vigne :oidium (Uncinula necator) : 5 kg/ha 6 applications/an Stade d'application: BBCH11-82 7 jours DAR:1 jour DRE:6 heures ZNT:5 m(COMM 25/06/2025)
206	Hydroxyde de cuivre	77% soit 50% sous forme de cuivre métal	WP	Copper Progress	F.169-11/21	AGROSYSTEMES	SPEISS URANIA/COSACO GmbH	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl; Vigne : Mildiou, black-rot,bactériose : 1 Kg/hl; Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et

								angulaires : 400 g/hl; Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl; Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl; Arbo :bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
207	Hydroxyde de cuivre	77% soit 50% sous forme de cuivre métal	WP	Patrol 50 WP	F.028-15/25	AMINCO	SPEISS URANIA/COSACO GmbH	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl; Vigne : Mildiou, black-rot,bactériose : 1 Kg/hl; Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl; Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl; Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl; Arbo :bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl(comm 25 juin 2025)
208	Hydroxyde de cuivre	250 g/kg	WG	BLUE SHIELD 25 WG	F.016-22	SOLAGRI	Albaugh.LLC	Vigne :Mildiou(Plasmopara viticola):3kg/ha Application foliaire Intervalle entre les applications:7-14 jours Max:5 applications. (COMM 08/06/22)
209	Hydroxyde de cuivre	40% Cu	WG	Hidrocure WG	F.049-22	FERTITECH	ALINTRA	Tomate :Mildiou(Phytophthora infestans):0.5 kg/hl volume de bouillie:400-1000 l/ha - Traitement foliaire -stade de traitement :BBCH15-BBCH89 Nbre max de traitement 6 app Intervalle entre les traitements :7 jours DAR :15 jours (COMM 08/06/22)
210	Hydroxyde de Cuivre (400 g/l de cuivre métal)	645 g/l	SC	Heliocuivre	F.211-11/21	BIOPROTECTION	Action Pin/AAKO	Vigne :Mildiou : 125 cc/hl; Tomate :Mildiou 150 cc/hl Olivier :Oeil de Paon (Spilocaeaoleaginum) :150 ml/hl 03 applications: -01 app en automne (mi-octobre) -2eme applications au printemps en mi-mars -3eme applications au printemps en mi-mai.(COMM09/02/21)
211	Hydroxyde de cuivre +Métalaxyl	237,7 g/l+45 g/l	SC	CYCLO-R-LIQUIDE	21-16.F	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Tomate :Mildiou(Phytophthora infestans):250 cc/hl(produit systémique); -pulvérisation foliaire;-1 à 3 traitements par cycle de la culture (du stade après floraison BBCH 61-69);-DAR : 28 jours. (COMM 09/02/21)
212	Hymexazole	300 g/L	SL	Tachigaren	F.056-11/21	AGRIPROTEC	Mitsui Chemicals Agro,Inc/summit agro	Tomate, piment, cucurbitacées : Fusarium : 200 cc/hl;(3 Litres de bouillie/m²)
213	Iprovalicarbe +Oxychlorure de cuivre	8,4 % +40,6%	WG	Positron 49	F.058-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Vigne : Mildiou : 150 g/hl; Tomate : Mildiou : 175 g/hl Tomate :Alternariose(Alternaria solani) :200 g/hl (Comm 16/07/2025)

214	Isofetamid	400 g/l	SC	Kenja SC	F.20-21	Agriprotec	ISK Biosciences Europe N.V(fabricant)/upl(fournisseur)	Vigne: Pourriture grise(Botrytis cinerea) :120 cc/hl(1.2 l/ha) -Mode de trait. : foliaire -Calendrier des app :dès les premiers signes d'infestation. -Nb de trait :max 2 par saison avec intervalle min de 21 jours -DAR :21 jours(COMM09/02/21)
215	Kreoxim-méthyl	500 g/kg	WG	SUGOBY WG	F.02-23	RAYEN PHYTAGRI	LAINCO ,S,A/ESPAGNE	OLIVIER :Œil de paon(spilocaeaoleagina) :0.2 kg/ha(20 g/hl) nbre d'application:2 (COMM 28/12/2023)
216	Krésoxim-méthyl	50%	WG	QUIMERA WG	F.001-22	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Vigne de cuve: Oidium(Uncinulanecator)::20g/hl avec un volume de bouillie 800-1000l d'eau/ha - Stade:1ère application lorsque les premiers signes apparaissent (BBCH19-81) - Intervalle entre 02 traitements:14 jours-Nbre d'app:3 DAR:35jours (COMM 08/06/22) Pommier : Tavelure (Venturia inaequalis) :20g/hl Volume de bouillie : 800-1000l/ha -DAR:35jours Stade BBCH 57(dvp d'inflorescence -intervalle entre 02 traitements:14 jours -Nb de app:3 applications(Comm 16/07/2025)
217	Krésoxim-méthyl	50%	WG	ALLIAGE DF	F.60-21	AGRIMATCO	BASF	Vigne : Oïdium : 20 g/hl Pommier : Tavelure : 20 g/hl(COMM09/02/21)
218	Krésoxim-méthyl	350g/l	SC	Kresoxystar 350SC	F.030-22	Ets Mezghani	ANHUI HUAXING CHEMICAL INDUSTRY CO.Ltd/CHINE(Nanjing agrochemical	Blé dur: Oidium: 600 ml/ha (COMM 08/06/22)
219	Krésoxim-méthyl	50%	WG	Stroby DF	F.059-11/21	STIMA	BASF	Vigne : Oïdium : 20 g/hl Pommier : Tavelure : 20 g/hl
220	Krésoxim-méthyl	50%	WG	ARIANE WG	F.06-25	FERTITECH	HANGZHOU TOPAGRO BIOSCIENCE/Chine	Vigne :oidium (Uncinula necator) :40 g/hl Volume de bouillie : 1000 l/ha -max 3 applications à min 7 jours intervalle -stades phénologiques BBCH:15-81&91 (Comm 25/06/2025)
221	Krésoxim-méthyl + difenoconazole	250 g/kg +125g/kg	WG	DECIBEL MAX WG	F.01-23	AGROSYSTEMES	ASCENZA GRO S.APORTUGAL	OLIVER :œil de paon(spilocaeaoleagina) :0.3 kg/ha (30g/hl) Au printemps à BBCH 50-59 (pendant le développement de l'inflorescence et avant l'ouverture des premières fleurs)

								DAR: Non requis -nbre d'application:2 (COMM 28/12/2023)
222	Laminarin	45g/l	SL	VACCIPLANT	F.28-21	EL MOUSSEM	GOEMAR SAS/ARYSTA/UPL	Vigne :Oidium(Uncinulanecator):150 cc/hl(1.5 l/ha)-application foliaire-nbre max d'app par cycle:10-Débuter les app avant le dvp de la maladie et continuer à un intervalle de 7 à10 jours.-le produit peut être appliquer de la floraison à la récolte Fraisier :Oidium(Podosphaeraaphanis):150 cc/hl(1.5 l/ha)-application foliaire-nbre max d'app par cycle:10-Débuter les app avant le dvp de la maladie et continuer à un intervalle de 10 jours.-le produit peut etre appliquer au démarrage de la végétation Fraisier :Pourriture grise (Botrytis cinerea) :150 cc/hl(1.5 l/ha)-application foliaire-nbre max d'app par cycle:10-Débuter les app avant le dvp de la maladie et continuer à un intervalle de 10 jours.-le produit peut être appliquer de la floraison à la récolte(COMM09/02/21) Tomate sous serre :Pourriture grise (Botrytis cinerea):150 cc/hl (1.5 l/ha)-application foliaire-nbre max d'app par cycle:10-Débuter les app avant le dvp de la maladie et continuer à un intervalle de 10 jours.-le produit peut être appliquer de la floraison à la récolte. (COMM 08/06/22)
223	Mandipropamid+ Oxathiapiprolin	250g/l +30 g/l	SC	ORONDIS ULTRA280 SC	F.77-21	Cotugrain	Syngenta Crop Protection	Tomate :Mildiou (Phytophthora infestan): 0.4 l/ha -Intervalle minimum entre les applications:15 jours -Nbre d'applications au max :3 /cycle -1è reapplication est faite une semaine après le repiquage - en préventif -DAR:3 jours (APV/COMM09/02/21, Homologation/COMM 08/06/2022) Vigne :Mildiou:0.7 l/ha -application foliaire -intervalle min entre application:10 jours Nombre d'application maximum :3 /cycle - <u>en préventif</u> -DAR:21 jours(com 27/12/22)

224	Mandipropamide	250 g/L	SC	amphore SC	F.69-21	SOLAGRI	SYNGENTA	Pomme de terre : Mildiou : 40 cc/hl; Tomate : Mildiou : 50 cc/hl (COMM09/02/21)
225	Mandipropamide +Difenoconazole	250 g/l + 250 g/l	SC	CARIAL TOP	F.006-16	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Pomme de Terre : Mildiou : 50 cc/hl; Melon : Alternariose: 50 cc/hl; Tomate :Mildiou :50 cc/hl; comm 20/06/2017
226	Manipropamide +zoxamid	250 g/kg+240 g/kg	WG	Ampexio WG	F.022-22	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Vigne :Mildiou:0.5 kg/ha -volume de bouillie:400-1000 l Stade préventive Nbre max : 3/saison Durée entre les app 10 jours DAR : 21 jours. (COMM 08/06/22) Tomate : Mildiou (<i>Phytophora infestans</i>) :0.5 kg/ha Volume de bouillie : 600-800 l/ha Foliaire préventif Nbre d'app : 3 Durée entre app : 7-10 jours DAR 03 jours (Comm 16/07/2025)
227	Méfenoxam + Folpel	5% + 40 %	WG	Ridomil Gold Combi WG	F.072-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Vigne : Mildiou : 200 g/hl soit 2 Kg/ha ; Tomate : Mildiou: 200 g/hl(COMM27/12/22) Melon : mildiou (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>):200g/hl Volume de bouillie : 800-1000 l/ha Foliaire préventif Nbre d'app : 2 Durée entre app : 7-10 jours DAR 21 jours (Comm 16/07/2025)
228	Mefentrifluconazole	10%	EC	REVYSTAR EC	F.035-22	AGRIMATCO	BASF	Blé tendre : Rouille: 0.75 l/ha Volume de bouillie: 300 l/ha -pulvérisation foliaire -stade d'application: BBCH32-BBCH59 -nbre d'app:02 traitement au max, intervalle de 21 à 28 jours DAR:35 jours (COMM 08/06/22)
229	Mefentrifluconazole + Pyraclostrobin	10%+10%	EC	REVYCARE EC	F.036-22	AGRIPROTEC	BASF	Blé tendre : Rouille: 0.75 l/ha Volume de bouillie:300-400l/ha pulvérisation foliaire -stade d'application: le 2ème nœud-fin épiaison -nbre d'app:02 traitements au max, intervalle de 21 à 28 jours

								-DAR:30 jours. (COMM 08/06/22)
230	Mefentrifluconazole +Fluxapyroxade	100 g/l+50g/l	EC	VERYDOR	F.032-22	COTUGRAIN	BASF	Blé dur: Oidium:0.75 l/haVolume de bouillie:300-400l/hapulvérisation foliaire-stade d'application:BBCH 32-BBCH59 -nbre d'app:02 traitements au max, -intervalle de 21 à 28 jours-DAR:35 jours Blé tendre: Rouille:0.75 l/haVolume de bouillie:300-400l/ha-pulvérisation foliaire-stade d'application:BBCH 32-BBCH59 -nbre d'app:02 traitements au max, -intervalle de 21 à 28 jours-DAR:35 jours. (COMM 08/06/22)
231	Mefentrifluconazole+Fluxapyroxade	66,7g/l +66,7g/l	EC	REVYTREX EC	F.031-22	BIOPROTECTION	BASF	Blé dur: Oidium:1 l/ha Volume de bouillie:300-400l/ha pulvérisation foliaire -stade d'application: le 2ème nœud-fin épiaison -nbre d'app:02 traitements au max, intervalle de 21 à 28 jours -DAR:30 jours (COMM 08/06/22) Blé tendre: Rouille :1 l/ha 300-400l/ha pulvérisation foliaire -stade d'application: le 2ème nœud-fin épiaison -nbre d'app:02 traitements au max, intervalle de 21 à 28 jours -DAR:30 jours. (COMM 08/06/22)
232	Melaleucaalternifolia(extrait d'arbre a thé)	25%	EC	TIMOREX GOLD EC	F.15-23	ATLAS AGRICOLE	SIPCAM INAGRA	TOMATE SOUS SERRE : oidium (Leveillulataurica):150 cc/hl Volume de bouillie :400 l/ha Traitement foliaire Nbre max de traitement 4 app/an (COMM 28/12/2023)
233	Meptyldinocap	350 g/L	EC	Karathane 350 EC	F.077-11/21	SEPCM	DOW AGROSCIENCES/CORT EVA	Vigne : Oïdium : 20 cc/hl
234	Meptyldinocap	350 g/L	EC	AGRIKAR EC	F.28-23	AGRIPROTEC	DOW AGROSCIENCES/CORT EVA	Vigne : Oïdium : 20 cc/hl(COMM 28 dec 2023) Comm 25 juin 2025
235	Metalaxyl	25%	WP	milor 25 WP	F.30-21	SANABEL AGRO	IQV	Fraisier : Pourriture du collet(Phytophthora spp) :1.5 kg/ha -Par pulvérisation foliaire - 2 applications/cycle

								1 mois de protection-(COMM09/02/21) (COMM 19 avril 2023)
236	Metalaxyl	317 g/l	FS	RAMPART FS	F.42-21	AGRIPROTEC	UPL LIMITED	Semences de blé: Fusariose(Fusariumspp) :20 ml/100 kg de semences(500 ml d'eau/100 kg de semences)-traitement de semences à appliquer avant semis-traitement préventif et curatif-Nbre de traitement:1(COMM09/02/21)
237	Metalaxyl +Folpet	10%+40%	WP	ARMETIL COMBI	F.015-22	SOCOOPEC	IQV	Vigne : MildiouPlasmoparaviticola:200 g/hl -volume de bouillie:1000 l/ha Pulvérisation foliaire -max 04 app à min -10 jours d'intervalle DAR:28 jours. (COMM 08/06/22)
238	Metalaxyl +Folpet	10%+40%	WP	MEVAXIL F	F.09-24	NEGANOR FFT	IQV	Vigne : MildiouPlasmoparaviticola:200 g/hl -volume de bouillie:1000 l/ha Pulvérisation foliaire -max 04 app à min -10 jours d'intervalle DAR:28 jours. (COMM 22/05/24)
239	Metalaxyl –M +cuivre (oxychlorure de cuivre)	2% + 14.19%	WG	ARIS GOLD R WG	F.26-25	COTUGRAIN Impex	SYNGENTA	Tomate :Mildiou (Phytophthora infestans) : 5 kg/ha App foliaire 2 app max(7-14 jours entre app) Stade d'app:BBCH13-BBCH70 DAR:3 jours(Comm 16/07/2025)
240	Metalaxyl-M +fludioxinil + sedaxane	37,5%+25,04%+ 49,98g/l	FS	VIBRANCE MAXX FS	F.029-22	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Semences des féveroles: Anthraxnose, Fusariose, Pythium:100 ml/100 kg de semences -avant semis -compléter avec 900 ml d'eau pour 100 kg de semences -nbre d'application:1 (COMM 08/06/22)
241	metalaxyl-M +hydroxyde de cuivre	28.5 g/l+215 g/l	SC	CYCLO MAX SC	F.08-23	EL KHADRA	AFRASA INDUSTRIALS/ESPAGNE/ ALBAUGH EUROPE SARL ALBAUGH EUROPE SARL	TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (Phytophthora infestans) :300 cc/hl (03 l/ha) Volume de bouillie 500-1000 l d'eau/ha -application foliaire -stade végétative BBCH 36-81 mode d'application:bommspraying: jet de vol élevé; utilisation professionnelle sur le terrain -DAR:03 jours -nbre d'application:03 app/an espacée de 7 à 10 jours(COMM 28/12/2023)

242	Metirame de zinc	80%	WP	Polyram DF	F.078-11/21	STIMA	BASF	Laitue , Tomate, p.de terre,vigne: Mildiou : 200 g/hl
243	Metirame de zinc	80%	WG	LUTIRAM WG	F.53-21	AGRIPROTEC	BASF	Laitue , Tomate, p.de terre,vigne: Mildiou : 200 g/hl(COMM09/02/21)
244	Metrafenone	500g/L	SC	VIVANDO	F.015-13/23	AGRIPROTEC	BASF / SBM FORMULATION	Blé : Piétin verse : 0.3 l/ha; Vigne :Oidium :0.2 l/ha (comm 17/05/2016) Piment :Oidium:0.2 l/ha -Volume de bouillie:1000 l/ha-Mode de trait: - Pulvérisation foliaire-période de trait:preventif -Nbre max de trai:2-Calendrier des trai: conditions favorables au developpement de la maladie -DAR:3 jours. Melon :Oidium:0.2 l/ha -Volume de bouillie:1000 l/ha-Mode de trait: pulvérisation foliaire-période de trait:preventif- Nbre max de trai:2-Calendrier des trai: conditions favorables au développement de la maladie -DAR:3 jours Tomate sous serre :Oidium(Leveillulataurica):0.2 l/ha Volume de bouillie:1000 l-Mode de trait: pulvérisation foliaire-période de trait:preventif- Nbre max de trai:2-Calendrier des trai: conditions favorables au développement de la maladie -DAR:3 jours (COMM 08/06/22)(COMM 19 avril 2023)
245	Myclobutanil	240 g/L	EC	MYCLAS	F.014-19	SANABEL AGRO	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Vigne : Oïdium : 20 cc/hl; COMM 23/04/2019
246	Myclobutanil	200 g/l	EW	TOPOGAN	F.011-19	SANABEL AGRO	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Vigne :Oïdium:30 cc/hl(0.3 l/ha); -Pulvérisation foliaire;-2 à 3 traitements /saison;- 14 j de protection;(COMM 23/04/2019)
247	Myclobutanil	240 g/L	EC	MYCLONE 24 EC	F.002-18	RayenPhytagri	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Melon :Oïdium : 30 cc/hl (COMM 12/01/2018)
248	myclobutanil	240 g/l	EC	PROMY	F.64-21	AGRINOVA	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Melon :Oïdium : 30 cc/hl (COMM 09/02/21)
249	Myclobutanil	240 g/L	EC	Systhane 240 EC	F.081-11/21	SEPCM	DOW AGROSCIENCES/corteva	Vigne : Oïdium : 20 cc/hl
250	Myclobutanil	240 g/L	EC	DAYZER	F.043-17	SOCOOPEC	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Vigne : Oïdium : 20 cc/hl; (COMM 18/10/2017)

251	Myclobutanil	125 g/l	EC	MYCLO EC	F.41-21	NEGANOR	indofil industries limited	Vigne :Oidium(Uncinulanecator):40 cc/hl(1000 l/ha) -mode de traitement: application foliaire en préventif et curatif -stade d'application: première fleures ouvertes jusqu'au début de la coloration des fruits. -1-3 applications/cycle -intervalle entre les applications:10 joursDAR:15 jours (COMM09/02/21)
	Myclobutanil	125 g/l	EC	FLUANCE 125 EC	F.25-23	EL MOUSSEM AGRICOLE	Indofil Industries Limited/ARISTEAS Agro	Vigne :Oidium(Uncinulanecator):40 cc/hl(1000 l/ha) -mode de traitement: application foliaire en préventif et curatif -stade d'application: première fleures ouvertes jusqu'au début de la coloration des fruits. -1-3 applications/cycle -intervalle entre les applications:10 jours DAR:15 jours (COMM 28/12/2023)
	Oxathiapiprolin +famoxadone	30 g/l+300 g/l	SE	Zorvecencantia SE	F.048-22	EL BARAKA	CORTEVA	Tomate :Mildiou(Phytophthora infestans): 0.5 l/ha avec un volume de bouillie:200-1000 l/ha DAR:3 jours Nbre max d'app:3/culture(6par saison-serre) (COMM08/06/22)
	Oxathiapiprolin +zoxamide	40 g/l+300 g/l	SE	ZorvecVinabel SE	F.020-22	ATLAS AGRICOLE	CORTEVA	Vigne:Mildiou:0.5 l/ha nbre d'app:2 avec intervalle de 10 jours stade d'app:BBCH15-BBCH79 DAR:28 jours(COMM 08/06/22)(COMM27/12/22)
	Oxychlorure de cuivre	678.6 g/l (équivalent à 380 g/l cuivre métal)	SC	Valtonexflow SC	F.018-22	NEGANOR	IQV	Vigne :Mildiou(plasmopara viticola): 200 ml/hl (2 l/ha) -volume de bouillie:1000 l/ha -Mode de trait: pulvérisation foliaire -période de trait:preventif -Nbre max de trai:6/saison -stade phénologiques BBCH:15-81&91 -min intervalle entre applications:7 jours -DAR:21 jours.(COMM08/06/22)
252	Oxychlorure de Cuivre	85 % (50 % de cuivre metal)	WP	Agrocuiivre	F.168-11/21	AGROSYSTEMES	SPEISS URANIA/COSACO GmbH	Pomme de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arboriculture : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Arboriculture :Bactériose, Coryneum, chancre Cloque, feu bactérien, Tavelure, septoriose

								:500g/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl
253	Oxychlorure de cuivre	877 g/kg (500 g/kg cuivre métal)	WP	CUPROCAFFAR O WP	F.14-23	LIEN AGRICOLE	ISAGRO SPA/GOWAN	TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (Phytophthora infestans) :3.5 kg/ha(350g/hl) Volume de bouillie 600-800 l/ha Nbre d'app :4 -BBCH:15-85 -durée de protection 14 jours (COMM 28/12/2023)
254	Oxychlorure de Cuivre	85 % (50 % de cuivre metal)	WP	Cuprumax 50 WP	F.027-15/25	AMINCO	SPEISS URANIA/COSACO GmbH	Pomme de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arboriculture : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Arboriculture :Bactériose, Coryneum, chancre Cloque, feu bactérien, Tavelure, septoriose :500g/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl (comm 25 juin 2025)
255	Oxychlorure de cuivre	89.3%p/p(56% cu métal min)(50%CU métal)	WP	VALTOSAN WP	F.31-25	FERTITECH	ALINTRA-ESPAGNE	Tomate : Mildiou (Phytophthora infestans) :400 g/hl stade d'application: BBCH 15-89 Nbre d'app:6 au max Intervalle d'app:07 jours (Comm 16/07/2025)
256	Oxychlorure de cuivre +cymoxanil	25%+4%	WG	Curame 25 WG	F.023-22	ATLAS AGRICOLE	Manica SPA	Vigne :Mildiou: 3 kg/ha (300g/hl) -volume de bouillie:800 l/ha Application foliaire Nbre max de traitement :4/cycle Tomate : Mildiou(Phytophthora infestans):3 kg/ha (300g/hl) volume de bouillie: 400 l/ha Application foliaire Nbre max de traitement :5/cycle Intervalle entre application :8 à10 jours (COMM 08/06/22)
257	Penconazole	100 g/L	EC	Topenco 100 EC	F.082-11/21	AGROSYSTEMES	GLOBACHEM	Vigne : Oïdium : 25 cc/hl; Tomate, Pommier : Oïdium : 50 ml/hl

258	Penconazole	100 g/L	EC	Buckler	F.033-15/25	AMINCO	GLOBACHEM	Vigne : Oïdium : 25 cc/hl; Tomate, Pommier : Oïdium : 50 ml/hl(comm 25 juin 2025)
259	Penconazole	100 g/L	EC	Topaze 100	F.083-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Vigne : Oïdium : 25 cc/hl; Tomate, Pommier : Oïdium : 50 ml/hl
260	Pencycuron	250 g/L	EC	Monceren	F.085-11/21	PROMOCHIMIE	BAYER CROPS SCIENCE/GowanCrop Protection	Semences de p.de terre : Rhizoctoniasolani : traitement des semences : 60 ml PC/100 Kg
261	Penthiopyrad	205 g/l	SC	KABUTO	F.026-22	EL MOUSSEM	Mitsui Chemicals crop&lifedolutions,Inc(fab) / Summit Agro International Ltd(fournisseur)	Vigne de table :Pourriture grise (Botrytis cinerea):150 cc/hl (1.5 l/ha) -application foliaire -Nbre max d'app par cycle:3 -débuter les app avant le dvp de la maladie et continuer à un intervalle de 10 à 14 jours -utiliser le taux le plus élevé et l'intervalle le plus court lorsque la pression de la maladie est élevée. -ne pas faire plus de 2 app séquentielles avant de passer ayant un mode d'action différent. -DAR:7 jours -LMR:0.01 mg/kg (COMM 08/06/22) TOMATE SOUS SERRE : Pourriture grise (Botrytis cinerea): 150 cc/hl (1.5 l/ha) -application foliaire -Nbre max d'app par cycle:4 -débuter les app avant le dvp de la maladie et continuer à un intervalle de 7 à 14 jours utiliser le taux le plus élevé et l'intervalle le plus court lorsque la pression de la maladie est élevée. -ne pas faire plus de 2 app séquentielles de fongicides RAMPART avant de passer ayant un mode d'action différent -DAR:1 jours -LMR:2 mg/kg (COMM 28/12/2023)
265	Prochloraze +Triticonazole	60 g/l +20 g/l	FS	REAL SUPER	F.025-17	AGRIPROTEC	BASF	Semences de blé : Carie, Charbon : 200 cc du Produit + 0.5 L d'eau/QL;(COMM20/06/2017); Semences de blé : Fusariose:200 cc du Produit + 0.5 L d'eau/QL; Mode de traitement : traitement des semences;Nombre des traitements :1;Calendrier des applications : avant semis (COMM13/02/2020)

274	Prompaocarb +Cymoxanil	400 g/l+50g/l	SC	Rival duo 450 SC	F.07-21	AGRONOMIC Land	Agria	Pomme de terre: Mildiou: 1.5 l/ha -pulvérisation foliaire -nbre d'application :6 -DAR : 14 jours(COMM09/02/21)
275	Prompaocarb +Cymoxanil	400 g/l+50g/l	SC	OMIX DUO 450 SC	F.071-22	NEGANOR	Agria	Pomme de terre: Mildiou: 1.5 l/ha -pulvérisation foliaire -nbre d'application :6 -DAR : 14 jours(COMM27/12/22)
269	Propamocarb	722g/l	SL	omix 607 SL	F.17-21	NEGANOR	Agria	Tomate : Fonte de semis(P ythium spp) :2.5 l/ha (1000 l d'eau) -le produit s'applique en traitement du sol -effectuer la première application à la transplantation -02 applications peuvent être faites après la transplantation à un intervalle de 7 à 10 jours -nombre maximum de traitement:3(COMM09/02/21)
270	Propamocarb	722g/l	SL	PROPAMIX SL	F.11-24	TASMID	AGRIA	Tomate : Fonte de semis(P ythium spp) :2.5 l/ha (1000 l d'eau) -le produit s'applique en traitement du sol -effectuer la première application à la transplantation -02 applications peuvent être faites après la transplantation à un intervalle de 7 à 10 jours -nombre maximum de traitement:3 (COMM 22/05/24)
271	Propamocarb	72.2 %	SL	PRO-CARB SL	F.20-23	SHARDA CROP CHEM LIMITED TUNISIA	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	CONCOMBRE : Phythium : 250 cc/hl 02 app au max préventif ou curatif (COMM 28/12/2023)
272	Propamocarb	72.2 %	SL	PRIVATE SL	F.12-24	SANABEL AGRO	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	CONCOMBRE : Phythium : 250 cc/hl 02 app au max préventif ou curatif (COMM 22/05/2024)
273	Propamocarb +Cymoxanil	400 g/l+50g/l	SC	proxanil 450 SC	F.06-21	BIOPROTECTION	arystalifescience	Pomme de terre : Mildiou :2.5 l/ha-préventif et curatif -conditions favorables à l'apparition de la maladie-DAR : 14 jours Tomate: Mildiou(Phytophthora infestans):2,5l/ha(produit systémique) (APV avec reconduction de l'essai)-préventif et curatif-conditions favorables à l'apparition de la maladie-03 applications au max-Intervalle d'application : 7 jours-DAR : 3 jours (COMM09/02/21)

279	Propamocarb Hydrochloride	722 g/l	SL	RIVAL 607 SL	F.17-23	AGRIPROTEC	AGRIA	MELON SOUS SERRE :Mildiou de cuba :200 cc/hl Traitement foliaire nbre d'app2 (COMM 28/12/2023)
280	Propamocarb Hydrochloride	722 g/l	SL	PROPAMINE 722 SL	F.21-25	SSCC	AGRIA	MELON SOUS SERRE :Mildiou de cuba :200 cc/hl Traitement foliaire nbre d'app2 (COMM 25/06/2025)
266	Propamocarbe	722 g/L	SL	PROMORE 722 SL	F.021-18	Ets MEZGHANI	ASTRACHEM	Concombre, Melon s/serre : Mildiou de cuba :200 cc/hl; Concombre : Pythium : 250 cc/hl; P. de terre : Mildiou : 200 cc/hl;(COMM 18/10/2018)
267	Propamocarbe	722 g/L	SL	Promess	F.012-15/25	JADWA AGROTEC	ARYSTA Life Science Benelux / Belgique/arystalifescience/ UPL	Concombre, Melon s/serre : Mildiou de cuba :200 cc/hl; Concombre : Pythium : 250 cc/hl; P. de terre : Mildiou : 200 cc/hl(comm 25 juin 2025)
268	Propamocarbe	722 g/L	SL	PROPLANT	F.199-11/21	PROTAGRI	ARYSTA Life Science Benelux / Belgique	Concombre, Melon s/serre : Mildiou de cuba :200 cc/hl; Concombre : Pythium : 250 cc/hl; P. de terre : Mildiou : 200 cc/hl
276	Propamocarbe + Fluopicolide	625 g/l + 62,5 g/l	SC	Volare	F.091-11/21	EL MOUSSEM AGRICOLE	BAYER AG	P. de terre, Tomate, Piment : Mildiou : 150 cc/hl; Oignon :Mildiou :150 cc/hl; comm 20/06/2017
277	Propamocarbe +Fosethyl-Al	530 g/L +310 g/L	SL	Filex Energy	F.089-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	P. de terre : Mildiou : 1,5 L/ha; Cucurbitacées : Phytium : 2 L/ha; Concombre, Melon : Mildiou de cuba : 1,5 L/ha TOMATE SOUS SERRE : Fonte de semis :3 l/ha -dans le système d'irrigation -NBBCH01-BBCH19 Nbre d'app :2 app(1 traitement au moment du repiquage et l'autre 30 jours après) (COMM 28/12/2023)
278	Propamocarbe +Fosethyl-Al	530 g/L +310 g/L	SL	Previcur Energy	F.023-14/24	EL MOUSSEM AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	P. de terre : Mildiou : 1,5 L/ha; Cucurbitacées : Phytium : 2 L/ha; Concombre, Melon : Mildiou de cuba : 1,5 L/ha
281	Proquinazid	200 g/l	EC	Talendo	F.101-11/21	SEPCM	DU PONT/Corteva	Arbo: Oïdium (stade floraison à la fermeture de la grappe) : 25 cc/hl
282	Proquinazid	200 g/l	EC	ASSOCIATE EC	F.27-23	ATLAS AGRICOLE	DU PONT/Corteva	Arbo: Oïdium (stade floraison à la fermeture de la grappe) : 25 cc/hl (comm25 juin 2025)

283	Prothioconazole	25%	EC	PROTEZOLE EC	F.057-22	SANABEL AGRO	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Blé dur: Rouille: 0.8 L/ha (500 l/ha) (COMM 08/06/22)
284	Prothioconazole	25%	EC	Mirage EC	F.35-21	SHARDA CROP CHEM LIMITED tunisie	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Blé dur: Rouille: 0.8 L/ha (500 l/ha) - stade BBCH 31-65 (COMM09/02/21)
286	Prothioconazole + Trifloxystrobin	175 g/L + 88 g/L	SC	Madison 263 SC	F020-13/23	SEPCM	BAYER CROPS SCIENCE	Blé : Septoriose : 0.75 L/ha; Blé : Rouille, Fusariose: 1 l/ha; (COMM18/10/2018) (COMM 19 avril 2023)
287	Prothioconazole + Trifloxystrobin	175 g/L + 88 g/L	SC	DELARO DUO SC	F.03-24	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPS SCIENCE	Blé : Septoriose : 0.75 L/ha; Blé : Rouille, Fusariose: 1 l/ha; (COMM 22/05/24)
285	Prothioconazole + benzovindiflupyr (SOLATEN OL)	150 g/l + 75 g/l	EC	CERATAVO ERA	F.034-22	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Blé tendre: Rouille: 1 l/ha Volume de bouillie: 300 à 400 l Foliaire en préventif et en curatif - - Stade d'application: BBCH 31-69 (Epi 1 cm-fin floraison) - nbre d'application: 2 - durée entre les applications: 2-3 semaines (en fonction de l'intensité de l'attaque) - DAR: 35 jours. (COMM 08/06/22)(COMM27/12/22)
288	Prothioconazole + Tebuconazole	12,5% + 12,5%	EC	PROTECT PLUS EC	F.061-22	EXCEL AGRI	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Blé dur: Rouille : 1 l/ha (100-300 l/ha) - stade BBCH 31-32 ne dépasser BBCH 71 - 02 app d'un intervalle de 21 jours entre les 2. (COMM09/02/2021) ; (COMM08/06/2022)
289	Prothioconazole + Tebuconazole	12,5% + 12,5%	EC	Perfecto EC	F.36-21	SHARDA CROP CHEM LIMITED tunisie	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Blé dur: Rouille : 1 l/ha (100-300 l/ha) - stade BBCH 31-32 ne dépasser BBCH 71 - 02 app d'un intervalle de 21 jours entre les 2 (COMM09/02/21)
290	Prothioconazole + Tebuconazole	125 g/L + 125 g/L	EC	Prosaro 250 EC	F.098-11/21	PROMOCHIMIE	BAYER CROPS SCIENCE	Céréales : Septoriose, rouille, oïdium, Fusarium : 0,8 L/ha
291	Prothioconazole + Tebuconazole + Spiroxamine	100 g/L + 100 g/L + 250 g/L	EC	Cello	F.021-17	AGRONOMIC Land	BAYER CROPS SCIENCE	Blé : Septoriose : 1 l/ha (COMM 20/06/2017)
292	Prothioconazole + Tebuconazole + Bixafen	100 g/l + 100 g/l + 75 g/l	EC	SKYWAY XPRO EC	F.012-18	PROMOCHIMIE	BAYER AG	Blé : Rouille: septoriose : Fusariose : 1 l/ha (Application foliaire; DAR : 30 jours); (COMM 18/10/2018); Blé: Piétin verse (1 à 2 noeuds): 1.25 l/ha; - application foliaire (COMM13/02/2020)
295	Pyraclostrobin + Boscalid	6,7% + 26,7%	WDG	MIRACLE WDG	F.038-22	SHARDA CROP CHEM LIMITED Tunisie	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Tomate: Mildiou (Phytophthora infestans): 1 kg/ha - Intervalle min entre app: 15 jours Nb de app au max : 3 /cycle - 1 ^{ère} application est faite une semaine après le repiquage (COMM 08/06/2022)

296	Pyraclostrobin + Boscalid	6,7%+26,7%	WDG	ORACLE 33 WG WDG	F.076-22	SLDA	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Tomate: Mildiou (Phytophthora infestans):1 kg/ha -Intervalle min entre app:15 jours Nbre d'app au max :3 /cycle -1 ^{ère} application est faite une semaine après le repiquage (COMM 27/12/22)
262	Pyraclostrobin +Boscalid	10%+20%	SC	FOXTON 30 SC	F.24-23	AGRIMATCO	LoatingYoloo Bio-Technology Co ,Ltd/chine	Fraise : Pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>) :1.25 l/ha Pulvérisation foliaire, Max 02 application/saison, intervalle de 7 à 10 jours entre deux applications. (COMM 28/12/23)
263	Pyraclostrobin +Boscalid	13% + 25%	WG	BELAGIO WG	F.39-25	SEPCM	AAKO	Courgette : Pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>) :650g/ha Volume de bouillie : 750l/ha Nombre de traitement : 02 applications/cycle DAR:7 jours(Comm 16/07/2025)
302	Pyraclostrobin +boscalid	12,8%+25,2%	SC	Crystal SC	F.027-22	FERTITECH	HANGZHOU TOPAGRO BIOSCIENCE	Vigne de table: Pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>): 285 g/ha - Traitement foliaire Nbre max de traitement 3 app Intervalle entre les traitements :21 jours DAR :7 jours.(COMM 08/06/22)
300	Pyraclostrobin +Fenpropimorph	100g/l+375 g/l	EC	COMET PLUS EC	F.38-21	Agriprotec	BASF	Blé dur: Rouille;Septoriose :1 l/ha(200-300 l/ha) -pulvérisation foliaire Calendrier d'app:BBCH 25-69 -nbre max :2 -intervalle d'application: de 21-28 jours -DAR:35jours(COMM09/02/21)
301	Pyraclostrobin +fluxapyroxad	333 g/l+167 g/l	SC	ORKESTRA SC	F.033-22	BIOPROTECTION	BASF	Blé tendre : Rouille: 0.4 l/ha Volume de bouillie: 300 à 400 l -Application foliaire -Stade d'application:Le 2 ^e émettueur-fin épiaison -nbre d'application:2 -durée entre les applications:;21 à 28 jours DAR:30 jours.(COMM 08/06/22)
293	Pyraclostrobine Metconazole	130 g/l +80 g/l	EC	OPTIMO DUO EC	013-18F.	AGRIPROTEC	BASF	Blé : Rouille, septoriose : 0.75 l/ha (Pulvérisation foliaire; Stade BBCH 32 à 59;Max d'app.:2; DAR : 35 jours)(COMM 18/10/2018)
299	Pyraclostrobine + Dimethomorphe	40 g/l + 72 g/l	EC	Cabrio Duo	F.001-14/24	AGRIPROTEC	BASF	Pomme de terre : Mildiou : 2.5 l/ha; Vigne : Oïdium : 2.5 l/ha (comm18/10/2017) (comm 22 mai 2024)

294	Pyraclostrobine +Tebuconazole	115 g/l+230 g/l	SC	PILARTEP SC	F.04-23	RAYEN PHYTAGRI	PILARQUIIM (jiangsu) CO.LTD CHINE	Agrumes : Anthracnose (Colletotricumgleosporoides ou/et Colletotrichumacutatum):50 cc/hl(0.5 l/ha) Volume de bouillie:1000 l/ha -appliquer en pulvérisation foliaire -appliquer en préventif ou dès l'apparition des premiers symptômes(COMM 28/12/2023)
264	Pyrimethanil	400 g/l	SC	LAITANE SC	F.23-23	RAYEN PHYTAGRI	LAINCO ,S,A/ESPAGNE	Fraise : Pourriture grise (Botrytis cinerea) :2 l/ha Appliquer pendant BBCH 60-89 COMM 28/12/2023)
304	Pyrimethanil	600 g/l	SC	ETHPYRI SC	F.18-23	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE : Pourriture grise(Botrytis cinerea) : 125 ml/hl Volume de bouillie :500-600 l/ha Nb de d'application :04(COMM 28/12/2023)
305	Pyrimethanil	600 g/l	SC	PYROS SC	F.07-24	COTUGRAIN Impex	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD	TOMATE SOUS SERRE : Pourriture grise (Botrytis cinerea) : 125 ml/hl Volume de bouillie :500-600 l/ha Nb de d'application :04(COMM 22/05/2024)
306	Pyrimethanil	400 g/l	SC	PRETIL SC	F.21-23	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRASA S.A / ALBAUGH EUROPE SARL	Fraise : Pourriture grise (Botrytis cinerea) :200 cc/hl(2l/ha) Volume de bouillie :400-1000 l/ha -application foliaire -stade vegetative BBCH60-89 mode d'application:bommspryingmjet de vol élevé;utilisation professionnelle sur le terrain -DAR:03 jours -nbre d'application:02 app/an (COMM 28/12/2023) Vigne : Pourriture grise (Botrytis cinerea) :200 cc/hl (2l/ha) Volume de bouillie : 400-1000 l/ha -application foliaire -stade végétative BBCH60-89 mode d'application:bomm spraying jet de vol élevé; utilisation professionnelle sur le terrain -DAR:03 jours -nbre d'application:02 app/an (Comm 25/06/2025)
307	Pyriméthanil	300 g/L	SC	Scala 300 SC	F.102-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Vigne, Fraisier, Tomate : Botrytis : 250 cc/hl; Pommier : Tavelure : 100 cc/hl
308	Pyriméthanil	300 g/L	SC	Mythos300 SC	F.103-11/21	EL MOUSSEM AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Vigne, Fraisier, Tomate : Botrytis : 250 cc/hl; Pommier : Tavelure : 100 cc/hl

309	Pyriméthanil	40%	SC	PYRAMIDE	F.062-22	EXCEL AGRI	SHARDA CROPCHAM LIMITED INDE	Tomate : Pourriture grise(Botrytis cinerea) :150 cc/hl -3 applications à un intervalle de 10-15 jours. (COMM09/02/21) ; COMM 08/06/22) (Comm 25/06/2025)
310	Pyriméthanil	40%	SC	pyrma SC	F.12-21	SHARDA CROPCHAM LIMITED tunisie	SHARDA CROPCHAM LIMITED INDE	Tomate :Pourriture grise(Botrytis cinerea) :150 cc/hl -3 applications à un intervalle de 10-15 jours.(COMM09/02/21)
311	Pyriméthanil	400 g/l	SC	PYRUS 400 SC	F.025-22	STEC	UPL	Vigne de table: Pourriture grise (Botrytis cinerea): 2 l/ha -volume de bouillie:1000 l/ha -par pulvérisation foliaire -DAR:21 jours. (COMM 08/06/22)
312	Pyriméthanil + Fludioxonil	336 g/l+ 133 g/l	SC	POMAX SC	F.15-25	SSCC	GLOBACHEM	Vigne :Botrytis cinerea : Pourriture grise(Botrytis spp) :1.9 l/ha Stade d'application: maturation complète des fruits -Max 2 applications /12 mois -intervalle 7 jours DAR 3 jours (Comm 25/06/2025)
303	Pyriofenone	300 g/l	SC	KUSABI SC	F.23-21	AGRIPROTEC	ISK Biosciences Europe N.V/UPL	Vigne: Oïdium(Uncinulanecator):30 cc/hl(0.3 l/ha) -Mode de trait. : foliaire -stade d' application : dès les premiers signes d'infestation. -DAR : 28 jours(COMM09/02/21)
313	Pythiumoligandrum	1*10 ⁶ oospores(10-25% w/w) de polyversum	WP	POLYVERSUM	F.038-17	FERTIPLANT	BIOPREPARATY	Blé (Traitement de semences) : Fusarium spp, caries, Septoriose : 0.75 kg/T de semences (+5 l d'eau) (COMM 18/10/2017); Tomate : Botytiscinerea(Pourriture grise) : 200 g/ha(20 – 25 g/100L d'eau Bouillie100L d'eau/ha) (comm 12/01/2018); Blé : Fusariose :100g/ha(30-40 g/100 l d'eau) pour une bouillie de 300 à 400 L d'eau/ha(Pulvérisation foliaire;Max3 applications;Stades :BBCH13-15;BBCH25-37;BBCH55-65);(COMM18/10/2018); Fraisier : Pourriture grise(Botyis cinerea) :200 g/ha avec bouillie de 800 à 1000 l d'eau;- Pulvérisation foliaire, COMMencer au début de cycle;-Traitement Préventif : 3-4 applications /10-15j d'intervalle; Vigne: Pourriture grise (Botrytis Cinerea): 250g/ha (ou 25 g/100 l d'eau) pour une bouillie de 800 L d'eau/ha;-Pulvérisation foliaire;-nombre

								d'application Préventive : 4 à 7-10 j d'intervalle; (COMM 23/04/2019) Palmier dattier : Dessèchement Foliaire (Alternaria mali etAlternaria arborescens) :80g/hl pour traitement en curatif dès l'apparition des symptômes de des sèchement sur les palmiers(Autorisation provisoire de vente)(AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE)(COMM09/02/21) Semences des féveroles: Anthracnose, Fusariose, Pythium: 250 g/tonne (5-10 l d'eau) Traitement des semences:enrobage ou pulvérisation des semences juste avant semis (COMM08/06/22)
314	Reynoutriasachalinensis(Extrait de la plante Renouée de Sakhaline)	20%	SC	REYSANA SC	F.016-14/24	BIOPROTECTION	Syngenta/ Marrone Bio Innovation(fab)/ ELEPHANT VERT EUROPE SA(dis)	Tomate, Vigne : Botrytis : 150 cc/hl; Vigne, Piment : Oïdium : 150 cc/hl (comm22mai2024)
315	Sedaxane+Fludioxonil	25 g/l+25 g/l	FS	VIBRANCE DUO FS	F.002-20	BIOPROTECTION	SYNGENTA AGRO AG	Semence de blé: Fusariose ,Septoriose, Carie, Charbon: 200 ml/ql+600 à 800 ml d'eau /ql; Semence d'orge: helminthosporiose de l'orge:200 ml/ql+600 à 800 ml d'eau /ql;(COMM13/02/2020)
316	Soufre	80%	WG	Sulpex	F.028-13/23	AGRIMATCO	AgrostullnGmbH/frarimpe x(D)	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha; Vigne : excoriose, acariose: 1 Kg/hl; C. maraîchères: Oïdium : 250 g/hl Acariose bronzé de la tomate: 600 g/hl; Arbo+ Vigne : Oïdium : 400 g/hl; C. ornementales : Oïdium, maladie des taches noires: 400 g/hl(COMM 19 avril 2023)
317	Soufre	80%	WG	COSAMIL-DF	F.26-21	SOCOOPEC	Sulphur Mills Limited	Vigne: Oïdium(unicinulanecator):400g/hl; -Traitement foliaire ;-02 à03 app dès la floraison;(COMM 09/02/21)
318	Soufre	80%	WG	COSAVET-DF	F.010-19	AGRIPROTEC	Sulphur Mills Limited	Vigne: Oïdium:1 kg/hl; -Traitement foliaire ;-02 app a partir du stade feuille étalée jusqu'au Véraison;- L'efficacité de produit s'étale sur 7 jours;(COMM 23/04/2019) Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :300g/hl Volume de bouillie: 1000 l/ha Traitement préventif Nombre d'application:01 Calendrier des applications: début de l'attaque DAR:5 jours (COMM 22/02/2024)

319	Soufre	80%	WG	Agrosoufre	F.163-11/21	AGROSYSTEMES	AgrostullnGmbH	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha Vigne : excoriose, acariose : 1 Kg/hl Cultures maraîchères : Oïdium : 250 g/hl , Acariose bronzé de la tomate : 600 g/hl Arboriculture - Vigne : Oïdium : 400 g/hl Cultures Ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires : 400 g/hl.
320	Soufre	98%	DP	Cabridust	F.107-11/21	AGROSYSTEMES	The national company for agrochemicals(AGROCHE M)	Vigne : Oïdium (stade floraison à la fermeture de la grappe) :15 Kg/ha
321	Soufre	80%	WG	Soufrustulln	F.031-15/25	AMINCO	AgrostullnGmbH	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha Vigne : excoriose, acariose : 1 Kg/hl Cultures maraîchères : Oïdium : 250 g/hl , Acariose bronzé de la tomate : 600 g/hl Arboriculture - Vigne : Oïdium : 400 g/hl Cultures Ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires : 400 g/hl.(comm 25 juin 2025)
322	Soufre	80%	WP	TIOSOL 80	F.004-14/24	ATLAS AGRICOLE	SIPCAM	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha Vigne : excoriose, acariose : 1 Kg/hl Cultures maraîchères : Oïdium : 250 g/hl , Acariose bronzé de la tomate : 600 g/hl Arboriculture - Vigne : Oïdium : 400 g/hl Cultures Ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires : 400 g/hl.
323	Soufre	80%	WP	Mistral	11-212F.	BIOPROTECTION	ESSECO sarl/AAKO	Vigne :Oïdium : 400g/hl; Piment :Oïdium: 250 g/hl
324	Soufre	80%	WG	THIOMAX JET	F.005-20	COTUGRAIN	SYNGENTA	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha Vigne : excoriose, acariose : 1 Kg/hl Cultures maraîchères : Oïdium : 250 g/hl , Acariose bronzé de la tomate : 600 g/hl Arboriculture - Vigne : Oïdium : 400 g/hl Cultures Ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires : 400 g/hl. (COMM13/02/2020)
325	Soufre	98%	DP	AzufreMicronizado	F.025-13/23	EL KHADRA	AFEPASA S.A	Vigne : Oïdium (stade floraison à la fermeture de la grappe) : 15 Kg/ha(COMM 19 avril 2023)
326	Soufre	80%	WG	Azumo	F.026-13/23	EL KHADRA	AFEPASA S.A	Vigne : Oïdium : 400g/hl (COMM 19 avril 2023) Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasicus " :300 g/hl AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE (COMM 22/02/2024)
327	Soufre	80%	WP	KEY Azufre	F.012-16	Ets MEZGHANI	INDUSTRIAL QUIMICA KEY	Vigne :Oïdium : 400 g/hl

328	Soufre	98%	DP	STV (Soufre Trituré Ventilé)	F.027-13/23	ETS MEZGHANNI	Sté CHERIFIENNE d'ENGRAIS	Vigne : Oïdium (stade floraison à la fermeture de la grappe) : 15 Kg/ha(COMM 19 avril 2023)
329	Soufre	80%	WG	soufravit	F.008-16	TASMID	AGROSTULLN/	Piment :Oidium :600 gr/hl(COMM09/02/21)
330	Soufre	80%	WP	Microsol	F.183-11/21	PROMOCHIMIE	SIPCAM QUIMAGRO	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha Vigne : excoriose, acariose : 1 Kg/hl Cultures maraîchères : Oïdium : 250 g/hl , Acariose bronzé de la tomate : 600 g/hl Arboriculture - Vigne : Oïdium : 400 g/hl Cultures Ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires : 400 g/hl. (COMM09/02/21)
331	Soufre	80%	WG	Insuf	F.200-11/21	PROTAGRI	UNITED PHOSPHORUS	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha Vigne : excoriose, acariose : 1 Kg/hl Cultures maraîchères : Oïdium : 250 g/hl , Acariose bronzé de la tomate : 600 g/hl Arboriculture - Vigne : Oïdium : 400 g/hl Cultures Ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires : 400 g/hl.
332	Soufre	80%	WG	KIPRIDE WG	F.024-17	SANABEL Agro	AFEPASA S.A	Vigne : Oïdium : 400g/hl
333	Soufre	80%	WG	MICROCROPS WG	F.008-15/25	SEPCM	AFEPASA S.A	Vigne : Oïdium : 400g/hl)(comm25 juin 2025)
334	Soufre	98%	DP	NOVAZUFRE DP	F.007-15/25	SEPCM	AFEPASA S.A	Vigne : Oïdium (stade floraison à la fermeture de la grappe) : 15 Kg/ha)(comm25 juin 2025)
335	Soufre	80%	WG	MicrothiolSpecial	F.184-11/21	STEC	UPL/CEREXAGRI	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha Vigne : excoriose, acariose : 1 Kg/hl Cultures maraîchères : Oïdium : 250 g/hl , Acariose bronzé de la tomate : 600 g/hl Arboriculture - Vigne : Oïdium : 400 g/hl Cultures Ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires : 400 g/hl.
336	Soufre	80%	WG	Kumulus DF	F.106-11/21	STIMA	BASF	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha Vigne : excoriose, acariose : 1 Kg/hl Cultures maraîchères : Oïdium : 250 g/hl , Acariose bronzé de la tomate : 600 g/hl Arboriculture - Vigne : Oïdium : 400 g/hl Cultures Ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires : 400 g/hl.
337	Soufre	80%	WG	SULFOSTAR DF	F.54-21	AGRIPROTEC	BASF	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha Vigne : excoriose, acariose : 1 Kg/hl Cultures maraîchères : Oïdium : 250 g/hl , Acariose bronzé de la tomate : 600 g/hl Arboriculture - Vigne : Oïdium : 400 g/hl Cultures Ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires : 400 g/hl. (COMM09/02/21)

338	Soufre	700 g/L	SC	Heliosoufre S	F.213-11/21	BIOPROTECTION	Action Pin/AAKO	Vigne : Oïdium : 0,3 L/hl; Piment :Oïdium : 150 cc/hl Palmier dattier :Acariens des dattes (Oligonychusafrasiaticus):300 ml/hl enTraitement curatif (COMM 08/06/22)
339	Soufre	800 g/l	SC	SULFOMAX	F.009-19	EL KHARDA	AFEPASA	Melon :Oïdium:250 cc/hl; -pulvérisation foliaire -1ère app au début de la maladie;-dernière app 3 j avant la récolte NB :6 app avec intervalle de 10 j; DAR:3j (COMM23/04/2019) ; Vigne:Oïdium(Uncinulanecator):250 cc/hl;- pulvérisation foliaire;-1ère app au stade BBCH 15- 18;-dernière app 5 j avant maturation; -NB :8 app avec intervalle de 7 j; DAR:5j(COMM09/02/21)) Palmier dattier : acarien " Oligonychusafrasiticus " :250 cc/Hl (COMM 22/02/2024)
340	Soufre	80%	WDG	Micro-cap	F.007-22	NEGANOR	AGROW ALLIED	Vigne :Oïdium (Uncinulanecator):400 g/hl -volume de bouillie:1000 l/ha Traitement foliaire préventive à curative 06 app au max/saison Stade d'app :BBCH15-BBCH85 Min intervalle entre app :7 jours DAR :3 jours. (COMM 08/06/22)
341	Soufre	80%	WDG	SULFINOVA 80WDG	F.075-22	AGRINOVA	AGROW ALLIED	Vigne :Oïdium (Uncinulanecator):400 g/hl -volume de bouillie:1000 l/ha Traitement foliaire préventive à curative 06 app au max/saison Stade d'app :BBCH15-BBCH85 Min intervalle entre app :7 jours (COMM 27/12/22)

342	Soufre	80%	DP	SOLFOXIDANTE 80 DP	F.03-25	SEPCM	AFEPASA/Espagne	Vigne :oidium (<i>Uncinula necator</i>) :400g/hl Volume de bouillie :400-800 l/ha -02 applications/cycle (Comm 25/06/2025)
343	Soufre	80%	WG	BIOSOUFRE WG	F.04-25	EL KHADRA	CROPSAFE PESTICIDES INDIA PRIVATE LIMITED	Vigne :oidium (<i>Uncinula necator</i>) :400 g/hl Volume de bouillie : 800-1000 l/ha -pulvérisation foliaire -stade végétatif: différents stades -DAR: 03 jours -nbre d'app:6 app/an (Comm 25/06/2025)
344	Soufre	825 g/l	SC	Thiopron SC	F.005-22	BIOPROTECTION	UPL	Vigne: Oidium(<i>Uncinulanecator</i>):250 cc/hl -volume de bouillie:200-1000 l/haMode de trait: pulvérisation foliaire -Nbre max de trai:2-stade phénologiques BBCH 13-81 -min intervalle entre applications:10jours -DAR:3 jours Blé dur: Oidium: 2 l/ha Volume de bouillie:200-600 l -Mode de trait: pulvérisation -BBCHfoliaire -Nbre max de trai:2 -stade phénologiques BBCH 31-59-min intervalle entre applications:14 jours -DAR:3 jours Melon: Oidium: 250 cc/hl Volume de bouillie:500-1000 l Mode de trait: pulvérisation foliaire--Nbre max de trai:2-stade phénologiques BBCH 13-87-min intervalle entre applications:7 jours -DAR:3 jours Pommier: Tavelure(<i>Venturia inaequalis</i>):250 cc/hl -volume de bouillie:500-1200 l-Mode de trait: pulvérisation foliaire -Nbre max de trai:2 -stade phénologiques BBCH 57-85 -min intervalle entre applications:7 jours -DAR:3 jours (COMM 08/06/22)
345	Soufre	55.16%	SC	SUPER SULPHUR 55 SC	I.19-25	FERTIPLANT	KR Lifesciences/inde	Palmiers dattier Acariens « <i>Oligonychus afrasiaticus</i> » : 300 ml/100 l d'eau 2-3 traitements

								DAR 50 jours (Comm 25/06/2025)
346	Spiroxamine	300 g/l	CS	PROSPER 300 CS	F.27-21	Atlas agricole	BAYER CROPSCIENCE	Vigne: Oidium(Uncinulanecator):0.8 L/ha -application foliaire -1000 l/ha -stade d'application :BBCH53-BBCH85(apparition des inflorescence –veraison) -DAR:14 jours (COMM09/02/21)
347	Spiroxamine	500 g/l	EC	XAMIN –UP EC	F.10-25	COTUGRAIN	UPL	Vigne :oidium (Uncinula necator) : 0.6 l/ha -nombre d'application:2 Intervalle min:10-14 jours -usage préventif recommandé à tous les stades de la lutte anti-oidium. deux époques de traitements préférables: avant fleur et après nouaison. Très bonne sélectivité sur tous les cépages de raisins de cuve. Sur raisin de table , ne pas traiter après le stade fin floraison de la vigne (Comm 25/06/2025)
349	Spiroxamine	500 g/L	EC	Prosper 500 EC	F.108-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Vigne : Oïdium : 50 cc/hl
348	Spiroxamine +difeconazole	400 g/l+50 g/l	EC	SPIROX D EC	F.24-21	BIOPROTECTION	arystalifescience/UPL	Vigne: Oidium(Uncinulanecator):0.5 L/ha -Pulvérisation foliaire en préventive et curative -DAR : 10-14 jours(COMM09/02/21)
350	Sulfate de cuivre tribasique	345 g/l (soit 190 g/l cuivre metal)	SC	TRIBASE -FLOW SC	F.71-21	Atlas Agricole	NUFARM	Tomate : Mildiou : 300 cc/hl Vigne : Mildiou 400 cc/ha(COMM09/02/21) OLIVIER : Œil de paon (spilocaeaoleagina) :200 ml/hl Max 3 app/cycle DAR:20 jours (COMM 28/12/23)
351	Sulfate de cuivre tribasique	345 g/l (soit 190 g/l cuivre metal)	SC	Cuproxat	018-14F.	EL MOUSSEM AGRICOLE	NUFARM	Tomate : Mildiou : 300 cc/hl Vigne : Mildiou 400 cc/ha (COMM 18/10/2017) Tomate: Alternariose(Alternariasolani):300 cc/hl (COMM 08/06/22)
352	Sulfate de cuivre tribasique	40%	WG	Novicure	F.033-17	PROTAGRI	UPL	Vigne : Mildiou : 150 g/hl; (COMM 18/10/2017)
353	sulfate de cuivre tribasique	553.5 g/kg (Soit 300 g/kg cuivre métal)	WG	MEXIRAM TRI HI BIO WG	F.09-23	EL MOUSSEM AGRICOLE	ALBAUGH EUROPE SARL	TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (Phytophthora infestans) : 200 g/hl(2kg/ha) -application foliaire nbre max d'app:4/cycle -débuter les applications avant le developpement de la maladie et continuer à un intervalle de 8 jours

								-ne pas faire plus de 2 applications séquentielles du fongicide avant de passer à un fongicide ayant un mode d'action différent -DAR:10 jours -LMR:5 mg/kg (COMM 28/12/2023)
354	Sulfate de cuivre tribasique + Cymoxanil	190 g/l +35 g/l	SC	Moltovin	F.037-17	BIOPROTECTION	NUFARM	Vigne : Mildiou : 3.5 l/ha;(COMM 18/10/2017)
355	Sulfate de cuivre tribasique + Zoxamide	266.6 g/l +40 g/l	SC	Amaline Flow	F.027-17	EL MOUSSEM AGRICOLE	NUFARM	Vigne : Mildiou : 2.8 l/ha;(COMM 18/10/2017)
356	Sulfate de cuivre tribasique + Zoxamide	266.6 g/l +40 g/l	SC	ventaro	F.75-21	STEC	NUFARM	Vigne : Mildiou : 2.8 l/ha;(COMM 09/02/21)
358	Sulfate tetracuvrique tricalcique	20% CU	WG	Bordocure WG	F.024-22	FERTITECH	ALINTRA	Vigne :Mildiou(Plasmopara viticola):1.5 kg/hl -volume de bouillie:500-1000 l/ha - Traitement foliaire -stade de traitement :BBCH15-BBCH91 Nbre max de traitement 6 app Intervalle entre les traitements :7 jours DAR :15 jours. (COMM 08/06/22)
359	sulfatetetracuvrique tricalcique)+ cymoxanil	88.24%p/p(25.5 % cu métal min +3.1%p/p	WP	CUPERTINE SUPER WP	F.10-23	FERTITECH	ALINTRA ESPAGNE	TOMATE SOUS SERRE : Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>) :400 g/hl Volume de bouillie 1200 l/ha -pulvérisation foliaire -max 6 applications au min,7 jours d'intervalle -stades phénologiques BBCH:15-89 -DAR:10 j(champ) DAR:3 j(serre) (COMM 28/12/2023)
357	Sulphate de cuivre tribasique	360g/l	SC	CU MAX	F.013-17	RAYEN PHYTAGRI	DIACHEM S.P.A	Tomate :Mildiou: 200cc/hl;(COMM 20/06/2017)
360	Tebuconazole	250 g/L	EC	SONG EC	F.032-17	ATLAS AGRICOLE	SIPCAM INAGRA	Blé : Septoriose : 1 l/ha;(COMM 18/10/2017)
361	Tebuconazole	250 g/L	SC	KEYZOL SC	F.014-20	EL KHADRA	AVGUST CROP CORPORATION	Vigne : Oïdium : 40 cc/hl soit 400 cc/ha;(COMM13/02/2020)
362	Tebuconazole	60 g/L	FS	Mycoseeds FS 60	F.009-14/24	EL KHADRA	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Blé dur et tendre : Charbon, carie : 50ml PC+500 ml eau/Qt;Orge: Helminthosporiose : 50 ml + 500 cc d'eau/Qt; Semences de blé : Carie, Charbon : 50 cc du Produit + 0,5 L d'eau/Qt; Semence de blé : Fusariose:50 cc P.C +500cc d'eau par quintal; -Préparation bouillie : faire mélanger 50cc du PC avec 500 cc d'eau;(Application : Faire mélanger ce volume de bouillie de céréale manuellement ou

								moyennement une machine de traitement de semences;01 trait/campagne;(COMM18/10/2018)
363	Tebuconazole	60 g/L	FS	TEBUSH 6 FS	F.022-17	AGRINOVA	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Blé dur et tendre : Charbon, carie : 50ml +500 ml eau/QL; Orge: Helminthosporiose : 50 ml + 500 ml d'eau/QL; Semences de blé : Carie, Charbon : 50 ml + 500 ml d'eau/QL; (COMM20/06/2017) (COMM 08/06/22)
364	Tebuconazole	250 g/L	SC	COLOSSAL Sous réserve de changement de DC	F.045-17	HALAB TUNISIE	AVGUST CROP CORPORATION	Vigne : Oïdium : 40 cc/hl soit 400 cc/ha;(COMM 18/10/2017)
365	Tebuconazole	60 g/L	FS	Timer FS 060	F.109-11/21	STEC	BAYER CROPS SCIENCE	Blé dur et tendre : Charbon, carie : 50ml PC+500 ml eau/QL; Orge : Helminthosporiose : 50 ml + 500 cc d'eau/QL; Semences de blé : Carie, Charbon : 50 cc du Produit + 0,5 L d'eau/QL; Semence de blé : Fusariose:50 cc P.C +500cc d'eau par quintal; -Préparation bouillie : faire mélanger 50cc du PC avec 500 cc d'eau;(Application : Faire mélanger ce volume de bouillie de céréale manuellement ou moyennement une machine de traitement de semences;01 trait/campagne;(COMM18/10/2018)
366	Tébuconazole	430 g/l	SC	SPEEDY SC	F.065-22	EL KHADRA	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE INDUSTRY/Cropidea	Blé : Rouille : 0.5 l/ha; (Pulvérisation foliaire; Stade d'app Espagne fin floraison); (COMM 18/10/2018) ; COMM08/06/22)
367	Tébuconazole	430 g/l	SC	METROSTAR SC	F.009-18	AGRIPLUS	NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE INDUSTRY	Blé : Rouille : 0.5 l/ha; (Pulvérisation foliaire; Stade d'app Espagne fin floraison);(COMM 18/10/2018)
368	Tébuconazole	250 g/L	EW	Corail	F.113-11/21	PROMOCHIMIE	BAYER CROPS SCIENCE	Vigne : Oïdium : 40 cc/hl soit 400 cc/ha
369	Tébuconazole	430 g/l	SC	Camaro430SC	F.026-16	RAYEN PHYTAGRI	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Blé dur : Rouilles : 0.5 L/ha
370	Tébuconazole	430 g/l	SC	TEBUNOVA SC	F.66-21	AGRINOVA	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Blé dur : Rouilles : 0.5 L/ha(COMM09/02/21)
371	Tébuconazole	430 g/l	SC	Matiz	F.004-13/23	SANABEL AGRO	ROTAM AGROCHEMICAL(rival)	Blé : Rouille brune : 0.5 L/ha; Vigne : Oïdium :25 cc/hl (comm17/05/2016); Blé dur : Septoriose : 0.6 l/ha (comm27/09/2016) (COMM 19 avril 2023)

372	Tébuconazole	250 g/L	EW	AZUROS	F.018-19	SLDA	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage; Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage; Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage; Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha ; Blé : Rouille brune : 1 l/ha;(COMM 23/04/2019)
373	Tébuconazole	250 g/L	EW	Tebucur	F.110-11/21	AGROSYSTEMES	GLOBACHEM	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage; Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage; Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage; Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha ; Blé : Rouille brune : 1 l/ha;
374	Tébuconazole	250 g/L	EW	Teson	F.036-15/25	AMINCO	GLOBACHEM	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage; Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage; Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage; Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha ; Blé : Rouille brune : 1 l/ha;(comm 25 juin 2025)
375	Tébuconazole	250 g/L	EW	Konan EW	F.014-13/23	ETS MEZGHANI	INDUSTRIAL QUIMICA KEY	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage; Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage; Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage; Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha ; Blé : Rouille brune : 1 l/ha (COMM18/10/2018) (COMM 19 avril 2023)
376	Tébuconazole	250 g/L	EW	Horizon 250 EW	F.111-11/21	PROMOCHIMIE	BAYER CROPSCIENCE	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage; Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage; Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage; Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha ; Blé : Rouille brune : 1 l/ha; Légumineuses (févrole) : Rouilles : dose 0,5 L/ha Avoine : Rouilles : 1 L/ha
377	Tébuconazole	250 g/L	EW	TEBUZOL 25 EW	F.043-21	Agriprotec	UPL LIMITED	Orge :Helminthosporiose:1 l/ha Nbre des traitement : Appliquer dès la première apparition de la maladie. Une nouvelle app après 3 à 4 semaines si la pression de la maladie reste élevée. -Durée de la protection:3 à 4 semaines -DAR :30 jours(COMM09/02/21)
378	Tébuconazole	250 g/L	EW	SUPREME 25 EW	F.06-24	COTUGRAIN Impex	UPL LIMITED	Orge :Helminthosporiose:1 l/ha Nbre des traitement : Appliquer dès la première apparition de la maladie. Une nouvelle app après 3 à 4 semaines si la pression de la maladie reste élevée. -Durée de la protection:3 à 4 semaines -DAR :30 jours(COMM22/05/24)
379	Tébuconazole	25%	EW	SILVZOLE EW	F.07-25	Cotugrain Impex	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD CHINE	Vigne :oidium (Uncinula necator) :40 cc/hl(400 ml/ha) Volume de bouillie : 800-1000 l/ha

								(Comm 25/06/2025)
382	Tébuconazole +Trifloxystrobine	200 g/L+ 100 g/L	SC	Nativo 300 SC	F.115-11/21	STEC	BAYER CROPSCIENCE	Céréales : Septoriose, Rouilles à la dose 01 L/ha (au stade montaison au dernier tallage de la culture)
383	Tébuconazole +Trifloxystrobine	200 g/L+ 100 g/L	SC	GREEN STAR	F.18-25	AGRIPROTEC	BAYER CROPSCIENCE	Céréales : Septoriose, Rouilles à la dose 01 L/ha (au stade montaison au dernier tallage de la culture) (Comm 25/06/25)
380	Tebuconazole+Prochloraz	200 g/l + 300 g/l	EC	Mystic Pro	F.128-11/21	AGRIPROTEC	NUFARM SAS	Blé : septoriose, rouille brune : 1.25 l/ha; Orge : helminthosporiose : 1.25 l/ha
381	Tebuconazole+Prochloraz	200 g/l + 300 g/l	EC	Winner	F.206-11/21	BIOPROTECTION	NUFARM SAS	Blé : septoriose, rouille brune : 1.25 l/ha Orge : helminthosporiose : 1.25 l/ha
384	Thiabendazole	50 % SC	SC	BENAZOLE	F.059-22	EXCEL AGRI	SHARDA CROPCEM LIMITED INDE	Pommier : Pourriture (Penicillium expansum) :210 ml/100 l -appliquer le 1er traitement après 24 h de la récolte-2ème traitement après stockage au froid-tremper dans une solution 30 secondes ou pulvériser /inonder pendant 3 min max. (COMM09/02/21), COMM08/06/22)
385	Thiabendazole	50 % SC	SC	TENAZOLE	F.31-21	SHARDA CROPCEM LIMITED Tunisie	SHARDA CROPCEM LIMITED INDE	Pommier : Pourriture(Penicillium expansum) :210 ml/100 l -appliquer le 1er traitement après 24 h de la récolte -2ème traitement après stockage au froid -tremper dans une solution 30 secondes ou pulvériser /inonder pendant 3 min max(COMM09/02/21)
389	Trichoderma Asperellum ICC012: +Trichoderma Gamsii ICC080:	999 g/kg conidies (5 x10 ⁹ CFU/g)+ 999 g/ conidies (5 x10 ⁹ CFU/g)	WP	REMEDIER WP	F.007-19	STIMA	ISAGRO SPA/GOWAN	Tomate :Fonte de semis (Pythium spp):2 kg/ha;- volume de bouillie:800l/ha;-par pulvérisation;- stade d'app :avant repiquage et au moment de repiquage.-intervalle d'app min :5 jours;-nbre d'app : 2; (COMM 23/04/2019) Vigne :Esca disease (phaeomoniellachlamydospora,Phaeoacremonium nflatipes) (Autorisation provisoire de vente)(Nécroses internes du bois) :2.5 kg/ha(1000 l/ha)-Après la taille (stade BBCH00) et après la fin du bourgeonnement (stade BBCH 10)-Par pulvérisation-nbre d'application:1 à 2
391	Trichoderma Asperellum ICC012: +Trichoderma Gamsii ICC080:	999 g/kg conidies (5 x10 ⁹ CFU/g)+ 999 g/ conidies (5 x10 ⁹ CFU/g)	WP	BLINDAR	F.17-25	AGRIPROTEC	ISAGRO SPA/GOWAN	Tomate :Fonte de semis (Pythium spp):2 kg/ha;- volume de bouillie:800l/ha;-par pulvérisation;- stade d'app :avant repiquage et au moment de repiquage.-intervalle d'app min :5 jours;-nbre d'app : 2; (COMM 23/04/2019) Vigne :Esca disease

								(phaeomoniellachlamydospora,Phaeoacremonium nflatipes) (Autorisation provisoire de vente)(Nécroses internes du bois) :2.5 kg/ha(1000 l/ha)-Après la taille (stade BBCH00) et après la fin du bourgeonnement (stade BBCH 10)-Par pulvérisation-nbre d'application:1 à 2 (Comm 25/06/2025)
393	Trichoderma asperellum strain Kd (DSM32800) :	2x10 ⁹ spores per gram (3.50 W/W %)	WP	T-protec	F.05-24	ALOHA	Plant Health Products (phy)/Sud d'afrique/Andermatt PHP(Pty) Ltd/ANDERMATT BIOCONTROL GROUP AG	Agrumes : Phytophthora Avec l'eau d'irrigation 0.25 g/l d'eau (min 250 g/ha) Application au sol avec l'eau d'irrigation ou comme pulvérisation sur le sol avec plein d'eau 2 ^{eme} applications aptes 07 j 3 ^{eme} application 28 j Max 05 applications par saison DAR:0 j (COMM 22/05/24)
392	Trichoderma asperellum strain)	T34 /120g/kg (12.0%w/w)	WP	T34 BIOCONTROL	F.19-21	STIMA	Biocontrol Technologies, S. L/	Concombre (Sous serre et plein champ) :Fusariose (Fusarium spp) Substrat(pépinière):10g/m ³ =0.01g/l culture: 0.5 kg/ha en cours de culture -nbre d'application : 4 -1ere application:3 jours après repiquage -les 03 applications/15 jours(COMM09/02/21)
394	Trichoderma atroviride 77B	2x10 ⁹ cfu/g	WP	T-77 WP	F.29-21	Aloha agriculture	Plant Health Products (phy)/Sud d'afrique Plant Health Products (phy)	Fraisier :Pourriture grise (Botrytis cinerea) :300 g/ha -pulvérisation foliaire -nbre max :3/cycle -intervalle de 10 jours(COMM09/02/21)
386	Trifloxystrobin	50%	WG	Zato 50 WG	F.123-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Cocombre : Oïdium : 25 g/hl; Vigne : Oïdium : 15 g/hl; Pommier : Tavelure : 10 g/hl
387	Trifloxystrobin	50%	WG	Flint	F.124-11/21	PROMOCHIMIE	BAYER CROPSCIENCE	Piment :Oïdium : 25 g/hl Pommier :Oïdium : 25 g/hl; Concombre :Oïdium : 25 g/hl; Vigne :Oïdium : 15 g/hl; Pommier : Tavelure : 10 g/hl
388	Trifloxystrobine	50%	WG	CIVIC WG	F.01-25	PROTAGRI	NANJING AGROCHEMICAL	Vigne :oidium (Uncinula necator) :15 g/hl -traitement des parties aériennes-intervalle de traitement 14-21 jours DAR 35 jours (COMM 25/06/25)
395	Zirame	76%	WG	Thionicautodispersible	F.136-11/21	AGROSYSTEMES	TAMINCO/EASTMAN	Poirier : Tavelure : 200 g/hl soit 2 kg/ha Pêcher :Cloque (Taphrina deformans):

								200g/hl 02 applications : -1 ^{ère} application pendant la période du débourrement -2 ^{ème} 15 jours plus tard (COMM 28/12/2023)
396	Zoxamide + Dimethomorphe	180 g/l+180 g/l	SC	Presidium SC	F.053-22	STEC	Gowan	Pomme de terre: Mildiou: 1 l/ha volume de bouillie:600-1000 l/ha -pulvérisation foliaire-DAR:7 jours -Traitement préventif ou curatif -02 app par cycle. (COMM 08/06/22) Vigne: Mildiou:1 l/ha Volume de bouillie:600-1000 l/ha -pulvérisation foliaire-DAR:28 jours -Traitement préventif ou curatif -02 applications par cycle -intervalle minimum entre les applications 10 jours. (com 27/12/22)

III. HERBICIDES

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
01	2,4- D + MCPA	345 g/l +345 g/l	SL	Weedone Plus	H.001-13/23	BIOPROTECTION	NUFARM	Blés : Dicotylédones : 1,5 L/ha(COMM 19 avril 2023)
02	2,4- D + MCPA	345 g/l +345 g/l	SL	DAMEX FORTE SUPER	H.21-21	SOCOOPEC	NUFARM	Blés : Dicotylédones : 1,5 L/ha(COMM09/02/21)
03	2,4 –D EHE	904,5 g/L	EC	certrol DS EC	H.18-21	agriprotec	A H MARKS / NUFARM	Blé, orge, avoine : Dicotylédones : 0,8 L/ha(COMM09/02/21)
04	2,4 D Diméthyle Ammonium	500 g/l	SL	HERBOXONE SL	H.20-25	ATLAS INDUSTRIE	NUFARM	Blé dur : Mauvaises herbes dicotylédones : 1 l/ha Volume de bouillie:300 l/ha Traitement en post levée à partir du stade 3 feuilles Le produit a montré une bonne efficacité sur : Chardon, fumeterre, melilot, malva spp, gaillet, liseron, renouee, mourron, souci des champs , silène de Tunisie ,capselle bou rse de pasteur Une efficacité moyenne sur : Amaranthe, ravenelle, sinapis, stellaire, papaver Matricaire, chrysanthme (Comm16 juillet 2025)
05	2,4 D –Ester butylglycol	600 g/L	EC	Weedone	H.060-11/21	BIOPROTECTION	NUFARM	Céréales: Dicotylédones: 1 L/ha

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
06	2,4 D –Ester butylglycol	600 g/L	EC	Desormone lourd	H.078-11/21	SEPCM	NUFARM	Céréales: Dicotylédones: 1 L/ha
07	2,4-D 2-Ethylhexyl Ester + Florasulam	452.42 g/l + 6.25 g/l	SE	TEAMSPRAY PLUS SE	H.19-25	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD CHINE	Blé dur : Adventices dicotylédones :0,6 L/ha Volume de bouillie:300 -500 l/ha 01 application en post levée BBCH 11-32 Le produit a montré une bonne efficacité % sur : Chardon, fumeterre, melilot, malva spp, gaillet, liseron, renouee,mourron, souci des champs ,silène de Tunisie ,capselle bourse de pasteur ,Amaranthe, ravenelle, sinapis, stellaire, papaver ,Matricaire, chrysanthme (Comm 16/07/2025)
08	2,4-D Acide +Florasulam	300 g/L +6,25 g/L	SE	Nikos 306 SE	H.011-13/23	ATLAS AGRICOLE	DOW AGROSCIENCES/ corteva	Blés : Dicotylédones : 0,6 L/ha(COMM 19 avril 2023)
09	2,4-D Sel d'amine	720 g/L	SL	Dicopur 720 SL	H.008-13/23	AGRIPROTEC	NUFARM	Céréales : Dicotylédones : 0,6 L/ha(COMM 19 avril 2023)
10	2,4-D Sel d'amine	720 g/L	SL	Sanaphen D 720 SL	H.013-13/23	ATLAS AGRICOLE	DOW AGROSCIENCES	Céréales : Dicotylédones : 0,6 L/ha(COMM 19 avril 2023)
11	2,4-D Sel d'amine	720g/l	SL	Topol	H.009-15/25	EL KHADRA	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Blé dur : Mauvaises herbes dicotylédones annuelles : 0.8 l/ha Comm 25 juin2025
12	2,4-D Sel d'amine	720g/l	SL	SHARMINA 720 SL	H.005-17	AGRINOVA	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Blé dur : Mauvaises herbes dicotylédones annuelles : 0.8 l /ha;(COMM 20/06/2017) (COMM 08/06/22)
13	2,4-D Sel d'amine	720g/l	SL	Stopweeds	H.011-15/25	SANABEL AGRO	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Blé dur : Mauvaises herbes dicotylédones annuelles(en post levée) : 0.8 l /ha Comm 25 juin2025
14	2,4-D Sel de Dimethylamine	860g/l	SL	Amanora	H.014-17	AGRIMATCO	UPL	Blé dur : Mauvaises herbes dicotylédones annuelles (en post levée) : 0.8 l /ha;(COMM 20/06/2017)
15	2,4-D Sel de Dimethylamine	860g/l	SL	DIAMEX SL	H.037-22	COTUGRAIN	UPL	Blé dur : Mauvaises herbes dicotylédones annuelles (en post levée) : 0.8 l /ha;(COMM 27/12/22)
16	2,4-D Sel de Dimethylamine	720g/l	SL	BLITZ 720 SL	H.022-22	EL KHADRA	JIANGSU FENGSHAN GROUP CO,LTD (FAB)/NANJING FENGSHAN CHEMICAL(FR)	Blé dur : Mauvaises herbes dicotylédones annuelles (en post levée) : 0.8 l /ha (COMM 20/06/2017) (COMM08/06/22)
17	2,4-D Sel de Dimethylamine	720g/l	SL	BOZAR	H.012-17	AGRIPLUS	JIANGSU FENGSHAN GROUP CO,LTD	Blé dur : Mauvaises herbes dicotylédones annuelles (en post levée) : 0.8 l /ha (COMM 20/06/2017)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
							(FAB)/NANJING FENGSHAN CHEMICAL(F)	
18	2,4-DB	400 g/L	SC	BUTTRESS SC	H.21-25	AGRIPROTEC	NUFARM	Blé dur : Dicotylédones: 4,5 L/ha Volume de bouillie:200-400 l Mode de traitement:foliaire Période de traitement (Préventif ou Curatif) : Curatif Nombre de traitements: 01 Calendrier des applications:BBCH 13 - 30 DAR :14 jours Le produit a montré une bonne efficacité sur : Chardon, fumeterre, melilot,malva spp, gaillet, liseron, renouee, mourron,souci des champs ,silène de Tunisie ,capselle bourse de pasteur Une efficacité moyenne sur : Amaranthe, ravenelle, sinapis, stellaire, papaver Matricaire, chrysanthme (Comm 16/07/2025)
19	2.4 D-ethylhexyl ester (2-EHE)	600 g/l	EC	DESORMONE PRO EC	H.07-25	SEPCM	NUFARM	Blé dur : Adventices Dicotylédones : 0.8 L/ha 300 l/ha Traiter entre fin tallage jusqu'au stade 2 nœuds -stade adventices : pulvériser lorsque les principales adventices sont sorties et en état de végétation active Le produit a montré une bonne efficacité sur : Chardon, fumeterre, melilot, malva spp, gaillet, liseron, renouee, mourron, souci des champs , silène de Tunisie , capselle bourse de pasteur, Amaranthe, ravenelle, sinapis,stellaire, papaver, Matricaire, chrysanthme (Comm 16/07/2025)
20	2.4-D +Glyphosate	160 g/l+240 g/l	SL	KYLEO	H.011-22	EL MOUSSEM AGRICOLE	NUFARM	Agrumes :Mauvaises herbes annuelles:3 l/ha (COMM 08/06/22)
21	2.4-D +Glyphosate	160 g/l+240 g/l	SL	NUFOSATESL	H.040-22	SANABEL AGRO	NUFARM	Agrumes :Mauvaises herbes annuelles:3 l/ha (com 27/12/22)(COMM28 dec 2023)
22	2.4-D DMA	720 g/L	SL	CLEANSPRAY SL	H.09-25	SOLAGRI	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD CHINE	Blé dur: Anti-dicotylédones :0.8l/ha Stade d'application: BBCH 11-32 Volume de Bouillie: 100-400/ha Nombre d'application:1 Le produit a montré une bonne efficacité sur : Chardon, fumeterre, melilot, malva spp, gaillet, liseron, renouee, mourron, souci des champs ,silène de

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								Tunisie ,capselle bourse de pasteur, Amaranthe, ravenelle, sinapis,stellaire, papaver, Matricaire, chrysanthme (Comm 16/07/2025)
23	2.4-D-ethylhexyl + Florasulam	453g/l+6g/l	SE	BOOSTER SE	H.028-22	FERTITECH	TOPAGRO BIOSCIENCE	Blé tendre :Dicotylédones annuelles:0.6L/ha -Application en post levée des adventices -Bouillie: 300L/ha (com 27/12/22)
24	Aclonifen	600 g/l	SC	Challenge 600SC	H.001-14/24	EL MOUSSEM AGRICOLE	Bayer AG	Féveroles : Dicotylédones: 3.5 l/ha en Pré-émergence;(COMM 18/10/2018); Pois chiche : Adventices dicotylédones:3 l/ha.-Action : par contact de post-semis pré-levée. (COMM13/02/2020) Fenugrec :Adeventices dicotylédones :3 l/ha (COMM09/02/21)(comm22/052024)
25	Aclonifen	60%	SC	ACTION 60 SC	H.026-22	SHARDA CROPCHAM LIMITED TUNISIA	SHARDA CROPCHAM LIMITED INDE	Pois chiche : Adventices Dicotylédones annuelles et graminées annuelles(post semis prélevée):3 l/ha -stade d'application: 1 application /an en post semis prélevée actif jusqu'au stade BBCH 8(com 27/12/22)
26	Aclonifen	60%	SC	COSTA SC	H.02-23	SANABEL AGRO	SHARDA CROPCHAM LIMITED INDE	Pois chiche : Adventices Dicotylédones annuelles et graminées annuelles(post semis prélevée):3 l/ha -stade d'application: 1 application /an en post semis prélevée actif jusqu'au stade BBCH 8(com 27/12/22)COMM028 dec2023
27	Aclonifen +Diflufenican +Flufenacet	450 g/l + 30 g/l + 90 g/l	SC	MATENO STAR 570 SC	H.17-25	PROMOCHIMIE	BAYER CROPSCHIENCE	Blé dur : Adventices graminées : 1.25 l/ha -Application pré-levée jusqu'a post levee précoce -Volume de bouillie:300-500 l/ha -Nbre d'application:1 fois/cycle Le produit a montré une bonne efficacité sur : Brome, Phalaris, folle avoine, orge Une faible efficacité sur :Ray grass (Comm 16/07/2025)
28	Amidosulfuron + Iodosulfuron +MefempyrDiethyl	100 g/l + 25 g/l + 250g/l	OD	Sekator OD	H.002-17	AGRONOMIC Land	BAYER CROPSCHENCES	Blé : mauvaises herbes Dicotylédones annuelles : 0.15l/ha; (COMM 20/06./2017)
29	Aminopyralydes + Florasulam	350 g/Kg +150 g/Kg	WG	Lancelot NEO 450 WG	H.001-11/21	SEPCM	DOW AGROSCIENCES	Blé, triticales, avoine : Dicotylédones : 33 g/ha (COMM09/02/21)
30	Aminopyralydes + Florasulam +2.4 D EHE	10g/l +5g/l +180g/l	SE	Nikos forte	H.010-15/25	ATLAS AGRICOLE	DOW AGROSCIENCES/ CORTEVA	Blé dur : Mauvaises herbes dicotylédones annuelles(appliqué en post –levée):0.7l/ha (COMM 27/09/2016)(comm 25 juin 2025)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
31	Arylex active(halauxifen-methyl) + pyroxsulam +cloquintocet acide	66.67% g/kg en équivalent acide+250 g/kg+354 g/kg	WG	TARZEK + UPTAKE SL (Ecosurf EH-9 Surfactant 73 %(p/p))	H.003-20	COTUGRAIN	Dow Agrosiences	Blé: Mauvaises herbes graminées et dicotylédones:90 g/ha +0.75 l/ha de l'adjuvant UPTAKE en application foliaire;-1 application en association avec l'adjuvant UPTAKE;-appliquer TARZEK du début tallage à fin tallage des céréales.-le stade d'application :dés le stade 3 feuilles sur graminées et entre 2 et 8 feuilles sur dicotylédones.-Traiter en conditions poussantes et éviter les températures basses proches du gel ainsi que les conditions de sécheresse.(COMM13/02/2020) (COMM 28/12/2023)
32	Arylex TM + Forasulam + Cloquintocet acide +SURFER(Adjuvant)	100g/kg+100g/kg+70.8 g/kg	WG	CLASSICO WG	H.10-21	SEPCM	Dow Agrosiences/COR TEVA	Blé dur: Mauvaises herbes dicotylédones:50 g/ha+75 cc/ha de l'adjuvant surfer(300 l/ha) -pulvérisation foliaire aux stades juvéniles des plantes -1 application -DAR:60 jours(COMM09/02/21)
33	Arylex TM + Forasulam + Cloquintocet acide +SURFER(Adjuvant)	100g/kg+100g/kg+70.8 g/kg	WG	QUELEX	H.05-25	COTUGRAIN Impex	Dow Agrosiences/COR TEVA	Blé dur: Mauvaises herbes dicotylédones:50 g/ha+75 cc/ha de l'adjuvant surfer(300 l/ha) -pulvérisation foliaire aux stades juvéniles des plantes -1 application -DAR:60 jours(COMM 25/06/25)
34	Bentazone	480g/l	SL	BENTA SL	H.019-22	EL KHADRA	NANJING FENGSHAN CHEMICAL GROUP CO,LTD/NANGIN G FENGSHAN	Petit pois: Dicotylédones annuelles:1.25 l/ha ;En post levée (stade de 2 feuilles de la culture);DAR:35-40 jours (COMM13/02/2020) ; COMM08/06/22)
35	Bentazone	480g/l	SL	BASASTAR SL	H.010-20	AGRIPLUS	NANJING FENGSHAN CHEMICAL GROUP CO,LTD	Petit pois: Dicotylédones annuelles:1.25 l/ha ;En post levée (stade de 2 feuilles de la culture);DAR:35-40 jours(COMM13/02/2020)
36	Bentazone	480g/l	SL	BENTAKEY SL	H.007-20	ETS MEZGHANI	SHANDONG BIONNONG TECHNOLOGY CO.LTD/I.Q.Key	Blé: Dicotylédones:4l/ha;Par pulvérisation (COMM13/02/2020)
37	Bentazone	480 g/L	SL	Sharbenta	H.004-13/23	SANABEL AGRO	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Céréales : Dicotylédones:4 L/ha(COMM 19 avril 2023)
38	Bentazone	480 g/L	SL	TROY 480 SL	H.007-18	AGRIPROTEC	UPL LIMITED	Féveroles : Dicotylédones: 1.25 l/ha en Post levée; Trait foliaire des légumineuses au stade de 8 à 10 cm de la culture et à 1 application). Avec faible efficacité sur "Centaurée"; (COMM 18/10/2018); Fenugrec: Dicotylédones:1.25 l/ha;- Une application stade 2-3 feuilles des légumineuses

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								(COMM13/02/2020)
39	Bentazone	480 g/L	SL	Basagran	H.003-11/21	STIMA	BASF	Céréales : Dicotylédones : 4 L/ha Fénugrec, févrole, petit pois : Dicotylédones : 1,25 l/ha en post levée des légumineuses (stade de 8 à 10 cm de la culture)
40	Bentazone	480 g/l	SL	BENTAPROTEKT SL	H.007-22	LIEN AGRICOLE	ANHUI ZHONGSHAN CHEMICAL(fabriqué)/chine(protekti ngphytosanitary/Es pagne(dist)	Blé :Adventices Dicotylédones: 4 l/ha volume de bouillie: 300 l/ha -en post levée stade 2 à 3 feuilles (COMM 08/06/22)
41	Bentazone	480 g/L	SL	fighter	H.16-21	cotugrain	BASF	Céréales : Dicotylédones : 4 L/ha Fénugrec, févrole, petit pois : Dicotylédones : 1,25 l/ha en post levée des légumineuses (stade de 8 à 10 cm de la culture)(COMM09/02/2021)
42	Bentazone	48%	EC	RAINZONE EC	H.08-25	NEGANOR FFT	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD CHINE	Blé dur :Anti-dicotylédones :4L/ha Stade d'application: BBCH12-31 Volume de Bouillie: 200-300/ha Nombre d'application:1 Le produit a montré une bonne efficacité sur : Chardon, fumeterre, melilot,malva spp,gaillet,liseron, renouee, mourron, souci des champs ,silene de tunisie ,capselle bourse de pasteur Et une efficacité moyenne sur : Amaranthe, ravenelle, sinapis, stellaire, papaver Matricaire, chrysanthme(Comm 16/07/2025)
43	Bentazone	480 g/l	SL	BENHUR SL	H.27-25	PROTAGRI	NANJING AGROCHEMICAL	Fève : Dicotylédone : 2700 ml/ha -Traitement dicotylédones en post-levée. stade 2-3 feuilles de la culture -Stade 2-4 feuilles de mauvaises herbes DAR:35-40 jours Le produit a montré une bonne efficacité de sur : Chardon, fumeterre, melilot, malva spp,gaillet, liseron, renouee, mourron, souci des champs ,silène de tunisie ,capselle bourse de pasteur Une efficacité moyenne sur : Amaranthe, ravenelle, sinapis, stellaire. (Comm 16/07/2025)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
44	Bentazone +Imazamox	480 g/l+22.4 g/l	SL	CORUM SL	H.05-21	AGRIPROTEC	BASF	Féveroles: Adventices dicotylédones annuelles :1.25 L+1.25 de ZILLION(adjuvant)(200-300 l) -Traitement foliaire en postlevée (BBCH 12-25) -nombre d'application:1 DAR:35 jours(COMM09/02/21)
45	Carfentrazone-ethyl	400 g/kg	WG	AFFINITY WG	H.13-25	SSCC	FMC	Blé dur: Dicotylédone :50 g/ha Volume de Bouillie :200-400 l/ha -Plus la mauvaise herbe est jeune plus l'efficacité et meilleure -a partir du 3 feuilles jusqu'au début tallage du blé Le produit a montré une bonne efficacité de sur : Chardon, fumeterre, melilot, malva spp, gaillet,l iseron, renouee, mourron, souci des champs ,silene de tunisie ,capselle bourse de pasteur Une efficacité moyenne sur : Amaranthe, ravenelle, sinapis, s tellaire, papaver Matricaire, chrysanthme (Comm 16/07/2025)
46	Chlorotoluron +pendimethalin+ diflufenican	250g/l+300g/l+ 40g/l	SC	UMBRA 590 SC	H.030-22	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Orge, Blé dur: Adventices dicotylédones et graminées sauf ray-grass résistant: 2 l/ha Volume de bouillie:200 à 300 l/ha SOIT: Stade1: <u>Post semis-prélevée de la culture BBCH 00-07</u> SOIT: Stade2: <u>1 feuille –début tallage de la culture BBCH 11-21</u> -nombre d'application:1 DAR:N/A -l'application de l'herbicide peut se faire soit au stade, soit au stade, selon la décision de l'agriculteur(com 27/12/22)
47	Chlorotoluron + Diflufenican	600 g/L + 40 g/L	SC	CARMINA MAX SC	H.22-25	AGRIPROTEC	NUFARM	Blé dur : Dicotylédones:2,5 L/ha Volume de bouillie;200-400 l Mode de traitement:foliaire Période de traitement (Préventif ou Curatif) : Curatif Nombre de traitements: 01 Calendrier des applications: Post-levée Le produit a montré une bonne efficacité sur : Chardon, fumeterre, melilot, malva spp,gaillet,liseron, renouee, mourron, souci des champs ,silène de Tunisie ,capselle bourse de pasteur

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								Une efficacité moyenne sur : Amaranthe, ravenelle, sinapis, stellaire, Une faible efficacité sur : Papaver, Matricaire, chrysanthème (Comm 16/07/2025)
48	Chlortoluron	500 g/L	SC	DESPERADO	H.08-21	AGRIPROTEC	Nufarm	Blé dur: Graminées annuelles (raygrass; phalaris; vulpin ;folle avoine) :3.6 l/ha(300 l/ha) -pulvérisation foliaire -en curatif -nbre de trait:1 -en post levée précoce des adventices: raygrass-folle avoine-vulpin et phalaris -DAR: non applicable(COMM09/02/21)
49	Chlortoluron	500 g/L	SC	Tolurex 50	H.006-11/21	SEPCM	AAKO	Blé dur, Blé tendre, Orge : Plantes adventices et folle avoine : 4,8 L/ha
50	Chlortoluron	500 g/L	SC	RAYGARD	H.03-25	BIOPROTECTION	AAKO	Blé dur, Blé tendre, Orge : Plantes adventices et folle avoine : 4,8 L/ha(Comm 25/06/2025)
51	Chlortoluron + Isoxabene	500 g/L + 18.7 g/L	SC	FLEXIDOR	H.015-18	ATLAS AGRICOLE	Dow Agrosiences/corte va	Blé : Graminées (ray grass) : 4 l/ha(COMM18/10/2018)
52	Chlortoluron + Isoxabene	500 g/L + 18.7 g/L	SC	Aubaine	H.014-13/23	SEPCM	Dow Agrosiences	Blé : Graminées (ray grass) : 4 l/ha (COMM 19 avril 2023)
53	Clethodim	240 g/l	SC	ICASSO 240 SC	H.013-20	SANABEL AGRO	RotamAgrochemical/rival	Colza: Herbicide de post levée : Mauvaises herbes Anti graminées:1 l/ha avec volume de bouillie : 300 litre d'eau; -Pulvérisation foliaire;-Traiter au stade précoce de mauvaise herbe.(COMM13/02/2020)
54	Clethodim	240 g/l	EC	CLETOPROTEKT	H.031-22	LIEN AGRICOLE	Zhejiang tidecropscience/ chine(protekingph ytosanitary/Espagne	Fève: Graminée:0.8 l/ha Volume de bouillie:300 l/ha -en post levée stade 2 à 3 feuilles(com 27/12/22)
55	Clethodim	240 g/l	EC	CLODIM FORTE 240 EC	H.004-22	SOLAGRI	SYNGENTA	Colza: Graminéesannuelles:0.5 l/ha Pulvérisation foliaire -en post levée de la culture Nbre d'application:1 Stade d'application: stade 3 feuilles mauvaises herbes et en post levée de la culture (COMM 08/06/22) Fève: Graminées annuelles: 0.5 l/ha Pulvérisation foliaire Nombre d'application:1

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								Stade d'application: stade 3 feuilles mauvaises herbes et en post levée de la culture(COMM27/12/22)
56	Clethodim	12%	EC	FYTODIM EC	H.032-22	FERTITECH	TOPAGRO BIOSCIENCE	Fève: Graminées annuelles:1L/ha -Une application par an en post levée de la culture et des adventices(com 27/12/22)
57	Cléthodim	240 g/l	EC	CLETHODIM EC Sous réserve de changement de nom	H.06-25	TASMID	PSYCHE M CHEMICALS LIMITED	Colza :Mauvaises herbes graminées (post levée): 11 /ha Pulvérisation foliaire Volume de bouillie :300l d'eau (Comm 16/07/2025)
58	Cléthodime	120 g/L	EC	Select Super	H.004-11/21	BIOPRO TECTION	UPL/ARYSTA LIFESCENCE	Petit pois, fève, ail, fénugrec, oignon : Graminées annuelles : 1 L/ha en post-levée de la mauvaise herbe à partir du stade 3 feuilles; Betterave : Mauvaises herbes graminées au stade 3 feuilles et au poste levée de laculture : 1 L/ha. Colza : graminées au stade de post levée de la culture :1 l/ha (comm 04/11/15)
59	Cléthodime	120 g/L	EC	Akodim 120 EC	H.005-11/21	SEPCM	AAKO	Petit pois, fève, ail, fénugrec, oignon : Graminées annuelles : 1 L/ha en post-levée de la mauvaise herbe à partir du stade 3 feuilles Betterave : Mauvaises herbes graminées au stade 3 feuilles et au poste levée de laculture : 1 L/ha.
60	Cléthodime	120 g/L	EC	SKIPPER 120 EC	H.04-25	ATLAS AGRICOLE	AAKO	Petit pois, fève, ail, fénugrec, oignon : Graminées annuelles : 1 L/ha en post-levée de la mauvaise herbe à partir du stade 3 feuilles Betterave : Mauvaises herbes graminées au stade 3 feuilles et au poste levée de laculture : 1 L/ha. (Comm 25/06/2025)
61	Clodinafop -propargyl + cloquintocet mexyl	24% +6%	EC	CLOWIT EC	H.26-25	UNIAGRO	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD CHINE	Blé dur : Graminées annuelles : 0.3l/ha Stade d'application: BBCH 39 Bouillie: 100-300/ha Nb d'application:1 Le produit a montré une efficacité de moyenne sur : Brome Une efficacité faible sur : Ray grass, chient dent une bonne efficacité sur : Folle avoine, orge (Comm 16/07/2025)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
62	Clodinafop-propargyl +Cloquintocet-mexyl	100g/l +25 g/l	EC	BUGUIS EC	H.008-18	AGRIPROTEC	PROPLAN/QUMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS SPAIN SLU	Blé : Graminées: 0.5 l/ha Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes graminées "Brome" et ray grass résistant. Application en Postlevée.Traitement foliaire; nbre de trait. :1). COMM 18/10/2018
63	Clodinafop-propargil	80 g/L	EC	TOPIK 80	H.007-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Blé dur : Graminées sauf ray grass : 900 cc/ha
64	Clodinafop-propargil +Cloquintocet-2-Mexyl	100 g/L +25 g/L	EC	TOPIK 100	H.008-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Blé dur, Blé tendre,Triticale : Antigaminées annuelles , ray grass non résistant : 0,5 L/ha
65	Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-mexyl	95 g/l+25 g/l	EC	CICLOPE EC	H.002-20	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	Blé :Mauvaises herbes graminées:0.5 l/ha ; -Traitement foliaire;-1 à 2 traitements espacés de 20 jours par cycle de la culture .-Stade d'application : stade végétatif BBCH-39(stade de 3 feuilles jusqu'au début de l'élongation de la tige); NB : Mentionner sur l'étiquette " absence d'efficacité sur le ray grass résistant"(COMM13/02/2020)
66	Clopyralid	100 g/L	EC	VERSATILL	H.014-20	ATLAS AGRICOLE	DOW AGROSCIENCE/c orteva	Colza : M. Herbesdicotylédones : 1 L/ha (Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes "Moutarde") en application de post-levée. Avec action systémique.(COMM13/02/2020)
67	Clopyralid	100g/l	SL	GLOPYR 100 SL	H.004-18	AGROSYSTEMES	Globachem	Colza : Dicotylédone graminées: 1.25 l/ha en Post levée; Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes "Moutarde") (COMM 18/10/18)
68	Clopyralid	300g/l	SL	clopyrd 30 SL	H.005-20	SLDA	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Blé :Adventices dicotylédones:0,4 l/ha -Pulvérisation foliaire. -une application par saison et par culture -Appliquer au stade de fin tallage à 2 nœuds et quand les mauvaises herbes sont au stade de 4 à 6 feuilles.(COMM09/02/21)
69	Clopyralid	300g/l	SL	PRYSTAR SL	H.01-24	SANABEL AGRO	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Blé :Adventices dicotylédones:0,4 l/ha -Pulvérisation foliaire. -une application par saison et par culture -Appliquer au stade de fin tallage à 2 nœuds et quand les mauvaises herbes sont au stade de 4 à 6 feuilles.(COMM22/05/24)
70	Cycloxidime	100 g/L	EC	Focus Ultra	H.009-11/21	STIMA	BASF	Petit pois, lentille, féverole : Antigaminées : 2L/ha Betterave : Antigaminées : 1,5 à 2 L/haColza : M. Herbes : 2 L/ha

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
71	Cycloxdime	100 g/L	EC	stratos ultra EC	H.17-21	agriprotec	BASF	Petit pois, lentille, féverole : Antigraminées : 2L/ha Betterave : Antigraminées : 1,5 à 2 L/ha Colza : M. Herbes : 2 L/ha(COMM09/02/2021)
72	Dicamba +2,4 – D	120 g/L +344 g/L	SL	Dialen Super	H.011-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Blé dur : Dicotylédones : 0,8 L/ha stade fin tallage début montaison; Orge : Dicotylédone : 0,8 L/ha ; Avoine : Dicotylédones: 0.8 L/ha
73	Dicamba +Prosulfuron	500 g/kg+50 g/kg	WG	CASPER 55 WG	H.004-20	SOLAGRI	Syngenta	Blé : Dicotylédones annuelles et vivaces : 0,3 kg/ha dans une bouillie de 300 l d'eau/ha;-Pulvérisation foliaire en post-levée. - Une seule application par saison au début tallage (stade de 4 à 6 feuilles de la culture). (COMM13/02/2020)
74	Dicamba-Sel Dimethylamine (DMA)	480g/l		procamba	H.13-21	SSCC	ghardachemical	Blé dur :Adventices dicotylédones annuelles :0.5 l/ha Plein à fin tallage de la culture(COMM09/02/21)
75	Diflufenican	50%	WG	OSSETIA WG	H.008-20	El MOUSSEM	RotamAgrochemic al/ALBAUGH	Blé : Anti dicotylédones:375 g/ha avec volume de bouillie :300 litre d'eau; En post semis, prélevée précoce des céréales(COMM13/02/2020) (COMM 28/12/2023)
76	Diflufenican (ou Diflufenicanil)	500 g/l	SC	Diflanil	H.010-14/24	AGROSYSTEMES	GLOBACHEM	Blé : Dicotylédones : 375 ml/ha
77	Diflufenican + Flufenacet + Flurtamone	60 g/l + 240 g/l + 120 g/l	SC	Vigon 420 SC	H.012-16	PROMOCHIMIE	BAYER CROPSCIENCE	Blé dur : Adventices graminées et dicotylédones annuelles : 1 L/ha en Post semi et pré-levée de la culture. (COMM 08/06/22)
78	Diflufenican + Metsulfuron-méthyl	60 % +6%	WG	Alliance	H.002-13/23	BIOPROTECTION	NUFARM S.A	Blé : Dicotylédones : 75 g/ha(COMM 19 avril 2023)
79	Diflufenican + Metsulfuron-méthyl	60 % +6%	WG	polymer WG	H.19-21	AGRIPROTEC	NUFARM S.A	Blé : Dicotylédones : 75 g/ha(COMM09/02/21)
80	Diflufenican +flufenacet	200 g/l+400 g/l	SC	SC	H.009-22	BIOPROTECTION	UPL	Blé dur : Adventices graminées et dicotylédones annuelles: 0.6 l/ha Application en post semis-prélevée de la culture (maximum 3 feuilles) (COMM 08/06/22)
81	Diflufenican+flufenacet	200 g/l + 400g/l	SC	FLOUKAN SC	H.008-22	SANABEL AGRO	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Blés :Désherbage anti dicotylédones et graminées: 0.6 l/ha Volume de bouillie:300 l/ha -application en post semis prélevée précoce (COMM 08/06/22)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
82	Dimethenamid-P+Metazachlor +Quinmerac	100g/l+300g/l+100 g/l	SE	BUTISAN AVANT SE	H.012-20	COTUGRAIN	BASF	Colza: Mauvaises herbes dicotylédones:2 l/ha;-Une seule application par pulvérisation;stade d'application :post semis prélevée ou post levée précoce;N/B : Le produit manque d'efficacité sur les mauvaises herbes graminées;(COMM13/02/2020)
83	EthametSulfuron Methyl	750 g/kg	WG	MUSTER 75 WG	H.023-22	SSCC	FMC	COLZA: Dicotylédones:25 g/ha+ huile adjuvant Post levée des adventices ou stade de la culture (BBCH 10-18) (com 27/12/22)
84	Fénoxaprop-p-Ethyl	69g/l	EW	Foxtrot	H.027-15/25	AGROSYSTEME	FMC	Blé : Adventices graminées, ray grassnon résistant: 1 l/ha (application en pst levée) (comm 25 juin 2025)
85	Fénoxaprop-P-Ethyl +Iodosulfuron-Méthyl Sodium +Méfenpyr – diéthyl	64 g/L +8 g/L + 24 g/L	EC	Puma Evolution	H.015-11/21	JADWA AGROTEC	BAYER CROPS SCIENCE	Céréales : monocotylédones + dicotylédones : 1 L/ha (en post levée des céréales stade 3 à 4 feuilles jusqu'à fin tallage)
86	Fénoxaprop-P-Ethyl +Iodosulfuron-Méthyl Sodium +Méfenpyr – diéthyl	64 g/L +8 g/L + 24 g/L	EC	HUSSAR EVOLUTION	H.02-25	AGRIPROTEC	BAYER CROPS SCIENCE	Céréales : monocotylédones + dicotylédones : 1 L/ha (en post levée des céréales stade 3 à 4 feuilles jusqu'à fin tallage) (Comm 25/06/25)
87	Florasulam +Iodosulfuron-méthyl-sodium +Diflufenican	20g/kg + 50 g/kg + 400 g/kg	WG	JOYSTICK WG	H.11-25	AGROSYSTEMES	ASCENZA AGRO	Blé dur: dicotylédones : 0.2 Kg/ha -Entre les stades BBCH 13 ET BBCH 29 (de 3 feuilles étalées à fin tallage) -Nombre d'application: 1 seule application par saison Le produit a montré une bonne efficacité sur : Chardon, fumeterre, melilot, malva spp, gaillet, liseron, renouee,mourron, souci des champs ,silène de Tunisie ,capselle bourse de pasteur, Amaranthe, ravenelle, sinapis, stellaire, papaver Une faible efficacité sur : Matricaire, chrysanthme (Comm 16/07/2025)
88	Florasulam +tribenuron-methyl	200 g/kg+600 g/kg	WG	GRANSTAR MAX WG	H.12-21	AGRIPROTEC	chenminova/FMC	Blé dur: Adventicesdicotylédones:25 g/ha(150-300 l/ha) herbicide de post levée -Mode de traitement: pulvérisation -Période de traitement (préventif ou curatif) post émergences des adventices -Nombre de traitements:1 par an(COMM09/02/21) -Calendrier des applications: NA
89	Florasulame	250g/kg	SG	Clyde SG	H.12-25	AGRIPROTEC	ALBAUGH EUROPE SARL	Blé dur: mauvaises herbes:Dicotylédones : 25g/ha Volume de Bouillie : 200-400 l/ha mode de traitement:foliaire -période de traitement (préventif ou curatif):poste levée à partir de stade de 03 feuilles jusqu'à fin tallage -nbre d'application:01

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								Le produit a montré une bonne efficacité sur : Chardon, fumeterre, melilot, malva spp, gaillet, liseron, renouee, mourron, souci des champs ,silène de Tunisie ,capselle bourse de pasteur Une efficacité faible sur : Amaranthe, ravenelle, sinapis, stellaire, papaver Matricaire, chrysanthème(Comm 16/07/2025)
90	Florosulame + Flumetsulam	75 g/L + 100 g/L	EC	Derby	H.085-11/21	promochimie	DOW AGROSCIENCES/ corteva	Céréales à pailles: Dicotylédones : 50 cc/ha herbicide de post levée des cereales (COMM09/02/2021)
91	Fluazifop-P-Butyl	125 g/l	EC	Benfuron	H.013-16	AGRIMED DISTRIBUTION	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Féverole : adventices graminées, ray grass non résistant (en post levée) :1.5 l/ha COMM 28 dec 2023
92	Fluazifop-P-Butyl	150 g/l	EC	Fouir	H.013-17	EL KHADRA	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Pois-chiche, Féverole : adventices graminées, ray grass non résistant (en post levée) :1.25 l/ha.(COMM 18/10/2017); Betterave à sucre: Mauvaises herbes : monocotylédones et graminées annuelles et vivace :2.5l/ha -Traitement : Pulvérisation foliaire. -Action ; actif en post levée contre les monocotylédones et les graminées Moment d'applications : -Appliquer une seule fois par culture et par saison au début de croissance végétative et avant floraison de la culture ciblée(COMM09/02/21)
93	Fluazifop-P-Butyl	125 g/L	EC	Trivko	H.001-18	SOLAGRI	SYNGENTA	Betterave : Monocotylédones : 3 L/ha Légumineuses : M.Herbes : 1,5 L/ha
94	Flucarbazone-sodium	70%	WG	Everest 70 WG	H.017-11/21	AGRIPROTEC	ARYSTA LIFESCIENCE	Blés : Phalaris et folle avoine : 42 g/ha +500 cc/ha huile non ionique Blés : Graminées+Brome : 43 g + 0,5 L d'agral / ha
95	Flumetsulam	800 g/kg	WG	BROADSTRIKE WG	H.009-20	PROMOCHIMIE	DOW AGROSCIENCE	Petit pois; Fenugrec: Dicotylédones:25 g/ha; -1 app-DAR:60 j;-Une application stade 2-3 feuilles des légumineuses;Il est obligatoire, essentiellement pour l'usage sur le petit pois, de:Mentionner en clair les reCOMMandations suivantes sur les étiquettes :- NE PAS appliquer le produit sur les cultures qui peuvent être stressées en raison de périodes prolongées de températures extrêmes (moins de 5 ° C ou plus de 30 ° C), de stress hydrique (sol trop saturé d'eau ou affecté par la sécheresse);- NE PAS irriguer (quelle que soit la méthode) la culture ou le pâturage traité

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								pendant 48 heures après l'application.- NE PAS appliquer sur les cultures affectées par un traitement herbicide antérieur (par exemple triazines ou sulfonylurées).(COMM13/02/2020) (COMM 28/12/2023)
96	Fluroxypyr	20%	EC	keynvl herbicide EC	H.11-21	etsmezghani	industrialquimicak ey	Blé dur :Adventices dicotylédones :1 l/ha (COMM09/02/21)
97	Fluroxypyr (ester1-methylheptyl)	200 g/l	EC	Flurostar 200	H.011-14/24	AGROSYSTEMES	GLOBACHEM	Blés :Dicotylédones : 1L/ha
98	Fluroxypyr +Clopyralid	150 g/l+60 g/l	EC	VEGA EC	H.006-20	AGRIMED DISTRIBUTION	SHARDA CROPCH EM LIMITED INDE	Blé :Adventices dicotylédones:1 l/ha; Pulvérisation foliaire.Stade d'application : fin tallage à 2 nœuds. Ne pas dépassé le stade BBCH39 (COMM13/02/2020) /, COMM 08/06/22)
99	Fluroxypyr +Clopyralid	50 g/l+28g/l	ME	KINVARA ME	H.005-22	AGRIPROTEC	BRACLAY	Blé dur :Mauvaises herbes dicotylédones (annuelles et vivaces):3 l/ha -traitement foliaire -nbre max de traitement:1 -Calendrier des applications :BBCH24-39 DAR:0 jours. (COMM 08/06/22)
100	Fluroxypyr-l-methylheptyl ester +florasulam	144 g/l +2.5 g/l	SE	FLUROSTAR XL SE	H.14-2 5	SSCC	GLOBACHEM	Blé dur :anti-dicotylédones :1l/ha Volume de Bouillie : 200-400 l/ha -Stade d'application:début tallage (BBCH39) dernière feuille étalée -1 application/12 mois Le produit a montré une bonne efficacité sur : Chardon, fumeterre,melilot,malva spp.gaillet,liseron,renouee,mourron,souci des champs ,silène de Tunisie ,capselle bourse de pasteur Une efficacité moyenne sur : Amaranthe, ravenelle, sinapis, stellaire, papaver Matricaire, chrysanthme (Comm 16/07/2025)
101	Glyphosate	360 g/l	SL	GLYFOSTAR	H.002-19	SLDA	SHARDA CROPCH EM LIMITED INDE	Arbo, Toutes cultures, Sol nu : Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha ; Dés herbant total : 12 l/ha;(COMM 23/04/2019)
102	Glyphosate	360 g/l	SL	GALLUP SUPER SL	H.033-22	MULTAGRI	Braclay chemicals	Agumes :Dés herbage total (chiendent.cyperus.diss):12 l/ha

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								Volume de bouillie:300l -Mode de traitement : pulvérisation foliaire -période de traitement (préventif ou curatif):désherbage total -Nombre max de traitements:2 -Calendrier des applications :en cas de présence d'adventices en conditions poussantes. (com 27/12/22) Féverole : Orobanche : 166 ml/ha -02 applications espacées de 02 semaines en post levée, début floraison (Comm 16/07/2025)
103	Glyphosate	360g/l	SL	Round Up Pro	H.004-15/25	ATLAS AGRICOLE	MONSANTO/BAYER	Agumes : Mauvaises herbes annuelles (Graminées et dicotylédones) : 12 l/ha Féverole : Orobanche : 166 ml/ha -02 applications espacées de 02 semaines en post levée, début floraison (Comm 16/07/2025)
104	Glyphosate	360 g/l	SL	DRAGON	H.003-19	FERTITECH	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha;Désherbant total : 12 l/ha ;(COMM 23/04/2019)
105	Glyphosate	360 g/l	SL	SATELITE360 SL	H.001-19	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAUGH EUROPE SARL	PECHER: Mauvaises herbes annuelles: 10 l/ha;- volume de bouillie: 300 à 400 l/ha; -Trait. : Appliquer en pulvérisation dirigée au sol à basse pression;-Mode d'action : Systémique;Le produit est de faible efficacité sur les mauvaises herbes suivantes : Elytrigiasp. , Amaranthusretroflexus ,Robusfruticosus et Rumex acetosella; (COMM23/04/2019) Féverole : Orobanche : 166 ml/ha -02 applications espacées de 02 semaines en post levée, début floraison (Comm 16/07/2025)
106	Glyphosate	360 g/l	SL	VERDIS 36 SL	H.009-17	EXCEL AGRI	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha; Désherbant total : 12 l/ha ; (COMM 27/12/22)
107	Glyphosate	360 g/l	SL	NOV-UP	H.003-17	AGRINOVA	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha; Désherbant total : 12 l/ha ; (COMM 20/06/2017). (COMM 20/06/2017) ;(COMM 08/06/2022)
108	Glyphosate	360 g/l	SL	GLYPHO-CAP	H.010-17	NEGANOR FFT	HOCKLEY INTERNATIONAL LIMITED	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha; Désherbant total : 12 l/ha ; (COMM 20/06/2017)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								Féverole : Orobanche : 166 ml/ha -02 applications espacées de 02 semaines en post levée, début floraison (Comm 16/07/2025)
109	Glyphosate	450 g/l	SL	GLYFAST 450 SL	H.034-22	MULTAGRI	Braclay chemicals	Agrumes :Mauvaises herbes annuelles:2 l/ha Agrumes :Mauvaises herbes vivaces:5 l/ha Volume de bouillie:300l/ha -Mode de traitement : pulvérisation foliaire -période de traitement (préventif ou curatif):désherbage total -Nombre max de traitements:2 -Calendrier des applications :en cas de présence d'adventices(com 27/12/22) Féverole : Orobanche : 133 ml/ha -02 applications espacées de 02 semaines en post levée, début floraison (Comm 16/07/2025)
110	Glyphosate	490g/L	SL	GALLUP HI-AKTIV SL	H.001-20	RAYEN PHYTAGRI	Barclay chemicals(R&D) Ltd.	Poirier : Mauvaises herbes <u>vivaces ou annuelles</u> :4.5L/ha avec volume de bouillie:300 l/ha (Sous réserve de bien spécifier la nature des mauvaises herbes : annuelles ou vivaces en fonction de la dose testée) (COMM13/02/2020)
111	Glyphosate	480 g/l	SC	Round up innov	H.003-15/25	ATLAS AGRICOLE	MONSANTO	Agrumes : Mauvaises herbes annuelles (Graminées et Dicotylédones) : 5 l/ha(comm25 juin 2025)
112	Glyphosate	70%	SG	Kalach Extra	H.007-16	BIOPROTECTION	ARYSTA LIFESCIENCE	Zones non cultivées et vergers mauvaises herbes annuelles et vivaces : 1 kg/hl (une bouillie de 600 l/ha).Pour une forte pression des vivaces : 9 kg/ ha pour une bouillie de 600 l d'eau au maximum.
113	Glyphosate	480 g/l	SL	Herbolex Max	H.008-15/25	SEPCM	DOW AGROSCIENCE/ CORTEVA/ALBA UGH	Agrumes : Mauvaises herbes annuelles (Graminées et dicotylédones) : 2 l/ha(comm25 juin 2025)
114	Glyphosate	360 g/l	SL	Kalach 360	H.022-11/21	BIOPROTECTION	UPL/ARYSTA LIFESCIENCE	Arbo, Toutes cultures, Sol nu : Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha Féverole : Orobanche : 166 ml/ha -02 applications espacées de 02 semaines en post levée, début floraison (Comm 16/07/2025)
115	Glyphosate	450 g/L	SL	Round up Plus	H.029-11/21	ATLAS AGRICOLE	MONSANTO/BAYER	Arboriculture : M. herbes annuelles : 2 L/ha; Arboriculture : M. herbes vivaces : 5 L/ha Féverole : Orobanche : 133 ml/ha -02 applications espacées de 02 semaines en post levée, début floraison

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								(Comm 16/07/2025)
116	Glyphosate	360 g/l	SL	Glycel	H.019-11/21	AGRIMATCO	excel crop care/Sumitomo chemical	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Dés herbant total : 12 l/ha
117	Glyphosate	360 g/l	SL	Cible	H.018-11/21	AGRIPROTEC	NUFARM	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Dés herbant total : 12 l/ha Féverole : Orobanche : 166 ml/ha -02 applications espacées de 02 semaines en post levée, début floraison (Comm 16/07/2025)
118	Glyphosate	360 g/l	SL	Agriatech	H.020-11/21	AGROSYSTEMES	AGRIA SA	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Dés herbant total : 12 l/ha Féverole : Orobanche : 166 ml/ha -02 applications espacées de 02 semaines en post levée, début floraison (Comm 16/07/2025)
119	Glyphosate	360 g/l	SL	Maynozate	H.025-15/25	AMINCO	AGRIA SA	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Dés herbant total : 12 l/ha Féverole : Orobanche : 166 ml/ha -02 applications espacées de 02 semaines en post levée, début floraison (Comm 16/07/2025)
120	Glyphosate	360 g/l	SL	Glyweed	H.086-11/21	ATLAS INDUSTRIE	COROMANDEL Ltd.	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Dés herbant total : 12 l/ha
121	Glyphosate	360 g/l	SL	Kleen Up	H.097-11/21	BIOPROTECTION	NUFARM	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Dés herbant total : 12 l/ha Féverole : Orobanche : 166 ml/ha -02 applications espacées de 02 semaines en post levée, début floraison (Comm 16/07/2025)
122	Glyphosate	360 g/l	SL	Blanca	H.006-13/23	COTUGRAIN IMPEX	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Dés herbant total : 12 l/ha (COMM 19 avril 2023) Féverole : Orobanche : 166 ml/ha -02 applications espacées de 02 semaines en post levée, début floraison . (Comm 16/07/2025)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
123	Glyphosate	360 g/l	SL	GLISO 360	H.005-16	EL KHADRA	SIPCAM INGARA	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Dés herbant total : 12 l/ha
124	Glyphosate	360 g/l	SL	Weed Killer	H.006-16	EL KHADRA	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Dés herbant total : 12 l/ha
125	Glyphosate	360 g/l	SL	Fortin	H.024-11/21	ETS MEZGHANI	INDUSTR LQUIM ICAKEY	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Dés herbant total : 12 l/ha Féverole : Orobanche : 166 ml/ha -02 applications espacées de 02 semaines en post levée, début floraison (Comm 16/07/2025)
126	Glyphosate	360 g/l	SL	Buggy	H.079-11/21	PROMOCHIMIE	SIPCAM INGARA	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Dés herbant total : 12 l/ha
127	Glyphosate	360 g/l	SL	Glyphomax	H.013-14/24	LIEN AGRICOLE	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Dés herbant total : 12 l/ha (COMM13/02/2020) (comm 22 mai 2024) Féverole : Orobanche : 166 ml/ha -02 applications espacées de 02 semaines en post levée, début floraison (Comm 16/07/2025)
128	Glyphosate	360 g/l	SL	Diss	H.093-11/21	PROTAGRI	UNITED PHOSPHORUS	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Dés herbant total : 12 l/ha
129	Glyphosate	360 g/l	SL	Glyster	H.025-11/21	SANABEL AGRO	SINON CORPORATION	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Dés herbant total : 12 l/ha Féverole : Orobanche : 166 ml/ha -02 applications espacées de 02 semaines en post levée, début floraison (Comm 16/07/2025)
130	Glyphosate	360 g/l	SL	Nasa 36 SL	H.001-15/25	SOCOOPEC	ZENITH CROPS SCIENCES/ agria	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Dés herbant total : 12 l/ha(comm 25 juin 2025)
131	Glyphosate	360 g/l	SL	Glyphotec	H.028-11/21	STEC	AAKO BV	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypérus, diss : 12 l/ha Dés herbant total : 12 l/ha
132	Glyphosate + Oxyfluorène	200 g/L + 30 g/L	SC	Dipiril Plus	H.016-13/23	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAU	Arboriculture : M. herbes annuelles et vivaces: 4 L/ha (COMM 19 avril 2023)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
							GH EUROPE SARL	
133	Glyphosate + Oxyfluorène	360 g/L +30 g/L	SC	Brout	H.030-11/21	SEPCM	AAKO	Agrumes : M. herbes annuelles : 2 L/ha
134	Halauxifen-méthyl +aminopyralid +cloquintocet –mexyl	33.7 g/l +27.2g/l+32.3 g/l	EC	TREZAK EC	H.14-21	AGRIPROTC	Dow agrosience	Blé dur :Adventices dicotylédones:0.2 l/ha -Stade d'application :début tallage-2 nœuds -par pulvérisation -01 application par an -DAR:13jours(COMM09/02/21)(COMM28 dec 23)
135	Imazamox + Metazachlor	25 g/l +375 g/l	SC	Nopasaran	H.011-16	COTUGRAIN	BASF	Colza (variétés clearfield) : Graminées et Dicotylédones (Stade 2-4 feuilles au stade 8 feuilles max) : 1.5 L/ha + 1.5 l/ha du mouillant spécifique Dash (45 g/l acide oleique + 205 g/l ester de phosphate d'alcool gras + 345 g/l ester méthylique d'acide gras); NB/ Indiquer sur l'étiquette la mention : Faible action sur liseron et mille pertuis
136	Indaziflam	500 g/l	SC	Alion 500 SC	H.013-22	BIOPROTECTION	BAYER	Vigne :Adventices annuelles graminées et dicotylédones:0.1 l/ha -Application en pré-émergence de l'adventice. (COMM 08/06/22) (comm16/07/2025)
137	Iodosulfuron +Mesosulfuron +Mefenpyr	6 g/Kg +30 g/Kg +90 g/Kg	WG	Atlantis	H.033-11/21	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPSCIENCE	Céréales : Polyvalent : 500 g/ha
138	Lenacil	80 % (800 g/kg)	WG	VENZAR	H.003-22	SEPCM	FMC	Betterave à sucre :Adventices dicotylédones annuels:0.620 kg/ha/cycle de la betterave -En prélevée de la betterave à sucre, le produit s'utilise à la dose de 0.310 kg/ha -En post levée de la betterave à sucre, le produit prévient les levées tardives des mauvaises herbes. 0.310 kg/ha -Volume de bouillie: un minimum de 600-800 litres de bouillie à l'hectare. (COMM 08/06/22)
139	Mesosulfuron-Méthyl(Mesomax) +Iodosulfuron +Méfenpyrdiéthyl	30 g/Kg+30 g/Kg +90 g/Kg	WG	Amilcar	H.036-11/21	STEC	BAYER CROPSCIENCE	Blés : Graminées et dicotylédones : 330 g/ha
140	Mesosulfuron-Méthyl+Iodosulfuron – Méthyl Sodium + Méfenpyrdiéthyl (SAFENER)	7,5 g/L + 7,5 g/L+ 22,5 g/L	OD	Amilcar OD	H.037-11/21	STEC	BAYER CROPSCIENCE	Blé dur : Adventices Graminées et dicotylédones (en post levée-tallage) :1.25l/ha; NB/ : faible action sur brome, faux fenouil, fumeterre et coquelicot (Correction de la dose : COMM 27/09/2016)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
141	Mesosulfuron-Méthyl+Iodosulfuron – Méthyl Sodium + Méfenpyrdiéthyl (SAFENER)	7,5 g/L + 7,5 g/L+ 22,5 g/L	OD	COSSACK OD	H.01-25	AGRIPROTEC	BAYER CROPS SCIENCE	Blé dur : Adventices Graminées et dicotylédones (en post levée-tallage) :1.25l/ha;NB/ : faible action sur brome, faux fenouil, fumeterre et coquelicot (COMM 25/06/2025)
142	Mésosulfuron-Méthyl+Iodosulfuron-Méthyl +Méfenpyrdiéthyl	10 g/l +2 g/l +30 g/l	OD	Atlantis OD	H.012-15/25	ATLAS AGRICOLE	BAYER CROPS SCIENCE	Blé dur : Adventices Graminées et dicotylédones (en post levée-tallage) :1.5l/ha(comm25 juin 2025)
143	Mesosulfuron-méthyle +Propoxcarbason-sodium +Méfenpyr-diéthyle (phytoprotecteur)	45 g/kg +67,5g/kg +90g/kg	WG	OLYMPUS FLEX WG	H.009-18	ATLAS AGRICOLE	BAYER AG	Blé : Adventices graminées : 330 g/ha en Post levée ;Avec faible efficacité sur le "Ray-grass" résistants;(COMM 18/10/2018)
144	Mesosulfuron-méthyl + Pinoxaden +mefenpyr-diéthyl (phytoprotecteur)	28.8 g/L + 120 g/L + 90 g/l	OD	AVOXA MAXX OD	H.23-25	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Blé dur : Adventices dicotylédones et graminées : 440 ml/ha Volume de bouillie:200-400 l/ha stade d'application: post-emergence BBCH21 à29 Nbre d'app:1 Le produit a montré une bonne efficacité sur : Chardon, fumeterre, melilot,malva spp, gaillet, liseron,renouee,mourron,souci des champs ,silène de Tunisie ,capselle bourse de pasteur Une efficacité moyenne sur : Amaranthe, ravenelle, sinapis, stellaire, papaver Matricaire, chrysanthème Une efficacité moyenne sur : Brome, chient dent, folle avoine , phalaris, orge Une faible efficacité sur :Ray grass (COMM 16/07/2025)
145	Metazachlor	500 g/l	SC	RAPSAN 500 SC	H.002-18	AGROSYSTEMES	Globachem	Colza : Dicotylédones graminées : 2 l/ha enPré-émergence.Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes "Faux fenouil; Chardon; Gaillet; Fumeterre";(COMM 18/10/2018)
146	Metazachlor +Quinmerac	400 g/l +100g/l	SC	RAPSAN TDI SC	H.003-18	AGROSYSTEMES	Globachem	Colza : Dicotylédones graminées : 2.5 l/ha en Pré-émergence. (Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes"Fumeterre;Chrysanthème") (COMM 18/10/2018)
147	Metribuzine	75%	WG	Maestro 75 WG	H.042-11/21	BIOPROTECTION	AAKO	P. de terre, tomate : M. Herbes : 700 g/ha; Tabac :M. Herbes : 1 Kg/ha

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
148	Metribuzine	600 g/L	SC	Sencor 600SC	H.089-11/21	PROMOCHIMIE	BAYER CROPSCHIENCE	Pomme de terre : Mauvaises herbes :0,75 L/ha
149	Metribuzine	70%(g/kg)	WG	MAYA	H.017-22	SLDA	UPL	Tomate :Mauvaise herbes ,Dicotylédones annuelles(UNIQUEMENT) : 700g/ha (COMM 08/06/22)
150	Metribuzine	70%(g/kg)	WG	DANCOR 70	H.004-16	PROTAGRI	UPL	Tomate :Mauvaise herbes ,Dicotylédones annuelles(UNIQUEMENT) :700g/ha
151	Metribuzine	700 g/kg	WDG	MATRIX WDG	H.001-17	STIMA	SHARDA CROPCEM LIMITED INDE	Pomme de terre : Mauvaises herbes : 700 g/ha ;(COMM 20/06./2017)
152	Metribuzine	700 g/kg	WDG	GRAZY 70% WDG	H.20-21	AGRIMED DISTRIBUTION	SHARDA CROPCEM LIMITED INDE	Pomme de terre : Mauvaises herbes : 700 g/ha ;(COMM09/02/21) (COMM28 dec 2023)
153	Metribuzine	48%	SC	TUBERON	H.01-21	AGRIMATCO	UPL	Pomme de terre :Mauvaisesherbes:1 l/ha - pulvérisation foliaire en post levé(COMM09/02/21)
154	Metribuzine	480 g/l	SC	buzzin	H.03-21	Delta agricole plus	SHARDA CROPCEM LIMITED INDE	Pomme de terre :Mauvaisesherbes:0,9 l/ha,application en prélevée de la culture(COMM09/02/21)
155	Metribuzine	480 g/l	SC	Mitrazé	H.015-22	AGRIMED DISTRIBUTION	SHARDA CROPCEM LIMITED INDE	Pomme de terre :Mauvaises herbes:0,9 l/ha, application en prélevée de la culture; (COMM 08/06/22)
156	Metribuzine	700 g/kg	WP	NOVAMET WP	H.037-22	AGRINOVA	AGROW ALLIED	Pomme de terre :Adventices dicotylédones et graminées:700 g/ha volume de bouillie:400 l/ha Mode d'application: pulvérisation foliaire en prélevée (une semaine après semis) ou en post levée de la pomme de terre (la culture ne dépasse pas 10 cm) et l'adventice(stade plantule 4 cm) DAR:60 jours. (COMM 27/12/22)
157	Metribuzine	700 g/kg	WP	POMCORE WP	H.001-22	NEGANOR	AGROW ALLIED	Pomme de terre :Adventices dicotylédones et graminées:700 g/ha volume de bouillie:400 l/ha Mode d'application: pulvérisation foliaire en prélevée (une semaine après semis) ou en post levée de la pomme de terre (la culture ne dépasse pas 10 cm) et l'adventice(stade plantule 4 cm) DAR:60 jours. (COMM 08/06/22)
158	Metribuzine+Clomazone	233g/l + 60 g/l	CS	CETUS	H.003-16	AGRIPROTEC	FMC	Pomme de terre : Mauvaise herbes, Dicotylédones en prélevée de la culture (pour respecter les LMR) : 1.5l/ha

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
159	Metrobromuron	500g/l	SC	PROMAN	H.02-21	NEGANOR	BELCHIM CROP PROTECTION/CE RITIS BELCHIM NV	Pomme de terre: Mauvaises herbes: graminées annuelles &dicotylédones annuelles :3.5 l/ha -stade d'applicatuion :pré-emergence, après butage -1 app/culture -le traitement ne peut plus avoir lieu lorsque les pommes de terre lèvent et COMMencent à pointer hors sol.(COMM09/02/21)
160	Metsulfuron Méthyl	20%	WG	Isomexx	H.043-11/21	AGRIPROTEC	NUFARM	Céréales : Dicotylédones : 30 g/ha (Traitement aux stades 3 à 4 feuilles de la culture, (Réévaluations de la dose)
161	Metsulfuron Méthyl	20%	WG	Karal	H.003-13/23	BIOPROTECTION	NUFARM	Céréales(en post levée) : Dicotylédones : 30 g/ha (Traitement aux stades 3 à 4 feuilles de la culture) (COMM 19 avril 2023)
162	Metsulfuron Méthyl	20%	WG	Metsy WG	H.009-16	PROTAGRI	UNITED PHOSPHORUS	Blé dur (en post levée) : Dicotylédones(Traitement aux stades 3 à 4 feuilles de la culture) : 30 g/ha
163	Metsulfuron Méthyl	20%	WG	METRON WG	H.038-22	AGRIMATCO	UNITED PHOSPHORUS	Blé dur (en post levée) : Dicotylédones(Traitement aux stades 3 à 4 feuilles de la culture) : 30 g/ha (COMM 27/12/22)
164	Metsulfuron-methyl + Bensulfuron-methyl	40g/kg+500 g/kg	WG	XANADU	H.029-22	BIOPROTECTION	UPL limited	Blé tendre, Orge: Adventices dicotylédones:100g/ha -Stade d'application du stade début tallage au stade fin tallage (com 27/12/22)
165	Oxyfluorfen	240 g/L	EC	Goal	H.081-11/21	promochimie	HANGZHOU NUTRICHEM/su mittimo	Oignons : Mauvaises herbes graminées et dicotylédones : 1,5 L/ha
166	Oxyfluorfen	240 g/L	EC	OXIFEN EC	H.046-11/21	Ets MEZGHANI	INDUST. QUIMICA KEY	Oignons : Graminées et dicotylédones : 1,5 L/ha (COMM13/02/2020)
167	Oxyfluorfen	240 g/L	EC	Clenofen 240	H.005-13/23	SANABEL AGRO	ZHEJIANG E- TONG CHEMICALCO LTD	Oignons : Graminées et dicotylédones : 1,5 L/ha(COMM 19 avril 2023)
168	Oxyfluorfen	240 g/L	EC	Oxistar 24%	H.087-11/21	SOCOOPEC	ZHEJIANG E- TONG CHEMICALCO LTD/shandongqiao chang modern agriculture	Oignons : Graminées et dicotylédones : 1,5 L/ha
169	Oxyfluorfen	240 g/l	EC	FENFEN EC	H.041-22	ATLAS AGRICOLE	LAINCO	Agrumes: Adventices annuelles dicotylédones et graminées:4 l/ha Volume de bouillie:400 l/ha Mode d'application: pulvérisation foliaire en pré et

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								post émergences(stade 4 feuilles ou plus d'adventices,4 cm de hauteur) DAR:21 jours Nombre d'applications:1 application/an(com 27/12/22)
170	Oxyfluorfen	240 g/l	EC	VERIN EC	H.035-22	NEGANOR	LAINCO	Agrumes: Adventices annuelles dicotylédones et graminées:4 l/ha Volume de bouillie:400 l/ha Mode d'application: pulvérisation foliaire en pré et post émergences(stade 4 feuilles ou plus d'adventices,4 cm de hauteur) DAR:21 jours Nombre d'applications:1 application/an(com 27/12/22)
171	Pendimethaline	400 g/L	SC	HERBOL	H.008-17	EXCEL AGRI	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Oignon : mauvaises herbes graminées et dicotylédones : 3 L/ha (COMM 27/12/22)
172	Pendimethaline	400 g/L	SC	Penda	16-010H.	DELTA AGRICOLE PLUS	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Oignon : mauvaises herbes graminées et dicotylédones : 3 L/ha
173	Pendimethaline	400 g/L	EC	TERAPUR	H.002-16	Ets MEZGHANI	IndustrialQuimica Key	Pomme de terre : Adventices Dicot. ANNUELLES UNIQUEMENT) : 3 L/ha
174	Pendimethaline	455 g/L	EC	Stomp Aqua	H.048-11/21	STIMA	BASF	Tomate transplantée : Dicotylédone et graminées : 3 L/ha avant repiquage, irriguer après application et transplanter les tomates 48 heures après Ail, maïs :Dicotylédone et graminées :3 L/ha post semis, prélevée.
175	Pendimethaline	455 g/L	EC	prowl aqua EC	H.15-21	cotugrain	BASF	Tomate transplantée : Dicotylédone et graminées : 3 L/ha avant repiquage, irriguer après application et transplanter les tomates 48 heures après Ail, maïs :Dicotylédone et graminées :3 L/ha post semis, prélevée.(COMM09/02/2021)
176	Pendimethaline +Clomazon	333g/l+30 g/l	CS	STALLION	H.07-21	AGRIPROTEC	FMC	Féverole: Graminées et dicotylédones annuelles :2.5 l/ha -traitement en post semis/pré-émergence(COMM09/02/21)
177	Phenmedipham + Desmedipham +Ethofumesate	75 g/l+15 g/l+115 g/l	SC	BETASANA TRIO	H.016-20	AGRIPROTEC	UPL Limited	Betteraves à sucre: Mauvaises herbes dicotylédones :2.5 L/ha;Traitement foliaire en post émergence;nbre de trait. :1;calendrier des applications : ultime stade d'intervention : stade BBCH 18 (stade 8 feuilles étalées).(COMM13/02/2020)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
178	Phenmedipham + Desmedipham + Ethofumesate	91 g/L +71 g/L + 112 g/L	EC	Betanal Expert 274EC	H.049-11/21	SEPCM	BAYER CROPSCIENCE	Betterave : Toutes les mauvaises herbes au stade 3 feuilles et au poste levée de laculture : 4 L/ha (fractionnées en 2 applications de 2 L/ha espacées de 14 jours)
179	Pinoxaden +Florasulam +Safener (cloquintocet-mexyl)	45 g/l + 5 g/l +11.25 g/l	EC	Navigator	H.005-14/24	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Blé tendre, orge : Graminées + dicotylédones : 1 l/ha (stade 2-3 feuilles jusqu'au stade dernière feuille pointante) (COMM09/02/21) (comm22mai2024) Blé dur : Adventices graminées et dicotylédones : 1L/ha Volume de bouillie:200-400 stade d'application: post-émergence BBCH 21à BBCH 29 Nbre d'app:1 Le produit a montré une bonne efficacité sur : Brome, chient dent Une efficacité moyenne sur : Folle avoine, orge Une faible efficacité sur :Ray grass (Comm 16/07/2025)
180	Pinoxaden + Florasulam + Fluroxypyr-meptyl+ Cloquintocet-mexyl (Safner)	30 g/L + 1.75 g/L + 75 g/l + 7.5 g/l	EC	BAGIERA EC	H.25-25	SOLAGRI	SYNGENTA	Blé dur : Mauvaise Herbes monocotylédones et dicotylédones : 1.5L/Ha (1 seule Application : Foliaire - Stade: post-émergence) Le produit a montré une bonne efficacité sur : Brome, chient dent Une efficacité moyenne sur : Folle avoine, orge Une faible efficacité sur :Ray grass (Comm 16/07/2025)
181	Pinoxaden +Clodinafop-propargyl+Cloquintocet-mexyl	25g/l +25g/l +6.25 g/l	EC	Traxos pratic	H.014-15/25	BIOPROTECTION	Syngenta	Blé dur, Blé tendre : adventices Graminées annuelles (Ray-gras et folle avoine) au stade début tallage-fin tallage de la culture : 1 l/ha(COMM 25 JUIN 2025)
182	Pinoxaden +Clodinafop-propargyl+Florasulam+cloquintocet-mexyl	30g/l +30g/l +7,5 g/l+7,5 g/l	EC	Swipe	H.013-15/25	BIOPROTECTON	Syngenta	Blé dur : Adventices graminées et dicotylédones (en post levée-tallage) :1 l/ha (COMM09/02/21) Blé tendre :Adventices graminées et dicotylédones: 1 l/ha: début –fin tallage. (COMM 08/06/22) (COMM 25 JUIN 2025)
183	Pinoxaden +Cloquintocet-méxyl	50 g/l +12.5 g/l	EC	Axial pratic	H.015-15/25	BIOPROTECTION	Syngenta	Orge, Blé tendre : Adventices graminées au stade début tallage-fin tallage de la culture : 0.8 l/ha(COMM 25 JUIN 2025)
184	Pinoxaden +Florasulam	4.5% + 0.5%	EC	FLOZAME EC	H.16-25	FERTITECH	SHARDA CROPCHAM LIMITED INDE	Blé dur : anti-graminées+anti-1dicotylédones :1 l/ha (400 l/ha) -stade d'application:BBCH 32 Le produit a montré une bonne efficacité sur :

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								Chardon, fumeterre, melilot,malva spp, gaillet, liseron, renouee, mourron, souci des champs ,silène de Tunisie ,capselle bourse de pasteur Une efficacité moyenne sur :Amaranthe, ravenelle, sinapis, stellaire, papaver Matricaire, chrysanthme Une efficacité faible sur :Ray grass, Une efficacité moyenne sur : chient dent, folle avoine, phalaris (Comm 16/07/2025)
185	prometryn	500 g/l	SC	gesagard 500 FW	H.06-21	bioprotection	syngentacrop protection	Féverole :Adventices dicotylédones et graminées :3 l/ha En post semis pré-levée(COMM09/02/21)
186	Propaquizafop	10%	EC	PRODIGE	H.024-22	FERTITECH	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	COLZA : Adventices graminées annuelles (post levée)(ray grass): l/ha Utiliser 1 litre d'huile adjuvante d'origine végétale systématiquement stade d'application: 1 application /an en post levée de la culture et des adventices -ne pas dépasser stade BBCH 20 des adventices(COMM 27/12/22) (comm 25 juin 2025)
187	Propaquizafop	10%	EC	KIFEN EC	H.01-23	SANABEL AGRO	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	COLZA : Adventices graminées annuelles (post levée)(ray grass): l/ha Utiliser 1 litre d'huile adjuvante d'origine végétale systématiquement stade d'application: 1 application /an en post levée de la culture et des adventices -ne pas dépasser stade BBCH 20 des adventices(COMM 27/12/22)(COMM28 dec 2023)
188	Propyzamide	400g/l	SC	PROPYZ	H.013-18	AGRIPROTEC	BARCLAY CHEMICALS Ltd	Féveroles : Mauvaises herbes dicotylédones : 2l/ha.(COMM 18/10/2018)
189	Propyzamide	400g/l	SC	PROPER FLO SC	H.005-18	AGROSYSTEMES	Globachem	Colza : Graminées : 1.875 l/ha (Post levée)(Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes graminées "Ray-grass résistant; Folle avoine".(COMM 18/10/2018)
190	Propyzamide	400g/l	SC	CADDY SC	H.016-17	RAYEN PHYTAGRI	BARCLAY CHEMICALS Ltd	Féveroles : Mauvaises herbes dicotylédones : 2l/ha. (COMM 18/10/2017) Colza : Mauvaises herbes graminées et dicotylédones:2 l/ha

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								-Stade d'application :4-6 feuilles (4 feuilles vraies,5 ème et 6 ème naissantes) -Stade adventices : soit en prélevée des adventices afin d'empêcher leur levée, soit en post levée à un stade jeune afin de bloquer leur croissance. Les graminées ne doivent en aucun cas dépasser le stade fin tallage. -Conditions pédoclimatiques : la meilleure efficacité est obtenue lors d'applications avec des conditions météorologiques fraîches et des sols humides.(COMM13//02/2020)
191	Prosulfocarb	80%	EC	PROXER	H.09-21	AGRIMED DISTRIBUTION	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Blé dur d'hiver :Adventices monocotylédones:4 l/ha en prélevé (300l/ha) -en post levée précoce -1 application(COMM09/02/21) (COMM28 dec 2023)
192	Prosulfocarb	80%	EC	ROXANE EC	H.036-22	COTUGRAIN	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Blé dur d'hiver :Adventices monocotylédones:4 l/ha en prélevé (300l/ha) -en post levée précoce -1 application(COMM27/12/22)
193	Prosulfocarb	800 g/L	EC	Roxy	H.052-11/21	AGROSYSTEMES	GLOBACHEM	Blés : Graminées : 4 l/ha
194	Prosulfocarb	800 g/L	EC	Fidox 800 EC	H.024-15/25	AMINCO	GLOBACHEM	Blés : Graminées : 4 l/ha(comm 25 juin 2025)
195	Prosulfocarb	800 g/L	EC	Boxer	H.053-11/21	BIOPROTECTION	SYNGENTA	Blés : Graminées : 4 l/ha
196	Pyraflufen-ethyl	26,5 g/l	EC	VOLCAN EC	H.014-22	ATLAS AGRICOLE	SPICAM INAGRA SA	Agrumes :Mauvaisesherbesdicotylédonesannuelles:0.3 5l/ha volume de bouillie:250- 300 l/ha Application entre les lignes sans toucher la culture Nbre d'applications:1 app/an COMM 08/06/22
197	Pyroxasulfone	85 %	WG	YAMATO 85 WG	H.027-22	AGRIMATCO	Kumaichemicalindustry	Blé tendre : Mauvaises herbes graminées sauf ray grass résistant :125 g/ha Volume de bouillie:300 l/ha Pulvérisation sur lit de semis bien préparé en post semis et prélevée de la culture et des mauvaises herbes -1 application (COMM 27/12/22)
198	Pyroxulam	46,6 g/L	OD	PRIORITY	H.016-18	ATLAS AGRICOLE	DOW AGROSCIENCES/ cortevea	Blés : Brome : 0,5 L/ha + 0,1 L d'adjuvant « Liberate » (au stade 2 à 3 feuille à fin tallage). (COMM 18/10/2018)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
199	Pyroxsulam	46,6 g/L	OD	Pallas 45 OD	H.054-11/21	SEPCM	DOW AGROSCIENCES	Blés : Brome : 0,5 L/ha + 0,1 L d'adjuvant « Libérate » (au stade 2 à 3 feuille à fin tallage).
200	Pyroxsulam + Florasulam + Cloquintocetmexyl	70,8 g/kg + 14,2g/kg + 70,8g/hg	WG	Broadway	H.014-18	agriprotec	DOW AGROSCIENCES/ CORTEVA	Blés : Dicotylédones + graminées : 320 g/ha (avec une bouillie de 200-300l/ha) en post levée.(COMM18/10/2018)(COMM09/02/21)
201	Simazine	500 g/L	SC	SIMAKEY	H.091-11/21	Ets MEZGHANI	INDUSTRIAL QUIMICA KEY/ Espagne	Légumineuses : mauvaises herbes : 1,5 L/ha
202	Terbuthylazine	750g/kg	WG	TERBYNE 75 WG	H.017-20	EL KHADRA	SIPCAM INAGRA	Agrumes : Mauvaises herbes annuelles (Graminées et Dicotylédones)(prélevée ou post levée précoce : 1.3 kg /ha (COMM13/02/2020)
203	Thifensulfuron-methyl + Tribuneron-methyl	40 % + 15 %	WG	Gipsy	H. 003-14/24	EL MOUSSEM	ROTAM AGROCHEMICA L	Blés : Dicotylédones : 60 g/ha (COMM 28/12/2023)
204	Trebuniron-methyl + Florasulame	250g/l+104g/kg	SG	FLAME DUO SG	H.006-22	SOLAGRI	ALBAUGH	Blé :Mauvaises herbes dicotylédones :60 g/ha volume de bouillie: 300-400 l/ha -application foliaire après apparition des mauvaises herbes -nbre d'application:1 -appliquer les stades BBCH 23-39, stade jeunes des mauvaises herbes. (COMM 08/06/22)
205	Triallate	450 g/l	CS	AVADEx FACTOR CS	H.025-22	ATLAS AGRICOLE	GOWAN CROP PROTECTION LIMITED	Blé dur : Mauvaises herbes graminées en post semis prélevée : ray grass résistant :3.6 l/ha -Appliquer sur sol humide en prélevée des céréales et avant émergence des mauvaises herbes -semences du blé doivent être à 4 cm de profondeur -éviter l'application en conditions de sécheresse -1 application/an(com 27/12/22)
206	Tribenuron methyl + Florasulam	56.3 % + 18.7 %	WG	BOMBA WG	H.011-18	EL KHADRA	JSC(AVGUST)	Blé dur : Dicotylédones : 20 g/ha (300 à 400 l de bouillie/ha);(COMM 18/10/2018)
207	Tribenuron methyl + Florasulam	56.3 % + 18.7 %	WG	TRIFLOS	H.15-25	NEGANOR FFT	JSC(AVGUST)	Blé dur : Dicotylédones : 20 g/ha (300 à 400 l de bouillie/ha);(COMM 16/07/2025)
208	Tribenuron-Methyl	75%	WG	TOSCANA	H.010-18	AGRIPROTEC	PROPLAN/QUEMICA AGRICULTURAL SOLUTIONS SPAIN SLU	Blé dur : Dicotylédones : 30 g/ha (200 L/ha) en Post levée; Traitement foliaire; nbre de trait. :1). Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes "Liseron";(COMM 18/10/2018)
209	Tribenuron-Methyl	75%	WG	SKYLLA WDG	H.012-18	AGRONOMIC LAND	ROTAM AGROCHEMICA	Blé dur : Dicotylédones : 12.5 g/ha en Post levée; Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
							L CO.LTD	"Liseron";(COMM 18/10/2018)
210	Tribenuron-Methyl	75%	WG	Volteo 75 WG	16-008H.	EL KHADRA	INDUSTRIAS AFRAZA/ALBAU GH EUROPE SARL	Blé dur : Dicotylédones : 20 g/ha en post levée (NB/Indiquer sur l'étiquette : <u>Faible action surmoutarde et ravenelle</u>)
211	Tribenuron-Methyl	75%	WG	LUXOR	H.020-18	SANABEL AGRO	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Blé dur : Dicotylédones : 25 g/ha (300 L de bouillie/ha). En Post levée;Traitement foliaire). Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes"Liseron". (COMM 18/10/2018)
212	Tribenuron-Methyl	75%	WG	TRYBERON 75 WG	H.02-24	AGRIMED DISTRIBUTION	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Blé dur : Dicotylédones : 25 g/ha (300 L de bouillie/ha). En Post levée;Traitement foliaire). Avec faible efficacité sur les mauvaises herbes"Liseron". (COMM 22/05/2024)
213	Tribenuron-Methyl	75%	WG	Granstar	H.057-11/21	SEPCM	DU PONT	Céréales : Dicotylédones : 25 g/ha
214	Tribenuron-Methyl	75%	WG	Corida 75 WG	H.088-11/21	SOCOOPEC	AGRIA	Céréales : Dicotylédones : 25 g/ha
215	Tribenuron-Methyl	75%	WG	TRIBUNEO 75 G	H.015-20	SSCC	AGRIA	Céréales : Dicotylédones : 25 g/ha;(COMM13/02/2020)
216	Tribenuron-methyl	500g/kg	SG	FLAME 50 SG	H.10-25	EL BARAKA AGRICOLE	ALBAUGH EUROPE	Blé dur :Désherbage Dicotylédones : 40g/ha Volume de Bouillie : 200-400 L Stade d'application: BBCH13-39 -nbre d'application:1 DAR:120 jours Le produit a montré une bonne efficacité sur : Chardon, fumeterre, melilot, malva spp, gaillet, liseron, renouee, mourron, souci des champs , silène de Tunisie ,capselle bourse de pasteur Une efficacité moyenne sur : Amaranthe, ravenelle, sinapis, stellaire, Une faible efficacité sur : Papaver, Matricaire, chrysanthme (Comm 16/07/2025)
217	Trifluraline	480 g/L	EC	Herbaline	H.058-11/21	SEPCM	AAKO	Tournesol, Légumineuses : M.Herbes : 2 L/ha
218	Trifluraline	480 g/L	EC	RALINE 480 EC	H.021-22	EL KHADRA	JIANGSU FENGSHAN GROUP CO,LTD	Petit pois : Graminées:2 l/ha ;Appliqué 1 à 4 semaines avant le semis (COMM13/02/2020) ; COMM08/06/22)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
							(FAB)/NANJING FENGSHAN CHEMICAL(FOURNISSEUR)	
219	Trifluraline	480 g/L	EC	HERBASTAR EC	H.011-20	AGRIPLUS	JIANGSU FENGSHAN GROUP CO,LTD (FAB)/NANJING FENGSHAN CHEMICAL(FOURNISSEUR)	Petit pois: Graminées:2 l/ha ;Appliqué 1 à 4 semaines avant le semis (COMM13/02/2020)
220	Trifluraline	480 g/L	EC	Flural	H.092-11/21	Ets MEZGHANI	INDUSTRIAL Q. KEY	Tournesol, Légumineuses : M.Herbes : 2 L/ha
221	Trifluraline	480 g/L	EC	Ridaline	H.082-11/21	SEPCM	DOW AGROSCIENCES	Tournesol, Légumineuses : M.Herbes : 2 L/ha
222	Trifluraline	480 g/L	EC	Triflex	H.006-17	ATLAS AGRICOLE	AAKO	Tournesol, Légumineuses : M.Herbes : 2 L/ha (COMM 25 juin2025)
223	Triflurosulfuron methyl	500 g/kg	WG	SAFARI 50 WG	H.002-22	SEPCM	FMC	Betterave à sucre: Adventices dicotylédones annuels:30 g/ha -post levée(70 à 90% de plantes levées) -volume de bouillie:100-300 l/ha -02 applications espacées de 7à15 jours -stade de la culture: après la levée (70à90% de plantes levées à la fermeture des rangs) -SAFARI est peu sélectif de la betterave à sucre en prélevée. -Stade des adventices: traiter sur des adventices jeunes de la levée à 3 feuilles) -DAR:90 jours (COMM 08/06/22)

IV. DIVERS

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
01	(E,Z,Z)-3,8,11Tetradecatien 1-y acetate (E,Z)-3,8Tetradecatien1- y acetate	0.5 mg /unité		PHERODIS Tutaabsoluta	D.007-16	NUTRIPLANT	KOPPERT	Tomate : Tutaabsoluta : 30 pièges/ha
02	4-methyl-5-nonanol et 4-methyl-5-nonanone			Ferrolure +(pheromone)	D.002-22	BIOPROTECTION	Chemitica international	Palmier ornemental(Phoenix canariensis): Charançon rouge des palmiers rhynchophorusferrugineus:

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								700 mg par sachet et par piège (10 piège/ha)(30-50 mètre) -stade d'application:adulte -type attractif -nbre max d'application:3-6/an selon l(infestation -accrocher sous le couvercle du piège en association avec le kairomone"WEEVIL MAGNET" lespieges sont placés à l'ombre, distants de 2m du tronc de palmiers et éloignés les uns des autres de 30 à 50 metres. -le piège doit être contenir de l'eau+pate de date DAR:0 jours(COMM 08/06/22)
03	Acetate d'ammonium + TrimethylamineHCl +1,4-diaminobutane (Putrescine) +DDVP	75%+8.2%+0.29%+20%(w/w)	-	MERCERATITE KEY	D.006-16	Ets MEZGHANI	Key	Agrumes :Cératites:40 pièges/ha
04	Acétate d'ammonium min 8.75 g/sachet +Trimethylaminehydrochloride 1.25 g/sachet + diaminubutane 0.04 g/sachet +KILLDISC insecticide à base d'Esfenvalerate 0.04 g/piège			PherosanCeratitis	D.004-17	NUTRIPLANT	SANSAN PRODESING/	Agrumes : Cératite: 40 pièges/ha Installation des pièges bien avant le début de la véraison des fruits au coté Sud-Est de l'arbre à une hauteur de 1.5 -2m. Durée de l'action : 120j;(COMM22mai2024).
05	Acide Beta indolbutirique	4 g/l	SL	Exuberone	D.005-11/21	SEPCM		Pépinières fruitières, forestières et ornementales : Substance phytosanitaire : 2,5 à 100 cc/L; Bouturage de la vigne : Traitement. Phytosanitaires contre la transmission des maladies du sol : Trempage prolongé 24 H dans la bouillie: 1 l/25 l
06	Acide chloro 4 phénoxyacétique +Naphoxy 2acétamide	0,75g/L+2,5 g/L	SL	Procarpil	D.013-11/21	SEPCM	CMPA	Tomate s/serres et la 1 ère grappe florale en culture en plein air :Trait. Phytohormoné : 5 cc/L -Tomate plein champs sauf traitement de la 1 ère grappe florale : 10 cc/L
07	Acide gibberellique	10%	TB	Gibb 3	D.001-11/21	AGROSYSTEMES	GLOBACHEM	Pêcher : Modification de niveau de nouaison P. de terre : Processus de tubérisation Vigne : Croissance des organes aériens Artichaut : Processus de floraison Clémentine, poirier ,pois : Processus

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								de floraison et régulation de la maturation :1g/hl de Gibbérelline
08	Acide gibberellique	10%	TB	Aminogibb	D.008-15/25	AMINCO	GLOBACHEM	Pêcher : Modification de niveau de nouaison P. de terre : Processus de tubérisation Vigne : Croissance des organes aériens Artichaut : Processus de floraison Clémentine, poirier ,pois : Processus de floraison et régulation de la maturation :1g/hl de Gibbérelline)(comm25 juin 2025)
09	Acide gibberellique	40%	SG	progibb 40 SG	D.004-13/23	BIOPROTECTION	VALENTBioscience / SUMITOMO	Vigne : Amélioration du taux de nouaison et de la qualité des fruits : 1 sachet de 1g de SA/hl (COMM 19 avril 2023)
10	Acide gibberellique	20%	ST	Fitogib	D.03-21	BIOPROTECTION	NUFARM	Agrumes : Activation du processus et amélioration de la nouaison : 01comprimé/hl (COMM09/02/21) (COMM 08/06/22)
11	Acide gibberellique	20%	ST	GIB GRO	D.005-16	BIOPROTECTION	NUFARM	Agrumes : Activation du processus et amélioration de la nouaison : 1comprimé/hl
12	Acide gibberellique	9%	ST	Giberkey	D.001-15/25	ETS MEZGHANNI	IndustrialQuimica Key	Agrumes : Processus de floraison et régulation de la maturation : 1 TS/120 L d'eau)(comm25 juin 2025)
13	Acide gibberellique	10%	TB	Protagibb	D.029-11/21	PROTAGRI	United Phosphorus	Pêcher : Modification de niveau de nouaison P. de terre : Processus de tubérisation Vigne : Croissance des organes aériens Artichaut : Processus de floraison Clémentine, poirier ,pois : Processus de floraison et régulation de la maturation :1g/hl de Gibbérelline
14	Acide gibberellique	40%	SG	Berelex 40 SG	D.003-15/25	SEPCM	CHEMICAL Agro Europe	Vigne : Amélioration du taux de nouaison et de la qualité des fruits : 1 sachet de 1g de SA/hl)(comm25 juin 2025)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
15	Acide gibberellique	135.6 g/l	SL	X-PAND SL	D.03-25	NUTRIPLANT	STOLLER EUROPE /ESPAGNE	Vigne : Régulateur de croissance : 150 cc/ha A la floraison 1-2 applications (Comm 16/07/2025)
16	Acide gibbérellique +phenothiol	0.5%+1%	EC	FENGIB MAX EC	D.002-20	promochimie	SIPCAM INAGRA S.A	Agrumes: Régulateur de croissance :100 cc/hl ;-Répéter le traitement 10j après le premier (COMM13/02/2020)(COMM09/02/2021)
17	Acide gibbérellique +phenothiol	0.5%+1%	EC	FENGIB EC	D.001-19	INNOVA	SIPCAM INAGRA S.A	Agrumes: Régulateur de croissance :100 cc/hl ;-Répéter le traitement 10j après le premier(COMM23/04/2019)
18	Alkylphenolexy-Ethylène	200 g/L	SC	Etaldyne 95	D.014-11/21	SEPCM	CMPA/Espagne	Mouillant parafinique adhesif: 50 cc/hl
19	Alpha naphtylacetic +alpha naphtylacetamide	6.75 g/l + 18 g/l	ST	Tonifruit ST	D.04-25	SANABEL AGRO	NUFARM	Melon : Amélioration de la nouaison : 0.4 l/ha pulvérisation foliaire Volume de bouillie 600 l/ha Tomate : Amélioration de la nouaison : 0.4 l/ha pulvérisation foliaire Volume de bouillie 600 l/ha (Comm 16/07/2025)
20	Chlormequat-chlorure	750 g/l	SL	Stabilan750	D.034-11/21	AGRIPROTEC	NUFARM	Céréales (variétés de longue paille, ex Nacer) : Raccourcisseur de la paille (limitation de la croissance de la tige) à la dose de 1,2 L/ha
21	Chlormequat-chlorure	750 g/l	SL	Cekwat 750	D.001-13/23	BIOPROTECTION	NUFARM	Céréales (variétés de longue paille, ex Nacer) : Raccourcisseur de la paille (limitation de la croissance de la tige) à la dose de 1,2 L/ha (COMM 19 avril 2023)
22	Chlorprophame	1%	PP	NEO STOP	D.028-11/21	PROTAGRI	AGRIPHAR	P. de terre : Antigerme : 1Kg/Tonne
23	Chlorprophame	500 g/L	HN	Neostop 500 HN	D.016-11/21	PROTAGRI	AGRIPHAR	P. de terre de consevation : Inhibiteur de germination :36 ml/T 2 à 3 fois
24	Cyanamide d'hydrogène	520 g/L	SL	Dormex	D.018-11/21	BIOPROTECTION	DEGUSSA AG/ ARYSTA LifeScience/ALZ-CHEM	Vigne : Régulateur de débourrement : 4 L/hl (400 à 500 L de bouillie/ha) Pêcher : Régulateur de débourrement : 2,5 L/hl 35 à 40 jours avant le débourrement

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
								naturel (700 à 1000 L de bouillie/ha) Pommier : Régulateur de débourrement : 2,5 L/hl 40 à 60 jours avant le débourrement naturel (700 à 1000 L de bouillie/ha)
25	Deltametrine+Acetate d'ammonium+Triméthylamine HCl+1,4diaminobutane (=Putrescine)	10 mg/ unité+(29.8 %) 6.45 g +(12.4 %)2.75 g +(0.2%)	-	Magnet Med	D.004-16	NUTRIPLANT	KOPPERT	Agrumes :Cératites: 50 pièges/ha. Pêcher de saison :Ceratite : Piégeage de masse en lutte intégrée : 70 pièges/ha
26	Dérivés d'acides gras végétaux +Huile de pin	286 g/l+430 g/l	EC	ACTILANDE TM EC	D.02-21	SEPCM	Action PIN	Blé dur : Adjuvant pour céréales:1l/ha -pulvérisation foliaire (COMM09/02/21)
27	Dichloroprop-p	25 g/L	EC	clementgros	D.04-21	SANABEL AGRO	NUFARM	Agrumes : amélioration de la récolte et du calibre : 100 cc/hl(COMM09/02/21)
28	Huile de colza	95%	EO	codacide EO	D.01-21	AGRIMATCO	Mirocide Ltd	Courgette :Adjuvant : 1 l/ha Par pulvérisation(COMM09/02/21)
29	Huile non ionique	92%	EC	GARAL EC	D.005-20	SOLAGRI	Syngenta	Mouillant : 50cc/hl(COMM13/02/2020)
30	hydrolysate de proteines	54 g/l	SL	DACUS TRAP SL	D.05-25	BIOPROTECTION	BIOIBERICA S.A.U/ESPAGNE	OLIVIER : Mouche d'olivier (<i>Bactrocera oleae</i>):70 pièges/ha:850 ml du produit/piège Piégeage de masse (Comm 16/07/2025)
31	Hydrolysate de Protéines	550 g/L	SL	CeraBait	D.035-11/21	EL MOUSSEM	EVIE MICHAAILIDES	Agrumes : Cératites à la dose de - 300 cc/hl du produit seul /ha - 200 cc/hl du produit + insecticide anti-cératites/ha Olivier :Dacus à la dose de - 300 cc/hl du produit seul /ha - 200 cc/hl du produit + insecticide homologué/ha Agrume : Cératite (<i>Ceratitiscapitata</i>) : 0,67 L/Ha par voie aérienne (ULV,ultra bas volume) DAR:0 jours (comm22 mai2024)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
32	Hydrolysate de Protéines+Borax	59 g/L+13/0 g/L	SC	Ceratrapp (en bouteilles ou/et en pièges jaunes)	D.033-11/21	BIOPROTECTION	BIOBERICA S.A	Agrumes : Cératites à la dose de 100 pièges ou bouteilles (0,6 L de produit /piège) à l'ha Pêcher : Cératites : 120 pièges ou bouteilles (0.6 L)/ha (comm23-10-2014)
33	Keromone 42.5 ml acetate d'ethyle			Weevil magnet (keromone)	D.003-22	BIOPROTECTION	Chemtica international	Palmier ornemental (Phoenix canariensis) : Charançon rouge des palmiers) (rhynchophorus ferrugineus:42.5 ml par sachet et par piège (10 piège/ha)(30-50 mètre) -stade d'application:adulte -type attractif -nbre max d'application:3-6/an selon l'infestation -accrocher sous le couvercle du piège en association avec le phéromoneomone"FERROLURE" lespièges sont placés à l'ombre, distants de 2m du tronc de palmiers et éloignés les uns des autres de 30 à 50 mètres. -le piège doit être contenir de l'eau+pâte de date DAR:0 jours(COMM 08/06/22)
34	Kinetin	0.4% P/V	SL	X-CYTE SL	D.02-25	NUTRIPLANT	STOLLER EUROPE	Tomate : Régulateur de croissance : 05 l/ha Application par pulvérisation foliaire, dès l'apparition des premières inflorescences (tous les 10-12 jours pour la tomate sous serre et 2 à 3 applications par saison pour la tomate plein champ avec max 1.5 l/saison) (Comm 16/07/2025)
35	Metaldehyde	3%	GR	ALDEM 3% GR	D.002-17	EXCEL AGRI	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Agrumes :Limace :7Kg/ha(COMM27 /12/22)
36	Metaldehyde	3%	GR	METAX	D.003-16	DELTA AGRICOLE PLUS	SHARDA CROP CHEM LIMITED INDE	Agrumes :Limace : 7Kg/ha
37	Metaldehyde	5%	GB	LIMAGRAM	D.001-20	EL KHADRA	SIPCAM INAGRA	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 Kg/ha (COMM13/02/2020)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
38	Metaldehyde	5%	GB	Metakey	D.006-11/21	ETS.MEZGHANI	INDUS QUIMICAKEY	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 Kg/ha
40	Metaldehyde	5%	GB	Metapro	D.030-11/21	PROTAGRI	United Phosphorus	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 Kg/ha
41	Metaldehyde	5%	GB	GHLALA	D.003-19	SANABEL AGRO	UPL	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 Kg/ha; COMM 23/04/2019
42	Metaldehyde	5%	GB	Antilimace granule	D.025-11/21	SEPCM	CEQUISA S.A/UPL	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 Kg/ha
43	Metaldehyde	5%	GB	Super meta	D.007-11/21	STEC	CEQUISA/PHOSPH ONIA, SL)/UPL	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 Kg/ha
44	Methaldehyde	5%	GR	LIMASTOP	D.002-19	COTUGRAIN	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 Kg/ha; Artichaut : Escargots et Limaces : 5 kg/ha; Agrumes : Escargots et Limaces : 5 kg/ha (COMM23/04/2019)
45	Methaldehyde	5%	GR	ESCARGOCHE	D.001-16	SOCOOPEC	SHARDA CROPChem LIMITED INDE	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 Kg/ha; Artichaut : Escargots et Limaces : 5 kg/ha; Agrumes : Escargots et Limaces : 5 kg/ha
46	<u>Phéromones appliquée pour la confision sexuelle de la pyrale des dattes(EctomyeloisCeratoniae):(Z,E)-7,9,11-Dodecatrienyl formate(90.80% pure) :2%(22.026 g/kg</u>			SPLAT-EC-O;sous réserve de bien préciser la dose par pied (arbre)	D.004-20	NUTRIPLANT	ISCA TECHNOLOGIES	Palmier dattier :Pyrale des dattes(EctomyeloisCeratoniae): 500 g/ha-A répéter toutes les 8 semaines (soit 3 fois/saison);- A appliquer manuellement ou via le pistolet calfeutreur;- Déposer le produit sur le tronc à une hauteur de 2 m du sol. (COMM13/02/2020)
47	<u>Phéromones de la pyrale des dattes(EctomyeloisCeratoniae):(Z,E)-7,9,11-Dodecatrienyl formate(90.80% pure) :1.594 g/kg</u>			ISCA LURE CAROB MOTH	D.003-20	NUTRIPLANT	ISCA TECHNOLOGIES	Palmier dattier :Pyrale des dattes(EctomyeloisCeratoniae):-2 à 4 pièges/ha pour le monitoring;-12 à 15 piège/ha pour le piégeage de masse;A utiliser dans les pièges type delta;- Renouveler les pièges toutes les 4 semaines(COMM13/02/2020)
48	Polyethermodifiedtrisiloxane + polyether	75%+25%	SL	BREAK THRU SL	D.001-22	ATLAS AGRICOLE	EVONIC	Adjuvant pour bouillies fongicides Cultures maraichères :200 ml/ha (COMM 08/06/22)

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
49	Polyoxyethylene amine	270 g/l	SL	PHYDEAL SL	D.003-17	FERTIPLANT	SDP/France	Céréales (Blés) : Adjuvant Mouillant : à ajouter à la bouillie des herbicides : 0.25 l/hl ou (0.75 l à 1l/ha pour une bouillie de 300-400 l/ha)(COMM 18/10/2017).
50	Proteines hydrolysées	360 g/L	SL	BIOBAIT	D.002-16	BIOPROTECTION	BIOIBIRICA	Agrumes :Mouche méditerranéenne des fruits (ceratitiscapitata) :1.25 L/hl (Voie terrestre) Olivier : Mouche de l'olivier:1.25 l/hl Voie terrestre : 1/2 litre de bouillie par arbre(com 27/12/22)
51	Proteines hydrolysées	360 g/L	SL	FLYRAL	D.01-25	AGRIPROTEC	BIOIBIRICA	Agrumes : Mouche méditerranéenne des fruits (ceratitiscapitata) :1.25 L/hl (Voie terrestre) Olivier : Mouche de l'olivier:1.25 l/hl Voie terrestre : 1/2 litre de bouillie par arbre (com 25/06/25)
52	Sodium lauryl ether sulfate (SLES)	276.5 g/l	SL	Biopower SL	D.005-17	ATLAS AGRICOLE	BAYER AG	Céréales (Blés) : Adjuvant mouillant : à ajouter à la bouillie des herbicides : 1/ha;(COMM 18/10/2018).

V. NEMATICIDES

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
01	Abamectine	20g/l	SC	TERVIGO 020 SC	IN.001-19	BIOPROTECTION	Syngenta Crop Protection AG	Tomate : Nématode "Meloidogynespp": 2 App au sol par saison (2*4 l/ha); Melon :Nématode "Meloidogynespp": 2 App au sol par saison (2*3 l/ha)Inervalle : (COMM 23/04/2019)
02	Fluazaindoline	500 g/l	SC	SALIBRO 500 SC	N.03-24	AGRIPROTEC	CORTEVA	Tomate sous serre :Nématode :2l/ha Mode d'application:goutte à goutte Volume de bouillie:3900 l Nbre d'app:1/cycle Application:1à 7 jour avant la transplantation(comm22/05/2024)comm25 juin 2025

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
03	Fluopyram	400 g/l	SC	VELUM PRIME 400 SC	IN.002-19	ATLAS AGRICOLE	BAYER AG	Pomme de terre,Tomate S/S: Nématodes "Meloidogynespp": 1.25 l/ha;-Fractionné en 02 app;-1ère app : 1 à 3 jours après tranplantation;-2ème app : après 14 jours;- Application goutte à goutte (COMM23/04/2019)(comm22/05/2024)
04	Garlicextract	1000 g/l		NEM guard SC	N.001-22	STIMA	Ecospraylimited	Tomate: Nématodes:4 l/ha -06 applications au max par cycle(24 l/ha) -intervalle min d'applicaton:10 jours -application en goutte à goutte ou autre système d'irrigation -Application avant repiquage / semis et après la plantation (COMM 08/06/22)
05	Oxamyl	10%	GR	Vydate GR	N.001-16	AGRIMATCO	DUPONT	Pomme de terre : Nématodes : 25 kg/ha
06	Oxamyl	10%	SL	OXYTANE	N.01-24	SHARDA CROPCEM LIMITED Tunisia	SHARDA CROPCEM LIMITED INDE	Tomate sous serre :Nematode :20 l/ha En ferti-irrigation avant la plantation (comm22/05/2024)
07	Oxamyl	10%	SL	RIVAGE	N.01-25	FERTITECH	SHARDA CROPCEM LIMITED INDE	Tomate sous serre :Nematode :20 l/ha En ferti-irrigation avant la plantation (comm 25/06/2025)
08	Oxamyl	240 g/l	SL	RETURN 24 SL	N.02-24	Sanabel Agro	ROTAM AGROCHEMICAL(rivale)	Tomate sous serre :Nématodes :6 l/ha Traitement du sol Application par goutte à goutte 01 application/cycle(comm22/05/2024)

VI. RATICIDES

N°	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	P.COMM	N°.H.	SOCIETE	FABRICANT	USAGE
01	Brodifacoum	0,005%	RB	Broditop	R.002-11/21	ETS MEZGHANI	ZAPI SPA	Rat, mulot et souris domestiques : selon infestation
02	Brodifacoum	0,005%	RB	Broditop wax block	R.006-11/21	ETS MEZGHANI	ZAPI SPA	Rat, mulot et souris domestiques : selon infestation
03	Brodifacoum	0,005%	RB	Klerat	R.001-11/21	AGRIPROTEC	SYNGENTA	Rat, mulot et souris domestiques : selon infestation
04	Brodifacoum	0,005%	RB	Raticide detia	R.005-11/21	STIMA	DETIA	Rat, mulot et souris domestiques : selon infestation
05	Difenacoum	0.005 %	RB	SOREXA PELLETS	D.001-17	AGRIPROTEC	BASF	Toutes cultures : Rongeurs: Selon infestation (COMM20/06/2017)