

Лекции по математическому анализу 4

МОДУЛЬ.

Андрей Тищенко

2023/2024

Лекция 12 апреля.

Сходимость функциональных рядов

$$f_n(x), \quad n \in \mathbb{N}, \quad x \in E \subseteq \mathbb{R}$$
$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$$

Определение: $f_n(x) \xrightarrow{E} f(x) \Leftrightarrow \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Пример: Закон больших чисел. $\eta_n(\omega) = \frac{\xi_1(\omega) + \dots + \xi_n(\omega)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} E\xi_1 = a$ почти наверное. $P\{\omega : \eta_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a\} = 1$

Вопрос: можно ли переставлять операторы $\lim_{n \rightarrow \infty}, \lim_{x \rightarrow x_0}, \frac{d}{dx}, \int dx$?

То есть $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} f_n(x) \stackrel{?}{=} \frac{d}{dx} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n(x) dx \stackrel{?}{=} \int \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx$$

Нет, нельзя.

Пример 1. $f_n(x) = x^n, \quad E = [0; 1], \quad x_0 = 1$


$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow 1-} x^n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \lim_{x \rightarrow 1-} \begin{pmatrix} 0, & x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{pmatrix} = 0$$

Теорема: $f_n(x)$ непрерывна в точке $x_0 \in E$ и $f_n(x) \xrightarrow{E} f(x)$, то $f(x)$ непрерывна в точке x_0

Пример 2. $f_n(x) = \frac{\sin nx}{n}$, $x \in \mathbb{R}$, $x_0 = 0$
 $f(x) \equiv 0$ $f'(0) = 0$
 $f'_n(x) = \frac{\cos nx}{n} \cdot n = \cos nx|_{n_0=0} \equiv 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$

Теорема: $f_n(x)$ непрерывна и дифференцируема на $[a; b]$
 $\exists c \in [a; b] : f_n(c)$ сходится
 $f'_n(x) \xrightarrow{[a; b]}$, тогда
 $f_n(x) \xrightarrow{[a; b]}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} f_n(x) = \frac{d}{dx} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$



Пример 3. $f_n(x) =$
 $\forall x \in [0; 1] f_n(x) \longrightarrow 0$
 $\int_0^1 f_n(x) dx = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$
 $\int_0^1 f(x) dx = 0 \neq 1$

Теорема: $f_n(x) \xrightarrow{[a; b]} f(x)$, то
 $\forall c \int_c^x f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_c^x f(t) dt$

Сходимость функциональных рядов


$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = S(x), x \in E$$

Ряд сходится равномерно:

$$\sup_{x \in E} \left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - S(x) \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(x) \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Теорема: (признак Вейерштрасса) если последовательность $u_n(x)$ мажорируется числовой последовательностью $a_n : \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in E |u_n(x)| \leq a_n$.

Тогда из сходимости $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ следует сходимость $u_n(x)$ на E .



Пример: $u_n(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} u_k(x) = f(x)$

$$\sup_{x \in [0; 1]} \left| f(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\sup_{x \in [0; 1]} |u_n(x)| = \frac{1}{n} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \text{ расходится.}$$

То есть мы имеем равномерную сходимость, но найти мажорирующую последовательность нельзя.

$$\text{Рассмотрим ряд } \sum_{n=1}^{+\infty} nx^{n-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} ? = \left(\sum_{n=1}^{+\infty} x^n \right)' = \left(\frac{x}{1-x} \right)'$$

Степенные ряды

$$\sum_{n=0}^{+\infty} C_n \cdot (x-a)^n \quad \sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n$$

Лемма. (Абеля)

1. $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n$ сходится при $x = x_1$, то $\forall x_0 : (|x_0| < |x_1|)$ ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n$ сходится

2. $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n$ расходится при $x = x_2$, то $\forall x_0 : (|x_0| > |x_2|)$ ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n$ расходится

$$C_n \cdot x_1^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \text{ограниченна} \Rightarrow \exists M \forall n |C_n \cdot x_1^n| < M$$

$$\text{Доказательство: } 1. \sum_{n=0}^{+\infty} |C_n \cdot x_0^n| = \sum_{n=0}^{+\infty} \left| C_n \cdot x_1^n \cdot \left(\frac{x_0}{x_1} \right)^n \right| \leq M \cdot \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} q^n}_{\text{сходится}} \Rightarrow \text{сходится}$$

абсолютно

2. Пусть сходится при $x = x_0 \Rightarrow$ п. 1 \Rightarrow сходится при $x = x_2 \Rightarrow \perp$

Вывод: Возможен один из трёх вариантов

- (a) $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n$ сходится $\forall x \in \mathbb{R}$
- (b) $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n$ сходится только при $x = 0$
- (c) $\exists R : \sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n$ сходится на $(-R; R)$ (множество сходимости),
а на $(-\infty, -R) \cup (R, +\infty)$ расходится. Это R называется
радиусом сходимости степенного ряда.

Теорема: $\forall r : 0 < r < R$ ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n$ сходится равномерно на $[-r, r]$

Доказательство: $\sup_{[-r; r]} \left| \sum_{k=0}^n C_k x^k - \sum_{k=1}^{+\infty} C_k x^k \right| = \sup_{[-r; r]} \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} C_k x^k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} |C_k r^k|$, так
как r находится в множестве сходимости, значит $\underbrace{\sum_{k=n+1}^{+\infty} C_k r^k}_{\text{числовой ряд}}$ сходится
абсолютно.

Утверждение: Если ряд $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ сходится и $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k x^k$ имеет радиус сходимости $R = 1$
и $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ существует, то $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.

Теорема: 1. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_n}{C_{n+1}} \right| = A$, то $R = A$
2. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|} = B$, то $R = \frac{1}{B}$

Доказательство: 1. $0 < A < +\infty$ $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n \cdot x^n$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1} x^{n+1}}{C_n x^n} \right| = |x| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| = |x| \frac{1}{A}$
 $|x| < A$ сходится по Даламберу
 $|x| > A$ расходится по Даламберу, значит $R = A$
2. $A = +\infty$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1} x^{n+1}}{C_n x^n} \right| = 0 \Rightarrow \forall x$ по Даламберу сходится
 $R = +\infty$
3. $A = 0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1} x^{n+1}}{C_n x^n} \right| = +\infty \Rightarrow \forall x \neq 0$ расходится.