

## Teil 1: Differentialgleichung im $\mathbb{R}$

---

an1: Der  $\mathbb{R}^n$  als normierter Vektorraum

Stichworte:  $\mathbb{R}^n$  mit Normen  $\|\cdot\|_\infty, \|\cdot\|_2$ , (Folgen)Konvergenz, GWSätze, Projektionen

---

Literatur: [Hoff], Kapitel 9.1


hier und im gesamten Skript steht [Hoff] für das Buch

Dieter Hoffmann: Analysis für Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieure,

Siehe auch die Literaturangaben auf der Website der Vorlesung zur [Analysis II](#) in diesem Buch finden Sie bestimmte Skript teile ausführlicher aufgeschrieben.

---

1.1. Bedingungsanleitung der Vorlesung "Analysis II" (wie schon in "Analysis I"):

- vor jedem Termin erscheint auf der Website Kurzfristig ein neues Kurz-Skriptteil zur nächsten Vorlesungssitzung. Sie können einen Vorab-Blick hineinwerfen.
  - Besuchen Die unbedingt die Vorlesungstermine! Das Skript wird dort ausführlich erklärt, erläutert, entwickelt und veranschaulicht. Der Stoff ist ohne den zugehörigen mündlichen Ergänzungen nicht zu erfassen.
  - Lesne Die zusätzlich ergänzende Literatur im Selbststudium, etwa die angegebene Literatur, was hier Häufig das Buch [Hoff] ist.
- Überlegen Sie selbstständig die angegebenen Übungsvorschläge, die mit dem Übungsmiley  markiert sind. Sprechen Sie mit anderen darüber.
- Besuchen Die regelmäßig das Tutotium/Ihre Übungsgruppe, um weitere Beispiele Kennenzulernen und fleißig zu üben. -Das Skript enthält einen Farbcode: Gelb für Notationen/Bezeichnungen, rot unterstrichen werden Begriffsdefinitionen und Namen wichtiger Sätze, blau unterstrichen werden Referenznummern und Zitierungen, werden Behauptungen/Sätze/Lemmas/Korollare, orange unterstrichen werden wesentliche Beweisideen.

In Analysis II geht es in erster Linie um die mehrdimensionale Analysis. Es wird davon ausgegangen, dass Sie die grundlegendsten Begriffe der Linearen Algebra I und Analysis I beherrschen oder parappet zur Veranstaltung "Analysis II" aneignen. Im Anhang dieses Kapitels finden Sie eine Kurzzusammenfassung der für uns wichtigsten Inhalte der LAI (andere werden bei Bedarf später dargestellt).

1.2Einleitung: wir stellen einige Arbeitsdefinitionen(insbesondere Normen) in

diesem Kapitel bereit, die als Grundlage für Funktionen, die von mehr als nur einer Variablen abhängen, dienen. Für Grenzwerte müssen wir "Abstände" zwischen Argumenten und Funktionswerten messen können, wofür Normen eingeführt werden. Viele Überlegungen der eindimensionalen Analysis können so fast wörtlich auf die mehrdimensionale Situation übertragen werden.

1.3 Vereinbarung: wir wollen Abbildungen von Teilmengen des  $\mathbb{R}^n$  in den  $\mathbb{R}^m$  betrachten,  $m, n \in \mathbb{N}$ .

Haben:

$$\{\mathbb{R}^m = \left( \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix}, \alpha_x \in \mathbb{R} \right\}, \text{ schreiben auch oft } (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \quad (1)$$

Zu  $\mathbb{R}^m \rightarrow x = (\xi_1, \dots, \xi_m)^T, y = (\eta_1, \dots, \eta_m)^T \in \mathbb{R}^m$  setze das (Standard-)Skalarprodukt  $\langle x, y \rangle := \langle x | y \rangle := \sum_{j=1}^m \xi_j \eta_j$ .

#### 1.4 Def

Für  $x = (\xi_1, \dots, \xi_m)^T \in \mathbb{R}^m$  sei  $\|x\| := \|x\|_\infty := \max\{|\xi_j| \mid j \in \{1, \dots, m\}\}$   
 $= \max_{1 \leq j \leq m} |\xi_j|$

1.5 Bem.:  $\|\cdot\|_\infty$  ist eine Norm im  $\mathbb{R}^m$ , d.h. die Maximumsnorm  $\|\cdot\|_\infty : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty[$  mit

$$(N1) x \neq 0 \Rightarrow \|x\|_\infty \neq 0 \quad (\text{definitheit})$$

$$(N2) \|\alpha x\|_\infty = |\alpha| \cdot \|x\|_\infty$$

$$(N3) \|x + y\|_\infty \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty \quad (\text{Dreiecksungleichung})$$

Für alle  $\alpha \in \mathbb{R}, x, y \in \mathbb{R}^m$ .

Bew.: im  $\|\cdot\| \subseteq [0, \infty[$  und (N1) ist an Def. 1.4 ablesbar. (N3): Für jedes  $j \in \{1, \dots, m\}$  ist  $|\xi_j + \eta_j| \leq |\xi_j| + |\eta_j| \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$ , also  $\|x + y\|_\infty \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$ . (N2):  $|\alpha \xi_j| = |\alpha| |\xi_j| \leq |\alpha| \cdot \|x\|_\infty$ , also  $\|\alpha x\|_\infty \leq |\alpha| \cdot \|x\|_\infty$ .

Damit ist  $\|x\|_\infty = (\text{ohne Einschränkung } \alpha \neq 0) \|\frac{1}{\alpha} \cdot \alpha x\|_\infty \leq \frac{1}{|\alpha|} \cdot \|\alpha x\|_\infty$ , also  $|\alpha| \cdot \|x\|_\infty \leq \|\alpha x\|_\infty$ . Mit  $\circledast$  folgt " $=$ ".  $\square$

Neben  $\|\cdot\|_\infty$  betrachtet man oft auch die "2-Norm" bzw Norm, die aus dem Standard-Skalarprodukt entsteht:

1.6 Def.: Für  $x = (\xi_1, \dots, \xi_m)^T \in \mathbb{R}^m$  sei  $\|x\|_2 := \langle x, x \rangle^{\frac{1}{2}} = \left( \sum_{j=1}^m |\xi_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left( \sum_{j=1}^m \xi_j^2 \right)^{\frac{1}{2}}$  die Norm/2-Norm/euklidische Norm.

Für  $x, y \in \mathbb{R}^m$  ist  $\|x - y\|_2 = \|y - x\|_2$  der euklidische Abstand zwischen  $x$  und  $y$ . Diese Definition für  $\|x\|_2$  als "Abstand" von  $x$  zu  $\sigma = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$  ist näher an der Anschauung als  $\|\cdot\|_\infty$ . Hingegen ist  $\|\cdot\|_\infty$  einfacher handzuhaben, wenn Gegebenheiten auf den eindimensionalen Fall zurückgeführt werden soll. wegen folgender Tatsache macht es für die Grenzwertbildung/Stetigkeit/Differenzierbarkeit keinen wesentlichen Unterschied, mit welcher der Normen  $\|\cdot\|_\infty$  oder  $\|\cdot\|_2$  gearbeitet wird:

1.7. Beh.: Für  $x \in \mathbb{R}^m$  ist  $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$ .

Bew: Für  $j \in 1, \dots, m$  gilt  $|\xi_j| = (|\xi_j|^2)^{\frac{1}{2}} \leq \left( \sum_{j=1}^m |\xi_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \|x\|_2$ , also  $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2$ .

• Weiter gilt  $\|x\|_2 = \left( \sum_{j=1}^m |\xi_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left( \sum_{j=1}^m \|x\|_\infty^2 \right)^{\frac{1}{2}} = (m \|x\|_\infty^2)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{m} \|x\|_\infty$ .  $\square$

Bem.: Es ist klar, dass aufgrund 1.7 auch  $\|\cdot\|_2$  eine Norm ist, d.h (N1) – (N3) gelten auch für  $\|\cdot\|_2$ .

1.8 Def.: KOnvergenz von Folgen: Sei  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^m$  eine Folge von Punkten  $x_n$  im  $\mathbb{R}^m$ . Denn Konvergiert  $(x_n)$  gegen  $n \in \mathbb{R}^m$ , NOtation:  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$  bzw.  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$ , falls  $\forall \epsilon > 0 \exists m_0 \in \mathbb{N} \forall k \geq m_0 : \|x_k - a\|_\infty < \epsilon$

1.9. Beh.: Die Aussage mit  $\|\cdot\|_2$  statt  $\|\cdot\|_\infty$  ist hierzu äquivalent.

Bew.: Gilt Konvergenz  $x_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} a$  bzgl.  $\|\cdot\|_\infty$ , so folgt

$\forall \epsilon > 0 \exists m_0 \forall k \geq m_0 :$