

# THỰC ĐƠN BỮA PHỤ

cho người tiểu đường

7 ngày dễ áp dụng • Ít đường huyết tăng vọt • Đơn giản cho gia đình Việt

**Tone xanh nước biển**

Dựa trên nguyên tắc kiểm soát khẩu phần, carb, chất xơ và đạm trong bữa phụ.

# Bữa phụ không phải là ăn vặt tùy hún

### 1 Khi nào nên ăn?

Khi khoảng cách giữa 2 bữa chính quá dài, dễ đói, dễ tụt đường, trước vận động hoặc đang dùng thuốc dễ gây hạ đường huyết.

### 2 Mức hợp lý

Khoảng 100-180 kcal, thường 10-20g carbohydrate, kèm đạm, chất béo tốt hoặc chất xơ để no lâu.

### 3 Không cần ăn nếu...

Bữa chính đã đủ no, ít vận động, đường huyết đang cao hoặc đang cần giảm cân nghiêm túc.

### 4 Quy tắc vàng

Ăn ít nhưng đúng: trái cây nguyên miếng, sữa không đường, hạt đúng lượng, đạm nạc và rau củ.

# 1 bữa phụ tốt = no lâu + ít vọt đường

### **CARB CHẬM + ĐẠM / CHẤT BÉO TỐT**

Ví dụ: ổi + trứng luộc, táo + hạnh nhân, sữa chua không đường + hạt chia.

#### ✓ **Trái cây ít ngọt**

Ổi, táo, bưởi, kiwi, dâu. Ăn nguyên quả, không ép nước.

#### ✓ **Sữa không đường**

Sữa chua không đường, sữa đậu nành không đường, sữa tươi ít béo không đường.

#### ✓ **Đạm nhẹ**

Trứng luộc, đậu phụ, ức gà xé, cá/tôm ít dầu.

#### ✓ **Chất béo tốt**

Hạnh nhân, óc chó, lạc rang không muối - dùng lượng nhỏ.



## 10 bữa phụ nên ưu tiên

**01** 1/2 quả ổi + 1 quả trứng luộc

**02** Sữa chua không đường + hạt chia

**03** Sữa đậu nành không đường 200ml

**04** Táo nhỏ + 5-8 hạt hạnh nhân

**05** Đậu phụ non hấp + hành lá

**06** Dưa chuột, cà chua bi + sốt sữa chua

**07** 1/2 quả bưởi ăn nguyên múi

**08** 1 lát bánh mì nguyên cám + trứng

**09** Khoai lang nhỏ 70-80g + đậm

**10** Rau củ luộc/chấm hummus hoặc sữa chua

## Những bữa phụ dễ làm đường tăng vọt

**! Nước ép / sinh tố ngọt**

Nước cam ép, nước mía, sinh tố thêm sữa đặc.

**! Đồ ngọt**

Bánh quy ngọt, bánh bông lan, chè, kẹo, kem.

**! Tinh bột nhanh**

Xôi, bánh mì trắng nhiều, cháo trắng, mì gói.

**! Trái cây quá ngọt**

Nhãn, vải, mít, xoài chín ăn nhiều, trái cây sấy.

**! Snack mặn**

Bim bim, khoai chiên, hạt rang muối ăn cả túi.

**! Đồ uống có đường**

Trà sữa, cà phê sữa đặc, nước ngọt, nước tăng lực.

## Thực đơn bữa phụ ngày 1

Ưu tiên: ít đường thêm • có chất xơ • có đậm nhẹ



### Sáng phụ

Sữa chua không đường 100g + 1 thìa cà phê hạt chia + 5 hạt hạnh nhân.

10-20g carb



### Chiều

1/2 quả ổi vừa + 1 quả trứng luộc.

10-20g carb



### Tối nếu đói

Dưa chuột/cà chua bi + 1 miếng đậu phụ non nhỏ.

ăn khi thật sự đói

## Thực đơn bữa phụ ngày 2

Ưu tiên: ít đường thêm • có chất xơ • có đậm nhẹ



### Sáng phụ

1/2 quả táo nhỏ + 1 thìa cà phê bơ đậu phộng không đường.

10-20g carb



### Chiều

Sữa đậu nành không đường 200ml + 5-6 hạt óc chó.

10-20g carb



### Tối nếu đói

1 quả trứng luộc hoặc 1 miếng phô mai ít béo nhỏ.

ăn khi thật sự đói

## Thực đơn bữa phụ ngày 3

Ưu tiên: ít đường thêm • có chất xơ • có đậm nhẹ



### Sáng phụ

1/2 quả bưởi hoặc 1 quả cam nhỏ, ăn nguyên múi.

10-20g carb



### Chiều

Edamame/đậu nành Nhật luộc 1/2 bát nhỏ hoặc đậu phụ hấp.

10-20g carb



### Tối nếu đói

Trà xanh không đường + vài lát dưa chuột.

ăn khi thật sự đói



## Thực đơn bữa phụ ngày 4

Ưu tiên: ít đường thêm • có chất xơ • có đậm nhẹ



### Sáng phụ

Sữa chua Hy Lạp không đường 100-150g + vài miếng táo/dâu.

10-20g carb



### Chiều

Mango salsa nhỏ: xoài 2-3 thìa + ớt chuông + chanh, ăn cùng dưa chuột.

10-20g carb



### Tối nếu đói

Sữa tươi không đường ít béo 150ml.

ăn khi thật sự đói

## Thực đơn bữa phụ ngày 5

Ưu tiên: ít đường thêm • có chất xơ • có đậm nhẹ



### Sáng phụ

1 quả kiwi nhỏ hoặc 1/2 quả táo + 1 miếng phô mai ít béo.

10-20g carb



### Chiều

Rau củ chấm sữa chua: dưa chuột, cà rốt, cần tây, ớt chuông.

10-20g carb



### Tối nếu đói

1 quả trứng luộc + trà không đường.

ăn khi thật sự đói

## Thực đơn bữa phụ ngày 6

Ưu tiên: ít đường thêm • có chất xơ • có đậm nhẹ



### Sáng phụ

1 lát bánh mì nguyên cám nhỏ + 1 thìa cà phê bơ đậu phộng không đường.

10-20g carb



### Chiều

1/2 quả thanh long nhỏ + 8-10 hạt hạnh nhân.

10-20g carb



### Tối nếu đói

Đậu phụ non 100g + xì dầu ít muối + hành lá.

ăn khi thật sự đói

## Thực đơn bữa phụ ngày 7

Ưu tiên: ít đường thêm • có chất xơ • có đậm nhẹ



### Sáng phụ

1/2 quả chuối nhỏ chưa quá chín + hạt chia hoặc vài hạt hạnh nhân.

10-20g carb



### Chiều

Sữa chua không đường 100g + 1 thìa yến mạch + bột quế.

10-20g carb



### Tối nếu đói

Cà chua bi + 1 quả trứng luộc hoặc 1 miếng đậu phụ.

ăn khi thật sự đói



### Chọn bữa phụ theo đường huyết

#### → Đường sau ăn hay cao

Chọn rất ít carb: trứng luộc, đậu phụ, dưa chuột, cà chua bi, rau củ chấm sữa chua.

#### → Hay hạ đường giữa buổi

Chọn 10-20g carb + đạm: táo + hạt, khoai lang nhỏ + trứng, bánh mì nguyên cám + trứng.

#### → Trước vận động

Chọn nhẹ: 1/2 chuối nhỏ, 1/2 củ khoai lang, sữa chua không đường + yến mạch.

#### → Bữa phụ tối

Chỉ ăn nếu cần: sữa không đường, đậu phụ, trứng luộc, sữa chua không đường.

## Ăn đúng là phải nhìn đường huyết đáp

### Cách tự kiểm tra

- ✓ Đo trước ăn và sau ăn 2 giờ trong vài ngày đầu.
- ✓ Nếu tăng cao: giảm 1/4 khẩu phần tinh bột ở bữa phụ.
- ✓ Nếu hay tụt đường: cần trao đổi bác sĩ, nhất là khi dùng insulin/thuốc hạ đường mạnh.

### Nhắc bệnh nhân dễ nhớ

**Bữa phụ tốt không phải là ăn nhiều hơn, mà là ăn đúng thời điểm, đúng lượng và đúng loại thực phẩm.**

### Lưu ý an toàn

Người có bệnh thận, gout, mỡ máu cao, tăng huyết áp, phụ nữ có thai, hoặc đang dùng insulin cần cá nhân hóa thực đơn với bác sĩ/dinh dưỡng.