



Chapitre IV – Les fonctions trigonométriques

Bacomathiques — <https://bacomathiqu.es>


TABLE DES MATIÈRES

I - Sinus et cosinus	1
1. Définition	1
2. Périodicité	2
3. Formules de trigonométrie	2
4. Résolution d'équations	4
5. Fonctions réciproques	4
II - Étude des fonctions trigonométriques	5
1. Dérivée	5
2. Signe et variations	5
3. Limite	6
4. Valeurs remarquables	6
5. Représentation graphique	7

I - Sinus et cosinus

1. Définition

Dans tout le cours, le plan sera muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Il sera également muni d'un cercle \mathcal{C} appelé **cercle trigonométrique** de centre O et de rayon 1 orienté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (c'est le **sens direct**) :



À RETENIR : COSINUS ET SINUS

Soit M un point quelconque situé sur le cercle \mathcal{C} faisant un angle x avec l'axe des abscisses. Les coordonnées de M sont :

- L'abscisse de M appelée **cosinus** est notée $\cos(x)$.
- L'ordonnée de M appelée **sinus** est notée $\sin(x)$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $-1 \leq \cos(x) \leq 1$ et $-1 \leq \sin(x) \leq 1$.

2. Périodicité

Les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période 2π .

À RETENIR : PÉRIODICITÉ

Ainsi pour tout x réel et k entier relatif :

- $\cos(x) = \cos(x + 2k\pi)$
- $\sin(x) = \sin(x + 2k\pi)$

À LIRE

Concrètement, cela signifie que $\cos(x) = \cos(x + 2\pi) = \cos(x + 4\pi) = \dots = \cos(x + 2k\pi)$ et idem pour $\sin(x)$.

3. Formules de trigonométrie


À RETENIR : FORMULES

On a les relations suivantes pour tout $x \in \mathbb{R}$:

- $\cos(-x) = \cos(x)$ (la fonction cosinus est **paire**)
- $\sin(-x) = -\sin(x)$ (la fonction sinus est **impaire**)
- $\cos(x + \pi) = -\cos(x)$
- $\sin(x + \pi) = -\sin(x)$
- $\cos(x - \pi) = -\cos(x)$
- $\sin(x - \pi) = \sin(x)$
- $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin(x)$
- $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos(x)$
- $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin(x)$
- $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos(x)$
- $\cos(x + y) = \cos(x) \times \cos(y) - \sin(x) \times \sin(y)$
- $\sin(x + y) = \sin(x) \times \cos(y) + \cos(x) \times \sin(y)$
- $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$

À LIRE : RETROUVER LES FORMULES 39

Il n'est aucunement demandé de mémoriser ces formules (sauf les trois dernières). Cependant, il doit être possible de les retrouver à l'aide du cercle trigonométrique. Ainsi, prenons l'exemple de $\cos(x + \pi)$:



On remarque que l'ordonnée reste la même (le sinus est le même). Cependant, on a bien une abscisse opposée. On a retrouvé la formule $\cos(x + \pi) = -\cos(x)$.

4. Résolution d'équations

Il est possible de résoudre des équations incluant des sinus et des cosinus.

À RETENIR : RÉOLUTION D'ÉQUATIONS

Soient x et y deux réels. On a les relations suivantes :

$$\begin{aligned} \text{— } \cos(x) = \cos(y) &\iff \text{il existe } k \in \mathbb{Z} \text{ tel que } \begin{cases} y = x + 2k\pi \\ \text{ou} \\ y = -x + 2k\pi \end{cases} \\ \text{— } \sin(x) = \sin(y) &\iff \text{il existe } k \in \mathbb{Z} \text{ tel que } \begin{cases} y = x + 2k\pi \\ \text{ou} \\ y = \pi - x + 2k\pi \end{cases} \end{aligned}$$

Comme précédemment, ces formules peuvent se retrouver à l'aide du cercle trigonométrique.

5. Fonctions réciproques

À RETENIR : DÉFINITION

Soient x et $y \in \mathbb{R}$, on admettra qu'il existe une **fonction réciproque** à \cos (notée \arccos) et une **fonction réciproque** à \sin (notée \arcsin). On a les relations suivantes pour tout $x \in [0; 2\pi]$ et $y \in [-1; 1]$:

$$\begin{aligned} \text{— } \cos(x) = y &\iff x = \arccos(y) \\ \text{— } \sin(x) = y &\iff x = \arcsin(y) \end{aligned}$$

Cela signifie qu'à tout $x \in [0; 2\pi]$, la fonction \arccos y associe son **antécédent** y par rapport à \cos (pareil pour \arcsin avec \sin).

À LIRE : EXEMPLE

$$\cos(0) = 1, \arccos(1) = 0 \text{ et } \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, \arcsin(1) = \frac{\pi}{2}.$$

Ces fonctions (accessibles depuis la calculatrice) peuvent également être utilisées pour résoudre certains types d'équations.

II - Étude des fonctions trigonométriques

1. Dérivée

À RETENIR : DÉRIVÉE D'UNE COMPOSÉE

Soit une fonction u dérivable sur un intervalle I , on a pour tout x appartenant à cet intervalle :

$$\text{— } \cos'(u(x)) = -u'(x) \sin(u(x))$$

$$\text{— } \sin'(u(x)) = u'(x) \cos(u(x))$$

À RETENIR : DÉRIVÉE

Ainsi, si pour tout $x \in I$ on a $u(x) = x$, on trouve :


$$\text{— } \cos'(x) = -\sin(x)$$

$$\text{— } \sin'(x) = \cos(x)$$

2. Signe et variations

L'étude du signe des dérivées des fonctions trigonométriques permet d'obtenir les variations de celles-ci. Nous allons donc voir le signe et les variations de ces fonctions.

À RETENIR : SIGNE ET VARIATION DE LA FONCTION COSINUS

x	$-\pi$		0		π
$x \mapsto \cos'(x)$	0	$+$	0	$-$	0
$x \mapsto \cos(x)$					

Veuillez noter que ce tableau est périodique de période 2π .

À RETENIR : SIGNE ET VARIATION DE LA FONCTION SINUS

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$x \mapsto \sin'(x)$	–	0	+	0
$x \mapsto \sin(x)$	0	–1	1	0

Ce tableau est également périodique de période 2π .

3. Limite

Les fonctions trigonométriques ont pour particularité de **ne pas admettre de limite** en $\pm\infty$. Ceci provenant du fait que ces fonctions sont périodiques et que leur valeur oscille entre -1 et 1 .

4. Valeurs remarquables


À RETENIR : VALEURS REMARQUABLES

Voici un tableau regroupant quelques valeurs remarquables de sinus et de cosinus :


Valeur de x (à $2k\pi$ près, $k \in \mathbb{Z}$)	Valeur de $\cos(x)$	Valeur de $\sin(x)$
0	1	0
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\frac{\pi}{2}$	0	1
$\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{5\pi}{6}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
π	-1	0

5. Représentation graphique

À l'aide de toutes les informations et valeurs données précédemment, il est possible d'établir une représentation graphique de la fonction cosinus :



De même pour la fonction sinus :



On remarque sur ces graphiques plusieurs propriétés données : parité, signe, périodicité, etc...