



Chapitre I - Les suites

Bacomathiques — <https://bacomathiqu.es>

Table des matières

I - Qu'est-ce-que qu'une suite ?	1
1. Définition	1
2. Suites arithmétiques	1
3. Suites géométriques	2
II - Étude des suites	4
1. Sens de variation	4
2. Limites	4
3. Opérations sur les limites	5
4. Majoration, minoration et bornes	6
5. Encadrement	6
III - Raisonement par récurrence	7

I - Qu'est-ce-que qu'une suite ?

1. Définition

On appelle **suite** une fonction (et plus précisément application) de \mathbb{N} dans \mathbb{R} : cette fonction va prendre des éléments d'un ensemble de départ \mathbb{N} et va les amener dans un ensemble d'arrivée \mathbb{R} .

Il y a plusieurs manières de définir une suite :

- **Par récurrence** : On donne le premier terme de la suite ainsi que le terme au rang $n + 1$.
- **Par son terme général** : On "explícite" la suite (comme pour les fonctions).

Exemple : On définit les suites u_n et v_n ainsi :

$$u_n = n \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

$$v_n : \begin{cases} v_0 = 0 \\ v_{n+1} = v_n + 1 \end{cases}.$$

On remarque que bien que définies différemment, u_n et v_n sont égales.

2. Suites arithmétiques

Une suite u_n est dite **arithmétique** si elle est de la forme :

$$u_{n+1} = u_n + r \text{ avec } r \in \mathbb{R}.$$

Le réel r est la **raison** de la suite (si $r > 0$, u_n est strictement croissante, si $r < 0$, u_n est strictement décroissante et si $r = 0$, u_n est constante). Toute suite arithmétique a pour terme général :

On note p le rang initial de la suite (celui à partir duquel la suite est définie) :

$$u_n = u_p + (n - p) \times r$$

Et si u_n est définie à partir du rang 0 (on a $p = 0$) :

$$u_n = u_0 + (n - 0) \times r = u_0 + n \times r$$

La somme des termes d'une suite arithmétique est donnée par la formule suivante (on note S cette somme) :

$$S = \frac{(\text{Premier terme} + \text{Dernier terme}) \times (\text{Nombre de termes})}{2}$$

Astuce : Pour trouver le nombre de termes, on prends le rang jusqu'auquel on souhaite calculer cette somme. On y soustrait l'indice du premier terme et on y ajoute 1.

Exemple : Soit une suite u_n définie par $u_n : \begin{cases} u_1 = 10 \\ u_{n+1} = u_n + 5 \end{cases}$ pour $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq 1$.

La raison r est égale à 5. Le premier terme est $u_1 = 10$ d'indice $p = 1$. Le terme général de cette suite est donc $u_n = u_1 + (n - 1) \times r$.

Par conséquent, on a : $u_n = 10 + (n - 1) \times 5$. On souhaite calculer la somme des termes de cette suite jusqu'au rang n .

Par l'astuce précédente, il y a $n - 1 + p = n$ termes. On peut calculer la somme S :

$$S = \frac{(u_1 + u_n) \times (n)}{2} = \frac{(20 + (n - 1) \times 5) \times (n)}{2} = \frac{5n^2 + 15n}{2}.$$

3. Suites géométriques

Une suite v_n est dite **géométrique** si elle est de la forme :

$$v_{n+1} = v_n \times q \text{ avec } q \in \mathbb{R}.$$

Le réel q est la **raison** de la suite (si $q > 1$, v_n est strictement croissante, si $0 < q < 1$, v_n est strictement décroissante et si $q = 1$ ou 0 , v_n est constante).

Toute suite géométrique a pour terme général :

On note p le rang initial de la suite (celui à partir duquel la suite est définie) :

$$v_n = u_p \times q^{n-p}$$

Et si v_n est définie à partir du rang 0 (on a $p = 0$) :

$$v_n = u_0 \times q^{n-0} = u_0 \times q^n$$

La somme des termes d'une suite géométrique est donnée par la formule suivante (on note S cette somme) :

$$S = (\text{Premier terme}) \times \frac{1-q^{\text{Nombre de termes}}}{1-q}$$

Astuce : Pour trouver le nombre de termes, on prends le rang jusqu'auquel on souhaite calculer cette somme.

On y soustrait l'indice du premier terme et on y ajoute 1.

Exemple : Soit une suite v_n définie par $v_n : \begin{cases} v_2 = 1 \\ v_{n+1} = v_n \times 2 \end{cases}$ pour $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq 2$.

La raison q est égale à 2. Le premier terme est $v_2 = 1$ d'indice $p = 2$. Le terme général de cette suite est donc $v_n = v_2 \times q^{n-2}$.

Par conséquent, on a : $v_n = 2^{n-2}$. On souhaite calculer la somme des termes de cette suite jusqu'au rang n .

Par l'astuce précédente, il y a $n - 1 + p = n + 1$ termes. On peut calculer la somme S :

$$S = v_2 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = -(1 - 2^{n+1}) = 2^{n+1} - 1.$$

II - Étude des suites

1. Sens de variation

Une suite u_n est **croissante** si on a :

$$u_{n+1} \geq u_n \text{ ou } u_{n+1} - u_n \geq 0.$$

À l'inverse, une suite u_n est **décroissante** si on a :

$$u_{n+1} \leq u_n \text{ ou } u_{n+1} - u_n \leq 0.$$

Une suite est dite **constante** si on a pour $c \in \mathbb{R}$:

$$u_n = u_{n+1} = c.$$

Si une suite est croissante ou décroissante et ne change pas de variation, alors elle est dite **monotone**.

2. Limites

On dit qu'une suite u_n **converge** vers une limite finie l si pour tout $\epsilon > 0$, on a $|u_n - l| < \epsilon$. Ce terme est un peu technique mais cela signifie qu'il existe une infinité de réels entre u_n et l . On dit que u_n est **convergente** et on note alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$$

Attention ! On dit que u_n converge vers l mais **jamais** u_n n'atteindra l quand n tend vers $+\infty$.

La suite u_n peut également diverger vers une limite infinie. On dit à ce moment là que u_n est **divergente**. On note ainsi :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \pm\infty$$

Il est possible d'écrire une définition semblable à celle de la convergence.

Ainsi, si u_n diverge vers $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$, cela signifie que pour tout réel h et à partir d'un certain rang M , on aura $u_M > h$.

Et si u_n diverge vers $-\infty$ quand n tend vers $+\infty$, cela signifie que pour tout réel h et à partir d'un certain rang m , on aura $u_m < h$.

Limite d'une suite géométrique

Si on a pour $q \in \mathbb{R}...$	$-1 < q < 1$	$1 < q$	$q \leq -1$	$q = 1$
La suite q^n a pour limite...	0	$+\infty$	Pas de limite	1

À savoir que si une suite a une limite, alors cette limite est **unique**.

3. Opérations sur les limites

Dans tout ce qui suit, u_n et v_n sont deux suites. Ces tableaux sont à connaître et sont requis pour pouvoir travailler sur les limites.

Limite d'une somme						
Si la limite de u_n quand n tend vers $+\infty$ est...	l	l	l	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
Et la limite de v_n quand n tend vers $+\infty$ est...	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
Alors la limite de $u_n + v_n$ quand n tend vers $+\infty$ est...	$l + l'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$?

Limite d'un produit									
Si la limite de u_n quand n tend vers $+\infty$ est...	l	$l > 0$	$l > 0$	$l < 0$	$l < 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0
Et la limite de v_n quand n tend vers $+\infty$ est...	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$
Alors la limite de $u_n \times v_n$ quand n tend vers $+\infty$ est...	$l \times l'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$?

Limite d'un quotient									
Si la limite de u_n quand n tend vers $+\infty$ est...	l	l	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$	l	0
Et la limite de v_n quand n tend vers $+\infty$ est...	$l' \neq 0$	$\pm\infty$	$l' > 0$	$l' < 0$	$l' > 0$	$l' < 0$	$\pm\infty$	0_{\pm}^{\pm}	0
Alors la limite de $\frac{u_n}{v_n}$ quand n tend vers $+\infty$ est...	$\frac{l}{l'}$	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$?	$\pm\infty$?

4. Majoration, minoration et bornes

Soient une suite u_n et deux réels m et M :

- On dit que m est un **minorant** de u_n si : $u_n > m$.
- On dit que M est un **majorant** de u_n si : $u_n < M$.
- On dit que u_n est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.
- Si u_n est croissante et est majorée, alors elle est convergente. Si elle n'est pas majorée, u_n diverge vers $+\infty$.
- Si u_n est décroissante et est minorée, alors elle est convergente. Si elle n'est pas minorée, u_n diverge vers $-\infty$.

Toute suite convergente est également bornée.

5. Encadrement

Soient deux suites u_n et v_n telles que $u_n < v_n$ à partir d'un certain rang. On a :

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = l'$ alors $l < l'$.

Soient deux suites u_n , v_n et w_n telles que $u_n < v_n < w_n$ à partir d'un certain rang et que u_n et w_n convergent vers le réel l . Alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = l$$

Ce théorème est appelé **théorème des gendarmes**.

III - Raisonnement par récurrence

Si on souhaite montrer qu'une propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$ à partir d'un certain rang p :

Initialisation : On teste la propriété au rang p . Si elle est vérifiée, on passe à l'étape suivante.

Hérédité : On démontre que si la propriété est vraie au rang p , alors elle est vraie au rang $p + 1$.

Conclusion : On explique que l'on vient de démontrer la propriété au rang $p + 1$ et que comme celle-ci est initialisée et héréditaire, alors elle est vraie à partir de ce rang p et pour tout $n \geq p$.

Exemple : Soit une suite u_n définie par $u_n : \begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = \frac{4u_n+17}{u_n+4} \end{cases}$. On souhaite montrer

que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $4 \leq u_n \leq 5$.

On note P_n la propriété $P_n : 4 \leq u_n \leq 5$.

On constate également que $u_{n+1} = \frac{4u_n+17}{u_n+4} = \frac{4(u_n+4)+1}{u_n+4} = 4 + \frac{1}{u_n+4}$.

Initialisation : On teste la propriété au rang 0 :

$P_0 : 4 \leq u_0 \leq 5 \iff 4 \leq 4 \leq 5$. C'est vrai.

La propriété est vraie au rang 0, on souhaite vérifier que la propriété est vraie au rang $n + 1$.

Hérédité :

D'après $P_n : 4 \leq u_n \leq 5$. Donc on a :

$$\iff 4 \leq u_n \leq 5$$

$$\iff 4 + 4 \leq u_n + 4 \leq 5 + 4$$

$$\iff \frac{1}{9} \leq \frac{1}{u_n+4} \leq \frac{1}{8} \text{ (la fonction inverse est décroissante sur } \mathbb{R}^+ \text{ donc on change l'inégalité)}$$

$$\iff 4 + \frac{1}{9} \leq 4 + \frac{1}{u_n+4} \leq 4 + \frac{1}{8}$$

Or $4 + \frac{1}{9} \approx 4.111 > 4$ et $4 + \frac{1}{8} = 4.125 < 5$. On a donc bien :

$$4 \leq u_{n+1} \leq 5$$

Conclusion :

La propriété est initialisée et héréditaire. Ainsi, P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Le raisonnement par récurrence est très utilisé en mathématiques et ne se limite pas qu'à l'étude des suites.