



离散数学

大连理工大学软件学院

陈志奎 博士、教授、博士生导师

办公室：综合楼405，Tel: 62274392
实验室：综合楼一楼，教学楼A502/C109

Mobile: 13478461921
Email: zkchen@dlut.edu.cn
zkchen00@hotmail.com
QQ: 1062258606

回顾

- 序偶
- 笛卡尔积
- 关系的定义，二元关系
 - 笛卡尔积—构成集合（子集）
- 关系的性质
 - 自反，反自反，对称，反对称，传递，不可传递
- 关系相等

集合的压缩和开拓

定义：设 R 为集合 A 上的二元关系且 $S \subseteq A$ ，则称 S 上的二元关系 $R \cap (S \times S)$ 为 R 在 S 上的压缩，记为 $R|_S$ ，并称 R 为 $R|_S$ 在 A 上的开拓。

定理：设 R 为 A 的二元关系且 $S \subseteq A$ ，那么：

- (1)若 R 是自反的，则 $R|_S$ 也是自反的；
- (2)若 R 是反自反的，则 $R|_S$ 也是反自反的；
- (3)若 R 是对称的，则 $R|_S$ 也是对称的；
- (4)若 R 是反对称的，则 $R|_S$ 也是反对称的；
- (5)若 R 是可传递的，则 $R|_S$ 也是可传递的；


4.3关系的表示

一、关系图

定义：设 A 和 B 为任意的非空有限集， R 为任意一个从 A 到 B 的二元关系。以 $A \cup B$ 中的每个元素为结点。对每个 $\langle x, y \rangle \in R \wedge x \in A \wedge y \in B$ 皆画一条从 x 到 y 的有向边，这样得到的一个图称为关系 R 的关系图。

例： $A = \{1, 2, 4\}$; $B = \{3, 5, 6\}$;

关系 $R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 2, 5 \rangle\}$




一、关系图


例：设 $A=\{2,3,4,5,6\}$, $B=\{6,7,8,12\}$ ，从A到B的二元关系R为 $R=\{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \wedge x \text{整除} y\}$ ，画出其关系图。

解：先求出R

$$R = \{\langle 2,6 \rangle, \langle 2,8 \rangle, \langle 2,12 \rangle, \langle 3,6 \rangle, \langle 3,12 \rangle, \langle 4,8 \rangle, \langle 4,12 \rangle, \langle 6,6 \rangle, \langle 6,12 \rangle\}$$




一、关系图




xRy




xRx




$xRy \wedge yRy$




$xRy \wedge yRx$




$xRy \wedge yRz \wedge zRx$



对称关系



反对称关系



二、关系矩阵

定义： 给定两个有限集合 $X=\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ 和 $Y=\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ ， R 是从 X 到 Y 的**二元关系**，如果有：

$$r_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{如果 } \langle x_i, y_j \rangle \in R \\ 0 & \text{如果 } \langle x_i, y_j \rangle \notin R \end{cases}$$

则称 $[r_{ij}]_{|X \cup Y| \times |X \cup Y|}$ 是 **R 的关系矩阵**，记作 M_R


例： 设 $A=\{1,2,3,4\}$ ， R 为定义在 A 上的二元关系， $R=\{\langle 2,1 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 4,1 \rangle\}$ ，写出关系矩阵。

$$M_R = [r_{ij}]_{4 \times 4} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

二、关系矩阵

例：设 $A=\{1,2,3\}$, $B=\{a,b,c\}$, R 是 A 到 B 的二元关系，并且 $R=\{\langle 1,a\rangle, \langle 2,b\rangle, \langle 3,c\rangle\}$ ，试画出 R 的关系图，给出关系矩阵。

$$M_R = [r_{ij}]_{6 \times 6} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & a & b & c \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ a \\ b \\ c \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



二、关系矩阵

- 如果关系矩阵主对角线上的记入值全为1，则 R 是自反的；
- 如果主对角线上的记入值全为0，则 R 是反自反的；
- 如果矩阵关于主对角线是对称的，则 R 是对称的；
- 如果矩阵关于主对角线是反对称的，(亦即 $r_{ij}=1$ 时则一定有 $r_{ji}=0$)，则 R 是反对称的；
- 如果对于任意的 i, j, k ， $r_{ij}=1$ 并且 $r_{jk}=1$ 时一定有 $r_{ik}=1$ ，则 R 是可传递的；
- 如果存在 i, j, k ， $r_{ij}=1$ 并且 $r_{jk}=1$ 时，有 r_{ik} 不等于1，则 R 是不可传递的；

4.4关系的运算

注意：由于关系也是特殊的集合，因此集合的运算也适用于关系中。

设 R_1 和 R_2 是从 A 到 B 的二元关系，那么 $R_1 \cap R_2$, $R_1 \cup R_2$
 $R_1 - R_2$, $R_1 \oplus R_2$ 也是从 A 到 B 的二元关系，它们分别被称为二元关系 R_1 和 R_2 的交、并、差分和对称差分。

4.4关系的运算

例： 设集合 $A=\{a,b,c\}$, $B=\{d,e\}$, 定义A到B的二元关系

$$R_1=\{ \langle a,d \rangle, \langle a,e \rangle, \langle b,d \rangle, \langle c,e \rangle \}$$

$$R_2=\{ \langle a,d \rangle, \langle b,e \rangle, \langle c,d \rangle \}$$

则

$$R_1 \cap R_2 = \{ \langle a, d \rangle \}$$

$$R_1 \cup R_2 = \{ \langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle b, d \rangle, \langle b, e \rangle, \langle c, d \rangle, \langle c, e \rangle \}$$

$$R_1 - R_2 = \{ \langle a, e \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, e \rangle \}$$

$$R_2 - R_1 = \{ \langle b, e \rangle, \langle c, d \rangle \}$$

$$\sim R_1 = \{ \langle b, e \rangle, \langle c, d \rangle \}$$

$$R_1 \oplus R_2 = \{ \langle a, e \rangle, \langle b, d \rangle, \langle b, e \rangle, \langle c, d \rangle, \langle c, e \rangle \}$$

4.4关系的运算

一、关系的合成

定义：设 R 是从 X 到 Y 的关系， S 是从 Y 到 Z 的关系，于是可用 $R \circ S$ 表示从 X 到 Z 的关系，通常称它是 R 和 S 的**合成关系**，用式子表示即是：

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in X \wedge z \in Z \wedge (\exists y)(y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$$

例：给定集合 $X=\{1,2,3,4\}$ ， $Y=\{2,3,4\}$ 和 $Z=\{1,2,3\}$ 。设 R 是从 X 到 Y 的关系，并且 S 是从 Y 到 Z 的关系，并且 R 和 S 给定成：

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x + y = 6 \} = \{ \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$$

$$S = \{ \langle y, z \rangle \mid y - z = 1 \} = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$$

试求 R 和 S 的合成关系，并画出合成关系图给出合成关系的关系矩阵。

一、关系的合成




解：找出所有这样的偶对 $\langle x, z \rangle$ 对于某一个 y 来说，能有 $x+y=6$ 和 $y-z=1$ ，由上述的偶对就可构成从 X 到 Z 的关系 $R \circ S$ 。

$$R \circ S = \{\langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle\}$$


$$x \xrightarrow{R} y$$

$$y \xrightarrow{S} z$$

$$x \xrightarrow{R \circ S} z$$



一、关系的合成


$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$M_S = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$M_{R \circ S} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

定义布尔运算：

$$0+0=0, \quad 1+0=0+1=1+1=1$$

$$1 \cdot 1=1, \quad 0 \cdot 1=1 \cdot 0=0 \cdot 0=0$$

对两个关系矩阵求其合成时，其运算法则与一般矩阵的乘法是相同的，但其中的加法运算和乘法运算应改为布尔加和布尔乘。

一、关系的合成

注意：设 R 是从集合 X 到集合 Y 的关系， S 是从集合 Y 到集合 Z 的关系，于是有：

- ✓ 如果 R 关系的值域与 S 关系的定义域的交集是个空集，则合成关系 $R \circ S$ 也是个空关系；
- ✓ 若至少有一个序偶 $\langle x, y \rangle \in R$ ，其中第二个成员是 S 中的某一个序偶的第一个成员，则合成关系就是个非空关系。
- ✓ 对于合成关系 $R \circ S$ 来说，它的定义域是集合 X 的子集，而它的值域则是 Z 的子集，事实上，它的定义域是关系 R 的定义域的子集，它的值域是关系 S 的值域的子集。

一、关系的合成

定理：给定集合 X, Y, Z 和 W ，设 R_1 是从 X 到 Y 的关系， R_2 和 R_3 是 Y 到 Z 的关系， R_4 是从 Z 到 W 的关系，于是有：

$$(a) \quad R_1 \circ (R_2 \cup R_3) = (R_1 \circ R_2) \cup (R_1 \circ R_3)$$

$$(b) \quad R_1 \circ (R_2 \cap R_3) \subseteq (R_1 \circ R_2) \cap (R_1 \circ R_3)$$

$$(c) \quad (R_2 \cup R_3) \circ R_4 = (R_2 \circ R_4) \cup (R_3 \circ R_4)$$

$$(d) \quad (R_2 \cap R_3) \circ R_4 \subseteq (R_2 \circ R_4) \cap (R_3 \circ R_4)$$

一、关系的合成

$$(a) \quad R_1 \circ (R_2 \cup R_3) = (R_1 \circ R_2) \cup (R_1 \circ R_3)$$

证明：当且仅当存在某一个 $y \in Y$ ，能使 $\langle x, y \rangle \in R_1$ 和 $\langle y, z \rangle \in R_2 \cup R_3$ ，才有 $\langle x, z \rangle \in R_1 \circ (R_2 \cup R_3)$ ，而

$$\text{对任意的 } \langle x, z \rangle \in R_1 \circ (R_2 \cup R_3) \Leftrightarrow$$

$$\exists y (\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in R_2 \cup R_3) \Leftrightarrow$$

$$\exists y (\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge (\langle y, z \rangle \in R_2 \vee \langle y, z \rangle \in R_3)) \Leftrightarrow$$

$$\exists y ((\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in R_2) \vee$$

$$(\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in R_3))$$

$$\Leftrightarrow \exists y (\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in R_2) \vee$$

$$\exists y (\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in R_3)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, z \rangle \in R_1 \circ R_2 \vee \langle x, z \rangle \in R_1 \circ R_3$$

$$\Leftrightarrow \langle x, z \rangle \in (R_1 \circ R_2) \cup (R_1 \circ R_3) \quad \text{得证}$$

一、关系的合成

$$(b) R_1 \circ (R_2 \cap R_3) \subseteq (R_1 \circ R_2) \cap (R_1 \circ R_3)$$

证明：当且仅当存在某一个 $y \in Y$ ，能使 $\langle x, y \rangle \in R_1$ 和 $\langle y, z \rangle \in R_2 \cap R_3$ ，才有 $\langle x, z \rangle \in R_1 \circ (R_2 \cap R_3)$ ，而

$$(\exists y)(\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in R_2 \cap R_3)$$

$$\Leftrightarrow (\exists y)(\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge (\langle y, z \rangle \in R_2 \wedge \langle y, z \rangle \in R_3))$$

$$\Leftrightarrow (\exists y)(\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in R_2 \wedge (\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in R_3))$$

$$\Rightarrow (\exists y)((\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in R_2) \wedge (\exists y)(\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in R_3))$$

$$\Leftrightarrow \langle x, z \rangle \in R_1 \circ R_2 \wedge \langle x, z \rangle \in R_1 \circ R_3$$

$$\Leftrightarrow \langle x, z \rangle \in (R_1 \circ R_2) \cap (R_1 \circ R_3)$$

- 对以上证明过程**(a)**式使用的是存在量词对 \vee 满足分配律
- 对**(b)**存在量词对 \wedge 不满足分配律，但它满足蕴涵式 $\exists \mathbf{x}(\mathbf{A}(\mathbf{x}) \wedge \mathbf{B}(\mathbf{x})) \Rightarrow \exists \mathbf{x} \mathbf{A}(\mathbf{x}) \wedge \exists \mathbf{x} \mathbf{B}(\mathbf{x})$
- 这里应注意 $A \Rightarrow B$ 是
 - $A \subseteq B$
 -

一、关系的合成

合成运算是对关系的二元运算，使用这种运算，能够由两个关系生成一个新的关系，对于这个新的关系又可进行合成运算，从而生成其它关系。

定理：设 R_1 是从 X 到 Y 的关系， R_2 是从 Y 到 Z 的关系， R_3 是从 Z 到 W 的关系，于是有

$$(R_1 \circ R_2) \circ R_3 = R_1 \circ (R_2 \circ R_3)$$

一、关系的合成

$$\langle x, w \rangle \in (R_1 \circ R_2) \circ R_3$$

$$\Leftrightarrow (\exists z)(\langle x, z \rangle \in R_1 \circ R_2 \wedge \langle z, w \rangle \in R_3)$$

$$\Leftrightarrow (\exists z)((\exists y \langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in R_2) \wedge \langle z, w \rangle \in R_3)$$


$$\Leftrightarrow (\exists z)(\exists y)(\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in R_2 \wedge \langle z, w \rangle \in R_3)$$

$$\Leftrightarrow (\exists y)(\exists z)(\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in R_2 \wedge \langle z, w \rangle \in R_3)$$

$$\Leftrightarrow (\exists y)(\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge (\exists z)(\langle y, z \rangle \in R_2 \wedge \langle z, w \rangle \in R_3))$$

$$\Leftrightarrow (\exists y)(\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, w \rangle \in R_2 \circ R_3)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, w \rangle \in R_1 \circ (R_2 \circ R_3) \quad \text{证毕。}$$



一、关系的合成

例：给定关系R和S，并且 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$

$$S = \{\langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$$

则 $R \circ S = \{\langle 1, 5 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle\}$

$$S \circ R = \{\langle 4, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle\}$$

$$R \circ (S \circ R) = \{\langle 3, 2 \rangle\}$$

$$(R \circ S) \circ R = \{\langle 3, 2 \rangle\}$$

$$R \circ R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$$

$$S \circ S = \{\langle 4, 5 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 1 \rangle\}$$

$$R \circ R \circ R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$$

关系的幂

定义：如果 R_1 是从 X_1 到 X_2 的关系， R_2 是从 X_2 到的 X_3 关系， \dots ， R_n 是从 X_n 到 X_{n+1} 的关系，则无括号表达式 $R_1 \circ R_2 \circ \dots \circ R_n$ 表达了从 X_1 到 X_{n+1} 的关系。当 $X_1 = X_2 = \dots = X_{n+1}$ 和 $R_1 = R_2 = \dots = R_n$ 时，也就是说当集合 X 中的所有 R_i 都是同样的关系时， X 中的合成关系 $R_1 \circ R_2 \circ \dots \circ R_n$ 可表达成 R^n ，并称作关系 R 的幂。

定义：给定集合 X ， R 是 X 中的二元关系。设 $n \in N$ ，于是 R 的 n 次幂 R^n 可定义成

(a) R^0 是集合 X 中的恒等关系 I_X ，亦即

$$R^0 = I_X = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in X \}$$

(b) $R^{n+1} = R^n \circ R$

关系的幂

定理：给定集合 X ， R 是 X 中的二元关系。设 $m, n \in \mathbb{N}$ ，于是可有

$$(a) \quad R^m \circ R^n = R^{m+n}$$

$$(b) \quad (R^m)^n = R^{mn}$$

例：给定集合 $X = \{a, b, c\}$ ， R_1, R_2, R_3, R_4 是 X 中的关系，并给定

$$R_1 = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, b \rangle\}$$

$$R_2 = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle\}$$

$$R_3 = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, c \rangle\}$$

$$R_4 = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, c \rangle\}$$

给出这些关系的各次幂

关系的幂

解:

$$R_1^2 = \{\langle a, b \rangle\}, R_1^3 = \emptyset, R_1^4 = \emptyset, \dots$$

$$R_2^2 = \{\langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle\},$$

$$R_2^3 = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\} = R_2^0$$

$$R_2^4 = R_2, R_2^5 = R_2^2$$

$$R_2^6 = R_2^3, \dots$$

$$R_3^2 = \{\langle a, c \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, c \rangle\} = R_3^3 = R_3^4 = R_3^5 \dots$$

$$R_4^2 = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\} = R_4^0$$

$$R_4^3 = R_4, R_4^5 = R_4^3 \dots$$

关系的幂

定理：设 X 是含有 n 个元素的有限集合， R 是 X 中的二元关系。于是存在这样的 s 和 t ，能使 $R^t = R^s$ ， $0 \leq s < t \leq 2^{n^2}$

证明：集合 X 中的每一个二元关系都是 $X \times X$ 的子集， X 有 n 个元素， $X \times X$ 有 n^2 个元素， $\rho(X \times X)$ 有 2^{n^2} 个元素，每一个元素都是 $X \times X$ 的一个子集，也是一种二元关系，因而，在 X 中有 2^{n^2} 个不同的二元关系。所以，不同的二元关系 R 的幂不会多于个 2^{n^2} 。但是序列 $R^0, R^1, \dots, R^{2^{n^2}}$ 中有 $2^{n^2} + 1$ 项，因此这些的方幂中至少有两个是相等的。证毕。

二、合成关系的矩阵表达和图解

设集合 $X=\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $Y=\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, $Z=\{z_1, z_2, \dots, z_p\}$, R 是从 X 到 Y 的关系, S 是从 Y 到 Z 的关系, M_R 和 M_S 第 i 行第 j 列的元素分别是 a_{ij} 和 b_{ij} , 它们是 0 或者 1。则合成关系 $R \circ S$ 关系矩阵上的元素为

$$c_{ij} = \bigvee_{k=1}^n a_{ik} \wedge b_{kj} \quad i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, p$$

定义布尔运算:

$$0+0=0, \quad 1+0=0+1=1+1=1$$

$$1 \cdot 1=1, \quad 0 \cdot 1=1 \cdot 0=0 \cdot 0=0$$

对两个关系矩阵求其合成时, 其运算法则与一般矩阵的乘法是相同的, 但其中的加法运算和乘法运算应改为布尔加和布尔乘。

二、合成关系的矩阵表达和图解

例：求合成关系 $R \circ S$ 的关系矩阵 $M_{R \circ S}$

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M_S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{R \circ S} = M_R \wedge M_S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

二、合成关系的矩阵表达和图解

$$M_{R_1} \circ (M_{R_2} \circ M_{R_3}) = (M_{R_1} \circ M_{R_2}) \circ M_{R_3} = M_{R_1} \circ M_{R_2} \circ M_{R_3}$$

当 $M_{R_1} = M_{R_2} = \cdots = M_{R_n} = M_R$

用 M_{R^n} 表示这些矩阵的合成矩阵




二、合成关系的矩阵表达和图解

例：设集合 $X=\{0,1,2,3\}$ ， R 是 X 中的关系，并且
 $R = \{\langle 0,0 \rangle, \langle 0,3 \rangle, \langle 2,0 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle\}$

画出 R^2 和 R^3 的关系图

解： $R^2 = R \circ R = \{\langle 0,0 \rangle, \langle 0,3 \rangle, \langle 0,2 \rangle, \langle 2,0 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,0 \rangle\}$

$R^3 = R^2 \circ R = \{\langle 0,2 \rangle, \langle 0,0 \rangle, \langle 0,3 \rangle, \langle 0,1 \rangle, \langle 2,0 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,0 \rangle, \langle 3,3 \rangle\}$



作业

- **103页11,13,15,17,19**