

Die Abgeplattete Teichmuschel, *Pseudanodonta complanata* (ROSSMÄSSLER 1835), in Baden-Württemberg

Text: Dr. Karl-Otto Nagel & Michael Pfeiffer

<http://www.gobio-online.de/forschung.php>, Bearbeitungsstand Januar 2026

Gefährdungstatus

International:	gefährdet
Europäische Union:	potenziell gefährdet
Deutschland:	vom Aussterben bedroht
Baden-Württemberg:	vom Aussterben bedroht

Schutzstatus

Deutschland:	besonders und streng geschützt
Baden-Württemberg:	ganzjährige Schonzeit



© M. Pfeiffer, 16.01.2025

Merkmale der Art:

Die dünne, aber stabile Schale der Abgeplatteten Teichmuschel ist wenig bauchig (Name!), ihr Umriss oval mit kurzem und niedrigem Vorderteil. Auf der Außenseite ist die Schale überwiegend grün bis braun gefärbt, wobei die Jahresringe oft gelblich abgesetzt sind. Die Innenseite weist häufig gelbliche oder lachsfarbene Farbtöne auf. Die Skulptur auf der Wirbelregion besteht aus einigen rundlichen oder länglichen Höckerchen im vorderen und wenigen kurzen, aber relativ kräftigen Fältchen im hinteren Teil. Wie alle Teichmuschelverwandten besitzt auch die Abgeplattete Teichmuschel keine Schlosszähne. Die Tiere können 6 - 10 cm lang werden.

Allgemeine Verbreitung und historische Nachweise aus Baden-Württemberg

Das Verbreitungsgebiet der Abgeplatteten Teichmuschel erstreckt sich von Frankreich im Westen durch ganz Mittel- und Osteuropa, das südliche Skandinavien bis zu den Schwarzmeereszuflüssen in Südosteuropa. Nur in einigen Zuflüssen zur Rhône berührt die Art das Einzugsgebiet des Mittelmeers. In Baden-Württemberg kommen zwei Unterarten der Abgeplatteten Teichmuschel vor: *Pseudanodonta complanata kuesteri* HAAS, 1913 (Unterart des deutschen Donaugebiets, auch in der oberen Jagst) und *Pseudanodonta complanata elongata* HOLLANDRE, 1836 (Unterart des Rheingebiets). Ohne Kenntnis des Fundortes ist aber eine sichere Zuordnung von Einzelstücken zu einer der Unterarten aufgrund ihrer Schalen nicht immer möglich. Die Art war wahrscheinlich schon immer selten und kam nur in wenigen Gewässern (Rhein, Neckar, Tauber, Jagst) häufiger vor.

Aktuelle Verbreitung in Baden-Württemberg

Jüngere Nachweise aus dem württembergischen Donaugebiet fehlen völlig, und der jüngste publizierte Fund stammt aus dem Jahre 1995 (Illinger Altrhein). Ab 2000 wurde Leerschalenfunde aus der Jagst, vor allem aus der Umgebung von Kirchberg/Jagst dokumentiert (Abb. 1) und aus dem Rhein gab es im Jahr 2011 Nachweise frischer Leerschalen in der Ill bei Mulhouse. Mit Beginn dieses Projekts mehrten sich dann die Hinweise auf bislang übersehene Reliktvorkommen in Baden-Württemberg: Aus der Tauber bei Wertheim (2014 & 2017) sowie aus der Jagst bei Berlichingen (2013) gab es bereits vor 2020 Funde lebender Pseudanodonten (Abb. 3). Jüngst kamen aus der Jagst bei Ruchsen (2020), dem Kocher bei Kochendorf (2020) und aus dem Rhein bei Rußheim (2025) (Titelbild) weitere spektakuläre Lebendfunde hinzu. Im Altrhein bei Illingen (2021) und im Neckar in Mannheim (2015, Abb. 2) wurde zudem frisches Schalenmaterial vorgefunden, was Hinweise auf weitere Reliktvorkommen gibt.



Abb. 1: Schalen aus der Jagst (Foto: M. Pfeiffer, 12.03.2018)



Abb. 2: Frisches Schalenmaterial aus dem Neckar
(Foto: H. Nese mann)



Abb. 3: Lebendes Jungtier aus der Jagst bei Berlichingen (Foto: P. Roos, 2013).

Wissenswertes

Die Abgeplattete Teichmuschel wird auch unter den Bezeichnungen Strommuschel oder Schlanke Teichmuschel geführt. Alle Varianten sind Versuche, charakteristische Eigenschaften der Schale oder des bevorzugten Lebensraumes im deutschen Namen auszudrücken. Der Lebensraum der Art sind strömungsarme Fließstrecken und Buchten größerer Fließgewässer, aber auch Uferbereiche größerer Seen. Die Tiere graben sich oft vollständig ein, so dass nur noch ihre Atemöffnungen am Gewässergrund sichtbar sind. Die getrenntgeschlechtige Abgeplattete Teichmuschel kann mehr als zehn Jahre alt werden und wird mit etwa 4 cm Länge geschlechtsreif. Bereits im Frühsommer (Juni, Juli) beginnen die Weibchen mit der Eiablage in die Kiemen, die reifen Larven (Glochidien) werden allerdings erst im Winter und Frühling (Januar bis April) des Folgejahres abgegeben. *Pseudanodonta complanata* produziert mit bis zu 50.000 Larven vergleichsweise wenige, ca. 0,35 mm große Glochidien. Sie heften sich an Flossen, Haut oder Kiemen ihrer Wirtsfische (z.B. Flussbarsch, Zander, Stichlinge), wo sie je nach Wassertemperatur 2 - 4 Wochen verweilen. Danach fallen die jungen Muscheln von ihrem Wirt ab.

Forschungs- und Handlungsbedarf in Baden-Württemberg

Vor allem in Tauber, Jagst und Kocher ist eine Einschätzung der Bestandsituation der bis vor wenigen Jahren in Baden-Württemberg als verschollen geltenden Art erforderlich. Die Art ist nicht nur extrem selten, sondern auch streng geschützt und die jüngsten Nachweise verdeutlichen einmal mehr, dass eine fachliche Begleitung von Maßnahmen an Gewässern mit Muschelvorkommen, darunter fallen auch Renaturierungen, durch Experten immer erforderlich ist. Mit einer ordentlichen Dokumentation und Zusammenführung der Informationen könnten so auch weitere Wissenslücken geschlossen werden.

Hinweise zur Verbreitungskarte

Für die Erstellung der Karte (Abb. 4) wurde verfügbare und relevante Literatur, die bürointerne Datenbank zu *Pseudanodonta complanata* und mehrere aktuelle Hinweise durch Zuarbeiter für Baden-Württemberg ausgewertet (71 Datensätze, Stand Januar 2026).

Die Verbreitungskarte soll vor allem den zuständigen Behörden und Ämtern (Fischerei- und Naturschutzbehörden, Wasserwirtschaft, Unterhaltungsträger) helfen, die Muschelsituation in ihrem Zuständigkeitsbereich einzuschätzen. Es besteht auf Anfrage bei uns die Möglichkeit, detaillierte

Informationen zu erhalten und die Funde fachlich einzuordnen. Die blauen Vierecke stellen die aktuell bekannten Fundstellen lebender *Pseudanodonta complanata* seit dem Jahr 2020 dar, die grünen Vierecke zwischen 2010 und 2020. Grüne und hellblaue Punkte sind Schalenfunde neueren Datums (nach 1990). Rote, orange und gelbe Punkte stellen ehemalige (historische) Fundstellen (Lebend- und Schalenfunde) der Abgeplatteten Teichmuschel dar.

Jeder kann mitmachen: Hinweise und Verdachtsfälle können Sie gerne bei uns melden. Wir werden den Hinweisen nachgehen und die Karte aktualisieren.

Fragen und Hinweise bitte an gobio:

Pfeiffer, Michael: gobio, Büro für limnologische Gutachten, Weißerlenstraße 2, 79108 Freiburg-Hochdorf, pfeiffer@gobio-online.de, Tel.: 0761 / 88 88 1750

Nagel, Karl-Otto: Dr.-Gremmelsbacher-Str. 6, 79199 Kirchzarten, konagel@gmx.de

Herzlichen Dank für Hinweise:

Busch, Christiane: Andrena Landschaftsökologie und Naturschutz, Burgweg 11, 97956 Werbach-Gamburg

Kunz, Bernd (†), Langenburg

Dr. Neumann, Hasko F.: Im Obergarten 9, 65719 Hofheim am Taunus

Roos, Peter: Büro für GewässerÖkologie GbR, Sophienstrasse 93, 76135 Karlsruhe

Dr. Theves, Florian: LUBW, Griesbachstr. 1, 76185 Karlsruhe

KONTAKT

gobio

Büro für limnologische Gutachten

Dipl.-Biol. Michael Pfeiffer
Weißerlenstraße 2
79108 Freiburg-Hochdorf

Telefon: 0761 / 88 88 1750
E-Mail: [pfeiffer\[at\]gobio-online.de](mailto:pfeiffer[at]gobio-online.de)
Internet: <http://www.gobio-online.de/>

Pseudanodonta complanata

Lebendnachweise

- nach 2020
- nach 2010

Frühere Funde

- ab 2020
- bis 2020
- bis 1990
- bis 1960
- bis 1930




Abb. 4: Historische und aktuelle Verbreitung von *Pseudanodonta complanata* in Baden-Württemberg. (Kartenerstellung: Magnus Leschner – Büro gobio, © Büro gobio, Stand 08.01.2026).

Literatur

1. Schutzstatus und Gefährdungsgrad

ALDRIDGE, D. (2011): *Pseudanodonta complanata* (Europe assessment). *The IUCN Red List of Threatened Species* 2011: e.T18446A8279656. Accessed on 28 February 2024.

VAN DAMME, D. (2011): *Pseudanodonta complanata*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2011: e.T18446A8279278. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-2.RLTS.T18446A8279278.en>. Accessed on 28 February 2024.

JUNGBLUTH, J.H. & VON KNORRE, D. (2009) (Mitarbeit: BÖBNECK, U., GROH, K., HACKENBERG, E., KOBIALKA, H., KÖRNIG, G., MENZEL-HARLOFF, H., NIEDERHÖFER, H.-J., PETRICK, S., SCHNIEBS, K., WIESE, V., WIMMER, W. & ZETTLER, M.L.): Rote Liste der Binnenmollusken [Schnecken (Gastropoda) und Muscheln (Bivalvia)] in Deutschland. 6. revidierte und erweiterte Fassung 2008. - Mitteilungen der deutschen malakozoologischen Gesellschaft 81: 1-28, Frankfurt a.M.

ARBEITSGRUPPE MOLLUSKEN BW (am Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart) (2008): Naturschutz-Praxis, Artenschutz 12: Rote Liste und Artenverzeichnis der Schnecken und Muscheln Baden-Württembergs (zweite, neu bearbeitete Fassung, Bearbeitungsstand Dezember 2006). - LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.). 185 S.

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, FFH) mit Anhang II: "Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen" Anhang IV: Neben dem direkten Tötungsverbot dürfen deren "Lebensstätten" nicht beschädigt oder zerstört werden. Zudem dürfen diese Arten auch nicht in der Fortpflanzungs- Wanderungs- und Winterruhezeit gestört werden und Anhang V: "Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus der Natur und Nutzung Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein können". (kein Eintrag)

Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) geändert worden ist.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, Kabinettsbeschluss vom 7. November 2007. (kein Eintrag unter "Verantwortungsarten auf <https://biologischevielfalt.bfn.de>, abgerufen am 3.3.2018)

Verordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Durchführung des Fischereigesetzes für Baden-Württemberg (Landesfischereiverordnung - LFischVO -) vom 3. April 1998, zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. April 2016 (GBl. S. 266).

2. Fachliteratur

Artensteckbrief Abgeplattete Teichmuschel (*Pseudanodonta complanata*), http://fisch.wzw.tum.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Merkblatt_Abgeplattete_Teichmuschel.pdf (abgerufen am 12.03.2018).

HÜBY (1988) in Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) (2013): Leitfaden Bachmuschelschutz, 2. aktualisierte Auflage. Bearbeiter: Hochwald, S., Gum, B, Ulrich, B.-U. & Sachteleben, J. 116 S., Augsburg. (Tabelle der Wirtsfische: S. 22, Tab. 2).

HÜBY, B. (1988): Zur Entwicklungsbiologie der Fließgewässermuschel *Pseudanodonta complanata*. Dissertation, Institut für Zoologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover. 111 S.

MCIVOR, A.L. & ALDRIDGE, D.C. (2007): The reproductive biology of the depressed river mussel, *Pseudanodonta complanata* (Bivalvia: Unionidae), with implications for its conservation. - Journal of Molluscan Studies.

NAGEL, K.-O. & PFEIFFER, M. (2012): Die Najadenfauna (Unionidae) des Oberelsass (Département Haut-Rhin, Frankreich) - Mitteilungen der deutschen malakozoologischen Gesellschaft 87: 17-28, Frankfurt/Main.

NAGEL, K.-O. (2015): Abgeplattete Teichmuschel, *Pseudanodonta complanata* (Rossmässler, 1835).
- In: HMUKLV & Hessen-Forst FENA (Hrsg.): Atlas der Fische Hessens - Verbreitung der Rundmäuler, Fische, Krebse und Muscheln - FENA Wissen, Band 2: 404-407, Gießen, Wiesbaden.