

Die Chinesische Teichmuschel, *Sinanodonta woodiana* (LEA, 1834), in Baden-Württemberg

Text: Dr. Karl-Otto Nagel & Michael Pfeiffer

<http://www.gobio-online.de/forschung.php>, Bearbeitungsstand Januar 2026

Gebietsfremde invasive Art

Gefährdungstatus

International:	nicht gefährdet
Europäische Union:	kein Gefährdungstatus
Deutschland:	kein Gefährdungstatus
Baden-Württemberg:	kein Gefährdungstatus

kein Schutzstatus



Merkmale der Art/Beschreibung:

Chinesische Teichmuscheln können bis zu 30 cm groß werden und ein Gewicht von über einem Kilogramm erreichen! Ihre Schale ist relativ dünn und im Umriss rund oval bis fast kreisrund; sie haben keine Schlosszähne. Besonders in nährstoffreichen Stillgewässern können die Tiere sehr bauchig werden. Die Wirbelskulptur besteht aus wenigen kräftigen und weit auseinander liegenden Runzelfalten. Die Außenseite der Schalen weist gelbliche, grüne oder braune Farbtöne auf, oft sind helle Radiärstreifen zu sehen. Innen sind die Schalen glänzend weiß und nicht selten gelblich oder lachsfarben getönt. Neue molekulargenetische Studien deuten darauf hin, dass es sich bei der Chinesischen Teichmuschel möglicherweise um einen Komplex nahe verwandter Arten handelt, von denen bislang eine invasiv in Europa aufgetreten ist.

Allgemeine Verbreitung und historische Nachweise aus Baden-Württemberg

Das natürliche Verbreitungsgebiet der Art erstreckt sich über Ost- und Südostasien. Darüber hinaus wurde die Chinesische Teichmuschel in viele Länder Asiens, Europas und Amerikas, absichtlich oder unbemerkt, eingeführt. Mit dem Import asiatischer Karpfenfische (Marmor- und Silberkarpfen) gelangten die Tiere in den 1960er Jahren nach Europa, wo sie durch den Teichfisch- und Aquarienhandel, oft unerkant oder unter falschem Namen, verbreitet wurden. Eventuell gab es aber schon früher Importe dieser Art. Im Senckenberg-Museum, Frankfurt/M. befindet sich ein Exemplar mit der Herkunftsbezeichnung "Baden", was auf das heutige Bundesland Baden-Württemberg deuten könnte (Abb. 1). Sicher wurde das Tier lange vor dem publizierten Erstfund der Art in Deutschland (im Jahre 1999) gesammelt, doch die genauen Umstände dieses Fundes sind rätselhaft.



Abb. 1: *Sinanodonta woodiana* aus „Baden“ in der Sammlung des Senckenberg Forschungsinstituts (Bildautor: K.-O. Nagel, ©Sektion Malakologie, Senckenberg Forschungsinstitut Frankfurt a.M.).

Aktuelle Verbreitung in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es nach den uns vorliegenden Informationen mindestens drei fest etablierte Populationen. Im Großen Opfinger Baggersee bei Freiburg existiert bereits seit mehreren Jahren eine Population der Chinesischen Teichmuschel, über deren Herkunft nichts bekannt ist (siehe Titelbild S. 1, Pfeiffer 14.06.2014). Weitere Hinweise auf stabile Populationen gibt es aus dem Roßweiher bei Maulbronn (2023) sowie dem Max-Eyth-See in Stuttgart (2023). Aktuelle Lebendnachweise gibt es zudem sowie am Rhein bei Mannheim (2025), Lidsheim (2025) und Breisach (2022). Schalenfunde die auf punktuelle Vorkommen (Besatz) schließen lassen gibt es aus „Altwässern“ der Tauber (2025) und an der oberen Donau (2024).

Möglichkeiten *Sinanodonta* aus der Natur zu entfernen gibt es in manchen Fällen durchaus: Im Waldsee in Freiburg wurde im Herbst 2018 eine vitale Population entdeckt (Abb. 2). Die Tiere konnten im Zuge einer Seensanierung fachgerecht entnommen werden. Bei den Nachweisen am Rhein, Tauber und Donau könnte es sich noch um Einzeltiere handeln und eine Entnahme sollte wenigstens geprüft werden.



Abb. 2: *Sinanodonta woodiana* aus dem Waldsee in Freiburg (Bildautor: Karl-Otto Nagel, 11.10.2018).

Wissenswertes

Die Chinesische Teichmuschel ist sehr anpassungsfähig. Sie besiedelt alle Arten stehender Gewässer ebenso wie größere Fließgewässer. Die Tiere sind getrenntgeschlechtlich. Unter günstigen Bedingungen produziert die Chinesische Teichmuschel rund ums Jahr Larven, wobei die Weibchen mehrere Bruten hintereinander haben. Die ca. 0,3 mm großen Larven entwickeln sich auf den nach Europa eingeführten asiatischen Arten Marmor-, Gras- und Silberkarpfen und dem Blaubandbärbling sowie auf zahlreichen einheimischen Fischarten. Die Chinesische Teichmuschel kann bis zu 15 Jahre alt werden.

Zu einer "gut gemeinten" Ausbreitung dieser invasiven Art trägt auch bei, dass sie als vermeintlich nützliche natürliche Teichkläranlage sowie als Wirtstier für den Bitterling (*Rhodeus amarus*), einer gefährdeten Kleinfischart, die in einheimischen Muscheln ablaicht, angeboten wird. Die Chinesische Teichmuschel ist jedoch für den europäischen Bitterling als Wirtstier ungeeignet.

Das Ausbringen dieser gebietsfremden Muschelart ist im Übrigen genehmigungs- und erlaubnispflichtig. Aus Gründen des Natur- und Artenschutzes sollte die Chinesische Teichmuschel auf keinen Fall in Gewässer im Freiland besetzt werden, und bereits etablierte Bestände sollten nach Möglichkeit eingedämmt und aufgelöst werden.

Forschungs- und Handlungsbedarf in Baden-Württemberg

Eine unkontrollierte Ausbreitung in unseren Gewässern findet weiterhin statt. Die Chinesische Teichmuschel wird häufig nicht erkannt und mit einheimischen Arten verwechselt. In Gartencentern wird sie gar als „heimische Teichmuschel“ zum Verkauf angeboten. Der Umstand, dass die Art für den europäischen Bitterling als Wirtstier ungeeignet ist und dass die Chinesische Teichmuschel zudem deutlich höhere Reproduktionsraten als die beiden einheimischen Arten erzielt, ist sehr bedenklich. Eine landesweite Dokumentation und das Monitoring der Vorkommen dieser ökologisch problematischen und nachweislich invasiven Großmuschelart ist dringend erforderlich. Fachliche Beratungen und v.a. Kontrollen bei den Händlern sind dringend notwendig. Aktuell kann der Verkauf als Verbrauchertäuschung, wenn nicht gar als Betrug gewertet werden.

Hinweise zur Verbreitungskarte

Für die Erstellung der Karte (Abb. 3) wurden sämtliche verfügbaren und relevanten Literaturangaben, wesentliche und neue Informationen durch die Zuarbeiter sowie die eigene Datenbank ausgewertet (27 Datensätze zu *Sinanodonta woodiana* in Baden-Württemberg, Stichtag: 08.01.2026).

Die Verbreitungskarte soll vor allem den zuständigen Behörden und Ämtern (Naturschutzbehörden, Unterhaltungsträger) helfen, die Situation in ihrem Zuständigkeitsbereich einzuschätzen. Es besteht auf Anfrage bei uns die Möglichkeit, detaillierte Informationen zu erhalten.

Blaue Punkte stellen Fundstellen von Leerschalen der Chinesischen Teichmuschel seit dem Jahr 2012 dar. Die grünen Vierecke stellen Fundstellen lebender *Sinanodonta woodiana* von 2014 (Erstnachweis in BW) bis 2020 dar. Die blauen Vierecke sind Lebendfunde jüngeren Datums (seit 2020). Die blauen und grünen Punkte stellen Schalenfunde dar.

Jeder kann mitmachen: Hinweise und Verdachtsfälle bitte melden. Wir werden den Hinweisen nachgehen und die Karte aktualisieren.

Fragen und Hinweise an gobio:

Pfeiffer, Michael: gobio, Büro für limnologische Gutachten, Weißerlenstraße 2, 79108 Freiburg-Hochdorf, pfeiffer@gobio-online.de, Tel.: 0761 / 88 88 1750

Nagel, Karl-Otto: Dr.-Gremmelsbacher-Str. 6, 79199 Kirchzarten, konagel@gmx.de

Herzlichen Dank für Hinweise und Diskussion:

Dr. Arnold, Andreas: Meerwiesenstr. 31, 68163 Mannheim

Busch, Christiane: Andrena Landschaftsökologie und Naturschutz, Burgweg 11, 97956 Werbach-Gamburg

Groh, Klaus: Hinterbergstr. 15, 67098 Bad Dürkheim

Prof. Martens, Andreas: Pädagogische Hochschule, Institut für Biologie und Schulgartenentwicklung Karlsruhe, Bismarckstraße 10 76133 Karlsruhe.

Munzinger, Paul: Im Rebstall 6, 79112 Freiburg

Dr. Richling, Ira: Naturhistorisches Museum Stuttgart, Rosenstein 1, 70191 Stuttgart

Dr. Theves, Florian: LUBW, Griesbachstr. 1, 76185 Karlsruhe

KONTAKT

gobio

Büro für limnologische Gutachten

Dipl.-Biol. Michael Pfeiffer
Weißerlenstraße 2
79108 Freiburg-Hochdorf

Telefon: 0761 / 88 88 1750
E-Mail: pfeiffer[at]gobio-online.de
Internet: <http://www.gobio-online.de/>

Sinanodonta woodiana

Lebendnachweise

■ nach 2020

■ nach 2010

Schalenfunde

● nach 2020

● nach 2010




Abb. 3: Verbreitung von *Sinanodonta woodiana* in Baden-Württemberg. (Kartenerstellung: Magnus Leschner – Büro gobio, © Büro gobio, Stand 08.01.2026).

Literatur

- BOLOTOV, I.N., BESPALAYA, Y.V., GOFAROV, M.Y., KONDAKOV, A.V., KONOPLEVA, E.S. & VIKHREV, I.V. (2016): Spreading of the Chinese pond mussel, *Sinanodonta woodiana*, across Wallacea: One or more lineages invade tropical islands and Europe. - Biochemical Systematics and Ecology 67: 58–64.
- LABECKA, A.M. & DOMAGALA, J. (2018): Continuous reproduction of *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1824) females: an invasive mussel species in a female-biased population. Hydrobiologia 810: 57-76.
- NAGEL, K.-O., PFEIFFER, M., MILDNER, M. & GÜNTER, C. (2020): Der Waldsee in Freiburg, ein bedeutender Lebensraum für Großmuscheln. - Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz 22 (4): 653-662, Freiburg i.Br.
- PFEIFFER, M. (2014): *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834) im Großen Opfinger Baggersee bei Freiburg. Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz, Neue Folge 21: 587-591, Freiburg i.Br.
- PFEIFFER, M. & NAGEL, K.O. (2020): Die Chinesische Teichmuschel ist ein (fast) universeller Fischparasit. Fischer & Teichwirt, Nr. 3 / 84.
- REICHARD, M., VRTÍLEK, M., DOUDA, K. & SMITH, C. (2012): An invasive species reverses the roles in a host–parasite relationship between bitterling fish and unionid mussels. - Biology Letters 8: 601–604.
-