

Die Gemeine Teichmuschel, *Anodonta anatina* (LINNAEUS, 1758), in Baden-Württemberg

Text: Dr. Karl-Otto Nagel & Michael Pfeiffer

<http://www.gobio-online.de/forschung.php>, Bearbeitungsstand Januar 2026

Gefährdungstatus

International:	nicht gefährdet
Europäische Union:	nicht gefährdet
Deutschland:	Vorwarnliste
Baden-Württemberg:	Vorwarnliste

Schutzstatus

Deutschland:	besonders geschützt
Baden-Württemberg:	ganzjährige Schonzeit



Merkmale der Art:

Die Gemeine Teichmuschel oder Entenmuschel (*Anodonta anatina*) ist eine in ihrer äußeren Gestalt sehr variable Art mit nur wenigen konstanten Merkmalen auf der Schale, die zudem nicht immer deutlich ausgeprägt sind. Die sichere Bestimmung der Art in Abgrenzung von der sehr ähnlichen Großen Teichmuschel oder Schwanenmuschel (*Anodonta cygnea*) ist daher meist nur Fachleuten möglich.

Die folgende Beschreibung trifft für "typische" Exemplare zu. Die Schale der Gemeinen Teichmuschel ist dünn und auf der Innenseite meist glatt, d.h. dass sich Unebenheiten der Außenseite nicht auf der Innenseite zeigen. Der Unterrand der Schale ist besonders im vorderen Teil leicht verdickt. Der Umriss ist oval-eiförmig mit einem konkav zum Hinterende abfallenden Oberrand. Der Schalenuntterrand ist gleichmäßig gebogen, der Oberrand steigt gegenüber der Körperlängsachse nach hinten deutlich an. Die Schalenklappen sind bei älteren Tieren gewölbt, und besonders in Teichen können ausgesprochen bauchige Tiere gefunden werden (Abb. 1).



Abb. 1: Typische bauchige Stillgewässerform der Gemeinen Teichmuschel aus dem Tunisee bei Freiburg. Das Tier ist mit *Dreissena polymorpha* bewachsen (Bildautor: M. Pfeiffer, 08.05.2017).

Auf der Wirbelregion besitzt die Gemeine Teichmuschel eine Skulptur aus mehreren Reihen feiner, parallel zum Oberrand verlaufender Runzeln, die die Umrisslinien der jungen Schale kreuzen. Die Schale ist schlosslos und überwiegend in Gelb-, Grün- und Brauntönen gefärbt. Die Tiere erreichen Längen von 6 - 10 cm, in nährstoffreichen Stillgewässern auch bis zu 20 cm. Ihre Lebenserwartung liegt zwischen 5 und 15 Jahren.

Allgemeine Verbreitung und historische Nachweise aus Baden-Württemberg

Die Gemeine Teichmuschel hat ein weites Verbreitungsgebiet, das fast ganz Europa und angrenzende Teile Nordasiens umfasst. Im mittleren (Italien) und östlichen Mittelmeerraum wird sie durch nahverwandte Formen, deren Status noch nicht vollständig geklärt ist, vertreten.

In Baden-Württemberg kam die Gemeine Teichmuschel in allen Landesteilen vor. Die Art besiedelte dort sowohl natürliche Seen, Weiher und Altwässer als auch größere Fließgewässer und in den Niederungen auch kleine Bäche. Als Kulturfolger ist die Art sehr wahrscheinlich bereits seit dem Mittelalter durch Fischbesatz in unzählige Fischteiche gelangt, um von dort dann wieder sekundär die angebundenen Fließgewässer zu besiedeln.

Aktuelle Verbreitung in Baden-Württemberg

Größere Populationen der kleineren „Fließgewässerform“ gibt es im Einzugsgebiet des Neckars im Kocher, dessen Zufluss Bühler (Abb. 2), in der Eschach und in der gesamten Fließstrecke der Jagst. Am Rhein ist die Art abschnittsweise im Rhein selbst sowie in den Zuflüssen Kriegbach und Pfingz präsent. Im Einzugsgebiet der Donau kommt *Anodonta anatina* nachweislich im Oberlauf der Donau und in den Altwässern bei Ulm sowie im Einzugsgebiet der Eger vor. Ebenso wird die dem Main zufließende Tauber abschnittsweise von der Gemeinen Teichmuschel in höheren Dichten besiedelt.



Abb. 2: Fließgewässerform der Gemeinen Teichmuschel aus der Bühler, einem Kocher-Zufluss (Bildautor: M. Pfeiffer, 11.08.2015).

In Stillgewässern kann man in allen Landesteilen fündig werden. Die hier in der Verbreitungskarte dokumentierten Lebendnachweise in Seen, Weihern und Teichen sind dementsprechend lose über das ganze Land verteilt. Gute und gesicherte Daten gibt es aktuell nur aus den Stillgewässern in der Umgebung von Freiburg. Informationslücken gibt es vor allem aus den zahlreichen Stillgewässern in Oberschwaben, am Bodensee, am nördlichen Oberrhein und aus der Mitte des Landes (Einzugsgebiet des Neckars), wo ebenfalls immer mit Vorkommen zu rechnen ist. In einigen Regionen scheint die Art unerwartet zurückzugehen.

Wissenswertes

Die Gemeine Teichmuschel ist eine sehr anpassungsfähige Art. Sie lebt sowohl in kleinen Fließgewässern als auch in großen Flüssen, Altwässern, Seen, Fischteichen und Baggerseen. In Fließgewässern bevorzugt sie strömungsarme Bereiche. Die Art ist getrenntgeschlechtlich, es kommen jedoch auch Zwittertiere vor. Bei günstigen Wachstumsbedingungen in warmen, nährstoffreichen Gewässern wird sie schon mit zwei Jahren geschlechtsreif, in kühlen Fließgewässern erst mit 4 - 5 Jahren.

Die Gemeine Teichmuschel beginnt im Sommer (Juli, August) mit der Ablage der Eier in die Kiemen, diese werden im frühen Herbst befruchtet. Die schon im Herbst fertig entwickelten Larven (Glochidien) werden jedoch erst im Winter und Frühling (Januar bis April) in das Wasser abgegeben. Eine Muschel kann bis etwa 300.000 Glochidien produzieren, wobei die Zahl von der Größe des Muttertieres abhängt. Die Glochidien sind ca. 0,35 mm groß und entwickeln sich auf einer Vielzahl von Fischarten zu Jungmuscheln (darunter Bachforelle, Groppe, Gründling, Döbel, Hasel, Rotaugen, Rotfeder, Schleie, Flussbarsch, Zander und Stichling). Die Glochidien verankern sich im Epithel der Flossen und der Haut des Fisches, selten nur auf den Kiemen. Nach wenigen Wochen verlassen die jungen Muscheln ihren Wirt. Danach halten sie sich an der Oberfläche des Gewässergrundes und in der obersten Sedimentschicht auf, wo sie zur erwachsenen Muschel heranwachsen.

Wie alle Großmuscheln ist auch die Gemeine Teichmuschel ein Filtrierer, und ausgewachsene Muscheln filtern bis zu 3 Liter Wasser pro Stunde. Damit leisten Teichmuscheln in Stillgewässern einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Verbesserung der Wasserqualität. Der Wert dieser ökologischen Dienstleistung, die ein oftmals mehrere tausend Teichmuscheln umfassender Bestand für einen Fischweiher oder einen Badensee erbringt, sollte daher nicht unterschätzt werden.

Forschungs- und Handlungsbedarf in Baden-Württemberg

Oftmals werden bei der Teichunterhaltung oder der Entschlammung von Staubecken durch Unwissenheit ganze (eigentlich geschützte) Muschelbestände stark in Mitleidenschaft gezogen (Abb. 3). Handlungsbedarf besteht daher vor allem in der Schulung von Behörden, Teichbesitzern und Fischpächtern im Umgang mit der geschützten Art. Entsprechende Seminare oder Workshops könnten Wissenslücken zumindest etwas schließen und eine naturverträgliche Bewirtschaftung fördern.

Ob es sich bei den Teichmuscheln der verschiedenen Flusseinzugsgebiete des Landes (Rhein, Main, Donau) um verschiedene Unterarten handelt, könnte durch genetische Untersuchungen geklärt werden.

Von Bodensee und Hochrhein gibt es Hinweise von gleich mehreren Experten und Expertinnen, dass die Art in den vergangenen Jahren an zahlreichen ehemaligen Standorten verschwunden ist. Eine Überprüfung der Bestandssituation der Gemeinen Teichmuschel vor dem Hintergrund des zunehmenden Einflusses von Neozoen (Quaggamuschel, Körbchenmuschel) auf das Ökosystem wäre ein wichtiges wissenschaftliches Forschungsfeld.



Abb. 3: Verendete Teichmuscheln im Uferbereich eines teilweise abgelassenen Stausees (Bildautor: M. Pfeiffer, 18.10.2018).

Hinweise zur Verbreitungskarte

Für die Erstellung der Karte (Abb. 4) wurde hauptsächlich die eigene Datenbank ausgewertet (1.270 Datensätze zu *Anodonta anatina*, Stand Januar 2026).

Unsere Verbreitungskarte soll vor allem den zuständigen Behörden und Ämtern (Naturschutzbehörden, Unterhaltungsträger) helfen, die Situation in ihrem Gebiet einzuschätzen. Es besteht auf Anfrage bei uns die Möglichkeit, detaillierte Informationen zu erhalten. Anbei eine Beispielkarte aus der Umgebung von Kirchberg/Jagst (Abb. 5).

Die Vierecke stellen die aktuell bekannten Fundstellen lebender *Anodonta anatina* seit dem Jahr 2020 (blaue Vierecke) dar. Blaue Punkte Schalenfunde neueren Datums (nach 1990). Grüne, rote, orange, und gelbe Punkte stellen frühere Fundstellen der Gemeinen Teichmuschel dar.

Jeder kann mitmachen: Hinweise und Verdachtsfälle können Sie gerne bei uns melden. Wir werden den Hinweisen nachgehen und die Karte aktualisieren.

Fragen und Hinweise an gobio:

Pfeiffer, Michael: gobio, Büro für limnologische Gutachten, Weißerlenstraße 2, 79108 Freiburg-Hochdorf, pfeiffer@gobio-online.de, Tel.: 0761 / 88 88 1750

Nagel, Karl-Otto: Dr.-Gremmelsbacher-Str. 6, 79199 Kirchzarten, konagel@gmx.de

Herzlichen Dank für wichtige Hinweise und Diskussion:

Busch, Christiane: Andrena Landschaftsökologie und Naturschutz, Burgweg 11, 97956 Werbach-Gamburg

Dr. Neumann, Hasko F.: Im Obergarten 9, 65719 Hofheim am Taunus

Rosenbauer, Annette: Seehofweg 62, 71522 Backnang

Teiber-Sissegger, Petra: Argenweg 50/1, 88085 Langenargen

KONTAKT***gobio*****Büro für limnologische Gutachten**

Dipl.-Biol. Michael Pfeiffer
Weißerlenstraße 2
79108 Freiburg-Hochdorf

Telefon: 0761 / 88 88 1750
E-Mail: pfeiffer[at]gobio-online.de
Internet: <http://www.gobio-online.de/>

Anodonta anatina

Lebendnachweise

- nach 2020
- nach 1990

Schalenfunde

- nach 2020
- nach 1990

Frühere Funde

- bis 1990
- bis 1960
- bis 1930




Abb. 4: Historische und aktuelle Verbreitung von *Anodonta anatina* in Baden-Württemberg. (Kartenerstellung: Magnus Leschner – Büro gobio, © Büro gobio, Stand 08.01.2026).




Abb. 5: Vorkommen von *Anodonta anatina* im Gebiet um Kirchberg/Jagst. Kartengrundlage: basemap.de (Kartenerstellung: Magnus Leschner – Büro gobio, © Büro gobio, Stand 08.01.2026).

Literatur

1. Schutzstatus und Gefährdungsgrad

ARBEITSGRUPPE MOLLUSKEN BW (am Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart) (2008): Naturschutz-Praxis, Artenschutz 12: Rote Liste und Artenverzeichnis der Schnecken und Muscheln Baden-Württembergs (zweite, neu bearbeitete Fassung, Bearbeitungsstand Dezember 2006). - LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.). 185 S.

KILLEEN, I. & VAVROVA, L. (2011): *Anodonta anatina* (Europe assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T155667A4818080. Accessed on 28 February 2024.

JUNGBLUTH, J.H. & VON KNORRE, D. (2009) (Mitarbeit: BÖBNECK, U., GROH, K., HACKENBERG, E., KOBIALKA, H., KÖRNIG, G., MENZEL-HARLOFF, H., NIEDERHÖFER, H.-J., PETRICK, S., SCHNIEBS, K., WIESE, V., WIMMER, W. & ZETTLER, M.L.): Rote Liste der Binnenmollusken [Schnecken (Gastropoda) und Muscheln (Bivalvia)] in Deutschland. 6. revidierte und erweiterte Fassung 2008. - Mitteilungen der deutschen malakozoologischen Gesellschaft 81: 1-28, Frankfurt a.M.

LOPES-LIMA, M. (2014): *Anodonta anatina*. The IUCN Red List of Threatened Species 2014: e.T155667A21400363. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T155667A21400363.en>. Accessed on 28 February 2024.

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, FFH) mit Anhang II: "Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen" Anhang IV: Neben dem direkten Tötungsverbot dürfen deren "Lebensstätten" nicht beschädigt oder zerstört werden. Zudem dürfen diese Arten auch nicht in der

Fortpflanzungs- Wanderungs- und Winterruhezeit gestört werden und Anhang V: "Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus der Natur und Nutzung Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein können". (kein Eintrag)

Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) geändert worden ist.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, Kabinettsbeschluss vom 7. November 2007. (kein Eintrag unter "Verantwortungsarten auf <https://biologischevielfalt.bfn.de>, abgerufen am 3.3.2018)

Verordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Durchführung des Fischereigesetzes für Baden-Württemberg (Landesfischereiverordnung - LFischVO -) vom 3. April 1998, zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. April 2016 (GBl. S. 266).

2. Fachliteratur

BAUMGÄRTNER, D. & HEITZ, S. (1995): Großmuscheln. Lebensweise, Gefährdung und Schutz. - In: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (Hrsg.): Arbeitsblätter zum Naturschutz 21: 1-39, Karlsruhe.

HINZMANN, M., LOPES-LIMA, M., TEIXEIRA, A., VARANDAS, S., SOUSA, R., LOPES, A., FROUFE, E. & MACHADO, J. (2013): Reproductive cycle and strategy of *Anodonta anatina* (L., 1758): Notes on hermaphroditism. J. Exp. Zool. 319A: 378–390.

KRYGER, J. & RIISGARD, H.U. (1989): Filtration rate capacities in 6 species of European freshwater bivalves. - Oecologia 77: 34-38.

NAGEL, K.-O. (2009): Lebensweise und Verbreitung unserer Großmuscheln.- VDSF – Schriftenreihe Fischerei und Gewässerschutz Nr. 4/2009: 23-37.