

Die Malermuschel, *Unio pictorum* (LINNAEUS 1758), in Baden-Württemberg

Text: Dr. Karl-Otto Nagel & Michael Pfeiffer

<http://www.gobio-online.de/forschung.php>, Bearbeitungsstand Januar 2026

Gefährdungsstatus

International:	nicht gefährdet
Europäische Union:	nicht gefährdet
Deutschland:	Vorwarnliste
Baden-Württemberg:	gefährdet

Schutzstatus

Deutschland:	besonders geschützt
Baden-Württemberg:	ganzjährige Schonzeit



Merkmale der Art

Die Malermuschel (*Unio pictorum*) besitzt eine schmal zungenförmige Schale, die mehr als doppelt so lang wie hoch ist. Der Unterrand verläuft im mittleren Teil gestreckt und weitgehend parallel zum Oberrand. Das Hinterende der Schale endet in einer abgerundeten Spitze. Die Schalenklappen sind mäßig verdickt und in der Regel nur wenig gewölbt. Die Grundfarbe der Außenseite ist gelb, dabei reichen die Tönungen von blassgelb bis braun, gelegentlich sind auch Grüntöne vorhanden. Das Schalenschloss besteht aus meist dünnen Haupt- und Seitenzähnen, jeweils zwei in der linken und einem in der rechten Klappe. Die vor dem Wirbel gelegenen Hauptzähne sind gestreckt, dabei ist der Hintere in der linken Schalenklappe oft stark reduziert; die lamellenartigen Seitenzähne sind gerade. Die Wirbelskulptur besteht aus wenigen, in zwei Reihen angeordneten, knotigen Höckerchen. Diese können auch fast ganz reduziert oder aber im Laufe der Zeit wegerodiert sein. Die Malermuschel erreicht Längen von 7 - 10 cm, gelegentlich auch bis 14 cm. Die Art ist in Größe und Umriss recht variabel und bildete in vielen Gewässern typische Formen aus. Doch heute lassen sich kaum noch charakteristische Schalenmerkmale für größere geographische Gebiete erkennen, so dass bei der Malermuschel meist keine Unterarten mehr unterschieden werden.

Allgemeine Verbreitung und historische Nachweise aus Baden-Württemberg

Das gesicherte Verbreitungsgebiet der Malermuschel umfasst das Einzugsgebiet des Rheins im Westen und reicht ostwärts über Nordwest- und Mitteleuropa sowie Teile Skandinaviens bis nach Osteuropa zum Ural und ins westliche Anatolien. In Frankreich wurde die Art in allen Stromgebieten genetisch nachgewiesen, aber es ist oft nicht möglich, sie nach Schalenmerkmalen von ihrer Schwesterart, der Südlichen Malermuschel (*Unio manicus* LAMARCK 1819) zu unterscheiden. Die Malermuschel fehlt in Italien, auf der Iberischen Halbinsel und in den Mittelmeereszuflüssen auf dem Balkan.

Aktuelle Verbreitung in Baden-Württemberg

Die Bestände von *Unio pictorum* gehen vor allem in den Fließgewässern des Landes seit Jahren nachweislich zurück. Im Rhein bei Breisach ist sie nach eigenen Beobachtungen in den vergangenen Jahren nach und nach verschwunden, aktuell lassen sich nur noch alte Leerschalen finden (Abb. 1). Auch in einigen Flüssen, Bächen und Gräben am Mittleren Oberrhein ist die Art nach eigenen Beobachtungen stark rückläufig. Größere, d.h. langfristig überlebensfähige Vorkommen in Fließgewässern gibt es derzeit nur noch abschnittsweise im Rhein im Retentionsraum des

Kulturwehrs Kehl, in der Donau bei Ulm, im Mittelauf des Kochers, im Unterlauf der Tauber und im Oberlauf der Jagst (das erst 2010 entdeckte und hier abgebildete Vorkommen in einem kleinen Altarm der Jagst bei Kirchberg/Jagst ist inzwischen allerdings erloschen (Abb. 2)). Zudem ist die Art in einigen Baggerseen in der Rheinebene, aber auch in einzelnen Seen in Oberschwaben vorhanden.



Abb. 1: Alte Leerschalen der Malermuschel, gefunden von M. Pfeiffer am Rhein bei Breisach im Jahr 2014 (Bildautor: M. Mildner, 04.02.2019).



Abb. 2: Malermuscheln aus dem Jagst-Altarm „Eislache“ in Kirchberg/Jagst (Bildautor: M. Pfeiffer, 21.06.2010).

Wissenswertes

Die Malermuschel ist eine sehr anpassungsfähige Art, die sowohl in Fließ- als auch in Stillgewässern vorkommt. Geeignete Lebensräume findet sie in Flüssen und Strömen, aber auch noch in großen Bächen ebenso wie in Seen, Teichen, Altwässern und Abgrabungsgewässern, wo sie bevorzugt auf Sand- und Schlammgrund anzutreffen ist. Malermuscheln können 10 - 15 Jahre alt werden, gelegentlich auch über 20 Jahre. Die Tiere sind überwiegend getrenntgeschlechtlich, aber es gibt auch Zwitter. Die Fortpflanzungszeit liegt in den Monaten April bis Juli. Wie vermutlich bei allen Arten der Gattung *Unio* sind die Weibchen in der Lage, in einer Saison mehrmals hintereinander Eier in ihre Brutkiemen (Marsupien) abzugeben, abhängig von der Größe des Tieres über 200.000 Stück. Innerhalb von 3 - 6 Wochen reifen die Eier in den Brutkiemen zu den nur 0,2 mm großen Larven (Glochidien) heran. Anschließend verbringen die Larven wenige Wochen im Epithel von Kiemen oder Haut der Wirtsfische, wo sie sich, noch ohne zu wachsen, zur fertigen Muschel entwickeln (Metamorphose). Geeignete Wirtsfische für die Larven der Malermuschel sind u. a. Döbel, Rotaugen, Rotfeder, Gründling, Schleie, Flussbarsch und Dreistachliger Stichling. Nach einigen Wochen verlassen die jungen Muscheln ihren Wirt und leben teilweise oder vollständig eingegraben als Filtrierer am Grunde der Gewässer.

Forschungs- und Handlungsbedarf in Baden-Württemberg

Wie bei allen einheimischen Großmuschelarten gilt auch hier, dass bisher noch längst nicht alle potenziellen Lebensräume der Malermuschel gezielt untersucht wurden und große Wissenslücken bestehen. Die Auswertung der verfügbaren Daten weisen aber auf große Verluste in den letzten 20 Jahren hin. Es ist davon auszugehen, dass die Gefährdungskategorie auf der Roten Liste nicht mehr aktuell ist und der Schutz der Malermuschel in Baden-Württemberg dringend angegangen werden muss. Lebensraumverlust, Gewässerverschmutzung sowie Veränderungen der Fischzönosen oder einfache bauliche Eingriffe in die Gewässer (temporäre Trockenlegung, Gewässerunterhaltung) dürften für den Bestandsrückgang verantwortlich sein. Invasive Nager und Flusskrebse als Fressfeinde der jungen und erwachsenen Muscheln spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Ein bedeutender Prädator ist der Bisam (Abb. 3), dessen Bekämpfung seit Jahrzehnten zum Schutz der Muscheln gefordert wird. Bei Eingriffen in die Lebensräume sind die Vorkommen durch eine ökologische Baubegleitung zu sichern, doch bislang fehlen klar definierte Handlungsanweisungen (inkl. Dokumentationspflicht) von Seiten der zuständigen Behörden für alle Großmuscheln.



Abb. 3: Fraßplatz des Bismas in der Altmühl (Bayern) mit Schalen von *Unio crassus*, *Unio pictorum* und *Anodonta anatina*. (Bildautor: K.-O. Nagel, 11.09.2012).

Hinweise zur Verbreitungskarte

Für die Erstellung der Karte (Abb. 4) wurden 486 Datensätze zu *Unio pictorum* in Baden-Württemberg ausgewertet (Stand Januar 2026).

Unsere Verbreitungskarte soll vor allem den zuständigen Behörden und Ämtern (Naturschutzbehörden, Unterhaltungsträger) helfen, die Situation in ihrem Gebiet einzuschätzen. Es besteht auf Anfrage bei uns die Möglichkeit, detaillierte Informationen zu erhalten.

Die blauen Vierecke stellen die aktuell bekannten Fundstellen lebender *Unio pictorum* seit dem Jahr 2020 dar, die grünen Vierecke Lebendfunde von 1990 bis 2019. Hellblaue und grüne Punkte sind Schalenfunde neueren Datums (nach 1990). Rote, orange und gelbe Punkte stellen frühere Funde (Lebend- oder Schalenfunde) der Malermuschel dar.

Jeder kann mitmachen: Hinweise und Verdachtsfälle können Sie gerne bei uns melden. Wir werden den Hinweisen nachgehen und die Karte aktualisieren.

Fragen und Hinweise an gobio:

Pfeiffer, Michael: gobio, Büro für limnologische Gutachten, Weißerlenstraße 2, 79108 Freiburg-Hochdorf, pfeiffer@gobio-online.de, Tel.: 0761 / 88 88 1750

Nagel, Karl-Otto: Dr.-Gremmelsbacher-Str. 6, 79199 Kirchzarten, konagel@gmx.de

Herzlichen Dank für Daten, Hinweise und Diskussion:

Busch, Christiane: Andrena Landschaftsökologie und Naturschutz, Burgweg 11, 97956 Werbach-Gamburg

Groh, Klaus: Hinterbergstr. 15, 67098 Bad Dürkheim

Grom, Josef., Volgelsangweg 22, 88499 Altheim

Maier, Gerhard: Büro für Gewässerökologie, Brucknerstr. 23, 89250 Senden

Megerle, Achim: Ziegelsteige 42, 74670 Forchtenberg.

Nesemann, Hasko F.: Im Obergarten 9, 65719 Hofheim am Taunus

Richling, Ira: Naturkundemuseum Stuttgart, Rosenstein 1, 70191 Stuttgart

Rosenbauer, Annette: Seehofweg 62, 71522 Backnang

KONTAKT

gobio

Büro für limnologische Gutachten

Dipl.-Biol. Michael Pfeiffer
Weißerlenstraße 2
79108 Freiburg-Hochdorf

Telefon: 0761 / 88 88 1750
E-Mail: [pfeiffer\[at\]gobio-online.de](mailto:pfeiffer[at]gobio-online.de)
Internet: <http://www.gobio-online.de/>

Unio pictorum

Lebendnachweise

- nach 2020
- nach 1990

Schalenfunde

- nach 2020
- nach 1990

Frühere Funde

- bis 1990
- bis 1960
- bis 1930




Abb. 4: *Unio pictorum* in Baden-Württemberg. Aktuelle und historische Verbreitung (Kartenerstellung: Magnus Leschner – Büro gobio, © Büro gobio, Stand 08.01.2026).

Literatur

1. Schutzstatus und Gefährdungsgrad

VAN DAMME, D. (2011): *Unio pictorum*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2011: e.T155543A4795613. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-2.RLTS.T155543A4795613.en>. Accessed on 28 February 2024.

VAVROVA, L. (2011): *Unio pictorum (Europe assessment)*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2011: e.T155543A4796089. Accessed on 28 February 2024.

JUNGBLUTH, J.H. & VON KNORRE, D. (2009) (Mitarbeit: BÖBNECK, U., GROH, K., HACKENBERG, E., KOBIALKA, H., KÖRNIG, G., MENZEL-HARLOFF, H., NIEDERHÖFER, H.-J., PETRICK, S., SCHNIEBS, K., WIESE, V., WIMMER, W. & ZETTLER, M.L.): Rote Liste der Binnenmollusken [Schnecken (Gastropoda) und Muscheln (Bivalvia)] in Deutschland. 6. revidierte und erweiterte Fassung 2008. - Mitteilungen der deutschen malakozoologischen Gesellschaft 81: 1-28, Frankfurt a.M.

ARBEITSGRUPPE MOLLUSKEN BW (am Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart) (2008): Naturschutz-Praxis, Artenschutz 12: Rote Liste und Artenverzeichnis der Schnecken und Muscheln Baden-Württembergs (zweite, neu bearbeitete Fassung, Bearbeitungsstand Dezember 2006). - LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.). 185 S.

Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) geändert worden ist.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, Kabinettsbeschluss vom 7. November 2007 (kein Eintrag unter "Verantwortungsarten auf <https://biologischevielfalt.bfn.de>, abgerufen am 23.4.2018)

Verordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Durchführung des Fischereigesetzes für Baden-Württemberg (Landesfischereiverordnung - LFischVO -) vom 3. April 1998, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 1. April 2016 (GBl. S. 266).

2. Fachliteratur

ARAUJO, R., BUCKLEY, D., NAGEL, K.-O., GARCÍA-JIMÉNEZ, R. & MACHORDOM, A. (2018): Species boundaries, geographic distribution and evolutionary history of the Western Palearctic freshwater mussels *Unio* (Bivalvia, Unionidae) - *Zoological Journal of the Linnean Society* 182: 275-299, London.

BAUMGÄRTNER, D. & HEITZ, S. (1995): Großmuscheln. Lebensweise, Gefährdung und Schutz. - In: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (Hrsg.): Arbeitsblätter zum Naturschutz 21: 1-39, Karlsruhe.

LOPES-LIMA, M., GÜRLEK, M.E., KEBAPÇI, Ü., ŞEREFLİŞAN, H., YANIK, T., MIRZAJANI, A., NEUBERT, E., PRIÉ, V., TEIXEIRA, A., GOMES-DOS-SANTOS, A., BARROS-GARCÍA, D., BOLOTOV, I.N., KONDAKOV, A.V., VIKHREV, I.V., TOMILOVA, A.A., ÖZCAN, T., ALTUN, A., GONÇALVES, D.V., BOGAN, A.E. & FROUFE, E. (2021): Diversity, biogeography, evolutionary relationships, and conservation of Eastern Mediterranean freshwater mussels (Bivalvia: Unionidae). - *Molecular Phylogenetics and Evolution* 163: 107261.

NAGEL, K.-O. (2009): Lebensweise und Verbreitung unserer Großmuscheln.- VDSF – Schriftenreihe Fischerei und Gewässerschutz Nr. 4/2009: 23-37.

PRIÉ, V. & PUILLANDRE, N. (2014): Molecular phylogeny, taxonomy, and distribution of French *Unio* species (Bivalvia, Unionidae). - *Hydrobiologia* 735: 95-110, Dordrecht u.a.

http://fisch.wzw.tum.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Merkblatt_Malermuschel.pdf