# Respuestas y notas para conversar

Comparar conjuntos de datos con la DAM

### Lo que aprende tu estudiante

Esta noche usamos la DMA — desviación media absoluta — para comparar dos grupos que tienen el MISMO promedio pero no se comportan igual.

## Respuestas

Pidan a su estudiante que explique antes de mirar.

1. **A.** Dispersos lejos de la media. Una DMA grande significa que los valores están dispersos lejos de la media. Entonces la respuesta es: Dispersos lejos de la media.
2. **B.** El conjunto B está más disperso que el A, aunque tienen la misma media. Los valores de B están a 9 de 10 y los de A a 1, así que el conjunto B está más disperso que el A, aunque tienen la misma media.
3. **C.** 2. Las distancias son 3, 1, 1, 3. Su suma es 8 y 8 ÷ 4 = 2.
4. **A.** 4. Las distancias son 6, 2, 2, 6. Su suma es 16 y 16 ÷ 4 = 4.
5. **B.** El conjunto N varía más porque su DMA es mayor. Una DMA mayor significa más variación, así que el conjunto N varía más porque su DMA es mayor.

### Conversen

Las medias coinciden. ¿Cómo muestra la DMA la diferencia?

### Misión en casa

Dos rutas de autobús tienen un promedio de 20 minutos. La ruta 1 tarda 19, 20, 20, 21. La ruta 2 tarda 10, 15, 25, 30. Pregunten a su estudiante qué ruta querría en una mañana de escuela, y por qué.

### Cuando se atoren, pregunten

- ¿Qué tan lejos está este valor de la media? Las distancias no pueden ser negativas. Un valor igual a la media tiene una distancia de 0.
- ¿Promediaste las distancias, o los valores originales?
- Misma media — ¿eso significa que los dos conjuntos se ven iguales?

### Eviten decir

- Suma las desviaciones con sus signos negativos, ya se acomodarán.
- Si las medias coinciden, los conjuntos de datos coinciden.
- Una DMA de 0 solo significa que lo hiciste rápido.