Respuestas y notas para conversar

Lados faltantes y fraccionarios

Lo que aprende tu estudiante

Esta noche trabajamos la fórmula del volumen al revés para hallar una arista que falta — y mantenemos exactas las aristas fraccionarias en vez de redondearlas.

Respuestas

Pidan a su estudiante que explique antes de mirar.

1. **C.** Multiplicar 5 × 3. Multiplica 5 × 3 para obtener el área de la base y luego divide el volumen entre ella.
2. **A.** 2 cm. 2 cm: el área de la base es 4 × 3 = 12 y 24 ÷ 12 = 2.
3. **B.** 4 pulg.. 4 pulg.: 72 ÷ 18 = 4.
4. **D.** 9 pies cúbicos. 9 pies cúbicos: 2 × 3 = 6 y 6 × 1.5 = 9.
5. **B.** 3 cm. 3 cm: 5 × 3 = 15 y 45 ÷ 15 = 3.
6. **A.** 4 pulgadas cúbicas. 4 pulgadas cúbicas: lo exacto es 4 × 2 × 2.5 = 20, lo redondeado es 4 × 2 × 2 = 16 y 20 − 16 = 4.

Conversen

¿Cómo hallan una arista que falta cuando conocen el volumen y las otras dos aristas?

Misión en casa

Elijan una caja pequeña. Imaginen que su volumen es 100 centímetros cúbicos y dos aristas miden 5 cm y 4 cm. ¿Puede su estudiante hallar la tercera arista y comprobar multiplicando las tres?

Cuando se atoren, pregunten

- ¿Cuántas aristas usa la fórmula? ¿Las usaste todas?
- ¿Cuánto da la multiplicación de las dos aristas que conoces?
- ¿Redondeaste una fracción? Vuelve a poner el valor exacto.

Eviten decir

- Suma las tres aristas para obtener el volumen.
- Redondea el medio pie, no va a importar.
- Con dos aristas basta para una caja.