Respuestas y notas para conversar

Comparar la variabilidad

Lo que aprende tu estudiante

Esta noche usamos el rango y el rango intercuartílico juntos para decir cuál de dos grupos es más constante.

Respuestas

Pidan a su estudiante que explique antes de mirar.

1. **A.** Más juntos, así que más consistentes. Menor dispersión significa que los valores están más juntos, así que los datos son más consistentes. Entonces la respuesta es: Más juntos, así que más consistentes.
2. **B.** La clase B. 12 es menor que 20, así que la clase B es más consistente.
3. **C.** El equipo S. 10 es mayor que 6, así que el equipo S tiene la mitad del medio más dispersa.
4. **D.** Rango 40, RIC 12. Rango = 90 − 50 = 40 y RIC = 70 − 58 = 12, así que Rango 40, RIC 12.
5. **A.** X tiene el rango mayor, y Y tiene el RIC mayor. 30 > 25, así que X tiene el rango mayor. 14 > 10, así que Y tiene el RIC mayor. Entonces la respuesta es: X tiene el rango mayor, y Y tiene el RIC mayor.

Conversen

¿El rango y el RIC señalan al mismo equipo? ¿Qué les dice eso?

Misión en casa

Piensen en dos maneras de llegar a la escuela o a la tienda. ¿Cuál tarda casi siempre lo mismo? ¿Cuál a veces es rápida y a veces lenta? ¿Cuál tiene la dispersión menor?

Cuando se atoren, pregunten

- ¿Esta medida es una resta? ¿Cuáles dos números estamos restando?
- ¿Podría la mitad central ser más ancha que el conjunto completo?
- ¿Los números de qué equipo están más juntos?

Eviten decir

- Suma los cuartiles para hallar el RIC.
- Un rango más grande siempre es mejor.
- El rango y el RIC significan lo mismo, solo escoge uno.