Respuestas y notas para conversar

Conversiones de varios pasos y dosis

Lo que aprende tu estudiante

Esta noche resolvemos problemas que necesitan DOS pasos en orden: convertir a la unidad que usa la tasa, y solo entonces aplicar la tasa.

Respuestas

Pidan a su estudiante que explique antes de mirar.

1. **D.** 60. 20 × 3 = 60, así que la dosis es 60 mg.
2. **A.** 20. 44 ÷ 2.2 = 20, así que 44 libras son aproximadamente 20 kilogramos.
3. **B.** Cambiar 55 libras a kilogramos. Cambiar 55 libras a kilogramos primero, porque la tasa es por kilogramo.
4. **C.** 15. 33 ÷ 2.2 = 15, así que el perro pesa aproximadamente 15 kilogramos.
5. **A.** 50. 25 × 2 = 50, así que la dosis es 50 mg.

Conversen

¿Por qué deben cambiar la unidad antes de usar la tasa?

Misión en casa

Busquen una bolsa de arroz o harina marcada en libras. Imaginen una tasa inventada: 2 mg por cada 1 kilogramo. Pregunten a su estudiante qué paso va primero. Las dosis reales siempre las dan un veterinario o un médico.

Cuando se atoren, pregunten

- ¿Qué unidad usa la tasa? ¿Ya estamos en esa unidad?
- ¿Qué paso tiene que ir primero, y por qué?
- ¿Qué unidad tiene tu respuesta final?

Eviten decir

- Multiplica por la tasa primero, convierte al final.
- 5 kilómetros y 5 millas son casi lo mismo.
- Deja fuera la unidad, todos saben cuál es.