2024年向日葵主要病虫害防控技术方案

日期：2024-03-13 来源：病虫害防治处 【字体：大 中 小】 打印本页

向日葵在生产中需要加强防控的主要病虫害有菌核病、黄萎病、锈病、向日葵列当、向日葵螟、棉铃虫、花蓟马、草地螟。为做好2024年向日葵病虫害防控工作，保障向日葵安全生产，特制定本方案。

一、防控目标

防治处置率90%以上，综合防治效果80%以上，病虫危害损失率控制在8%以内，绿色防控覆盖率达到55%以上。

二、防控策略

坚持“因地制宜、分区施策、分类指导”的原则，协同推进绿色防控、统防统治，适时组织应急防治，抓住重点地区、主要病虫，在关键时期指导开展综合防治，提高防控效果。

三、防控重点及技术措施

（一）分区防控重点

1．新疆、甘肃产区

以黄萎病、菌核病、白锈病、向日葵列当、棉铃虫、向日葵螟、花蓟马、盲蝽蟓、地下害虫为主。

2．内蒙古、宁夏、陕西、山西产区

以黄萎病、菌核病、花蓟马、向日葵列当、向日葵螟、草地螟、霜霉病为主。

3．黑龙江、吉林、河北产区

以盘腐型菌核病、黄萎病、黑斑病、褐斑病、锈病、向日葵列当、地下害虫为主。

（二）不同生育期的重点防治对象

1．幼苗期。新疆、甘肃产区以防治菌核病、地下害虫为主。内蒙古、宁夏、陕西、山西产区以防治黄萎病、菌核病、地下害虫为主。黑龙江、吉林、河北产区以防治锈病、地下害虫为主。

2．现蕾期。新疆、甘肃产区以防治菌核病、地下害虫为主。内蒙古、宁夏、陕西、山西产区以防治向日葵螟、黄萎病、花蓟马、菌核病、霜霉病、向日葵列当、草地螟为主。黑龙江、吉林、河北产区以防治盘腐型菌核病、黄萎病、黑斑病、褐斑病、锈病、地下害虫为主。

3．开花期。新疆、甘肃产区以防治菌核病、黄萎病、向日葵列当、花蓟马、棉铃虫、盲蝽蟓、向日葵螟为主。内蒙古、宁夏、陕西、山西产区以防治向日葵螟、花蓟马、黄萎病、菌核病、向日葵列当、草地螟为主。黑龙江、吉林、河北

产区以防治盘腐型菌核病、黄萎病、锈病、向日葵列当为主。

4．成熟期。新疆、甘肃产区以防治向日葵列当、棉铃虫、向日葵螟、花蓟马、盲蝽蟓为主。内蒙古、宁夏、陕西、山西产区以防治向日葵螟、菌核病、向日葵列当、草地螟为主。黑龙江、吉林、河北产区以防治向日葵列当为主。

（三）预防技术

1．选用抗（耐）病品种。因地制宜选用抗（耐）菌核病、黄萎病、锈病、向日葵列当等品种，避免种植高（易）感品种。

2．农艺措施。深秋翻，消灭病残体，及时清除田间病残株，减少初侵染源；与禾本科、豆科等作物轮作倒茬和合理间作，清除田间地头藜科等杂草和花蓟马田间寄主植物，有效降低盲蝽蟓越冬虫源，减少草地螟和花蓟马幼虫密度；适时晚播；播种时沟施生物菌肥，增施基肥，适当追肥，提高植株抗病能力。

3．播种期预防。播种前使用药剂进行种子包衣、拌种或浸种，根据不同防治对象选用不同药剂，如咯菌腈、噻虫嗪等。

（四）非化学绿色防控技术

1．昆虫性信息素诱控。在向日葵螟、棉铃虫成虫盛发期，在田间按棋盘式等距离放置性信息素诱捕器25—30枚/hm^2诱杀成虫。

2．理化诱控。向日葵现蕾时，悬挂蓝板诱杀花蓟马，悬挂高度要高于向日葵植株10cm。利用杀虫灯控制向日葵螟、棉铃虫、地下害虫等。棉铃虫可采用食诱装置进行诱杀。

3．生物防治。在向日葵现蕾期、花期，可人工释放东亚小花蝽防治蓟马，释放螟黄赤眼蜂防治向日葵螟和棉铃虫。在向日葵开花初期，针对葵盘进行定向喷施苏云金杆菌可湿性粉剂防治向日葵螟幼虫。

（五）药剂控害技术

1．菌核病。对发生重发生的地块，在初花期选用腐霉利、咯菌腈、小盾壳霉CGMCC8325等药剂防治。

2．锈病。各地试验表明，发病初期喷施三唑酮或丙环唑具有较好效果，可在试验示范的基础上扩大应用范围。

3．向日葵黑斑病。各地试验表明，发病初期及时喷施代森锰锌或百菌清、异菌脲，间隔7—10天，连喷2—3次，具有较好效果，可在试验示范的基础上扩大应用范围。

4．向日葵褐斑病。各地试验表明，发病初期，用多菌灵、甲基硫菌灵等药剂交替使用，间隔7—10天，连喷2—3次。

5．向日葵螟。各地试验表明，在初孵幼虫尚未蛀入花盘前使用溴氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、灭幼脲进行喷雾具有较好效果，可在试验示范的基础上扩大应用范围。

6．棉铃虫。防治方法参照向日葵螟。

7．花蓟马。在苗期到花蕾期可结合其他病虫害防治喷施农药进行防治。

8．草地螟。各地试验表明，在幼虫3龄前向日葵非花期使用溴氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、灭幼脲进行喷雾具有较好效果，可在试验示范的基础上扩大应用范围。

9．盲蝽蟓。各地试验表明，发生严重时可利用高效氯氰菊酯、氟啶虫胺腈等化学药剂进行喷雾防治具有较好效果。由于盲蝽成虫迁飞能力强，防治时尤其注意统筹时间统防统治。

四、注意事项

（一）使用杀虫灯诱杀时注意在害虫成虫羽化高峰期和夜间活跃时段使用。

（二）使用性信息素诱杀技术时应大面积连片统防统治，且不能将不同害虫的诱芯置于同一诱捕器内。

（三）向日葵花期禁止使用诱虫板以免误杀蜜蜂，禁止使用对蜜蜂具有毒性的药剂，施药尽量选择蜜蜂非访时间。

（四）非花期施药宜选择晴天的早上9点之前或下午5点之后施药。

（五）选用向日葵上登记药剂，或选用当地省级农业农村部门提出的临时用药品种，严格执行安全间隔期，注重农药的轮换使用，延缓抗药性产生。

更多精彩内容请关注

今日头条 学习强国 微信公众号 微信视频号 抖音

相关新闻

2024年东北水稻育插秧技术意见	2024-04-12
2024年芸豆生产技术指导意见	2024-04-10
2024年玉米春耕春播技术意见	2024-04-09
2024年青稞生产技术指导意见	2024-04-08
2024年薏苡生产技术指导意见	2024-04-07

体系网站 省级农业农村部门网站 中华人民共和国农业农村部 业务系统 资料下载

关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

您是第 689415 位访客 总访问量 846065 人次
主办单位：全国农业技术推广服务中心
地 址：北京市朝阳区麦子店街20号 邮 编：100125
京ICP备13002323号-1 京公网安备11010502034442

官 方 微 信