2024年大豆玉米带状复合种植病虫害防控技术方案

日期：2024-03-12 来源：病虫害防治处 【字体：大 中 小】 打印本页

为做好大豆玉米带状复合种植模式下的病虫害防控工作，服务稳粮增油重点任务，制定本方案。

一、防控目标

重大病虫防治处置率达到90%以上，总体防治效果达到85%以上，重大病虫危害损失率控制在5%以内，力争玉米不减产，增收一季豆。

二、防治策略

坚持预防为主、综合防治的原则，以间（套）作期大豆玉米密植模式下主要病虫害协同防治为重点，综合应用健康栽培、理化诱控、生物防治和科学用药等技术措施，抓住病虫发生窗口期实施综合防治，合理利用高效植保器械，切实提高防治效果，降低病虫危害损失。

三、防治对象

（一）西南间（套）作种植模式区

大豆：根腐病、锈病、病毒病、炭疽病，斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、大豆蚜、豆秆黑潜蝇、稻绿蝽、豆荚螟、高隆象、地下害虫等；**玉米：**纹枯病、大斑病、灰斑病、茎腐病、穗腐病，草地贪夜蛾、玉米螟、粘虫、蚜虫、地下害虫等。

（二）西北间作模式区

大豆：根腐病、霜霉病、病毒病，棉铃虫、蚜虫、红蜘蛛、大豆食心虫、豆荚螟、地下害虫等；**玉米：**大斑病、茎腐病，棉铃虫、粘虫、玉米螟、双斑长跗萤叶甲、叶螨、地下害虫等。

（三）黄淮海和长江中下游间作模式区

大豆：根腐病、病毒病、拟茎点种腐（茎枯）病、炭疽病，地下害虫、烟粉虱、点蜂缘蝽、甜菜夜蛾、棉铃虫、豆秆黑潜蝇、大豆蚜、大豆食心虫、豆荚螟等；**玉米：**南方锈病、茎腐病、穗腐病、褐斑病、弯孢叶斑病、小斑病，玉米螟、棉铃虫、粘虫、桃蛀螟、蚜虫、蓟马等。

四、全程综合防控技术

加强田间调查监测，及时掌握病虫害发生动态，做到抓早治小。在病虫害防控关键时期，采用自走式喷杆喷雾机、植保无人飞机等喷施高效低风险药剂，提高防控效果。

（一）播种期

选用抗（耐）病虫品种，玉米选择耐密紧凑型、大豆选择耐阴性品种，合理密植。种子处理以防治大豆根腐病、拟茎点种腐病和玉米茎腐病、丝黑穗等土传种传病害，以及地下害虫、蚜虫、蓟马、叶甲等苗期害虫为主，选择含有精甲·咯菌腈、噻呋酰胺、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、吡虫啉等成分的种衣剂。不同区域根据当地主要病虫种类选择相应的药剂。

（二）苗期—玉米喇叭口期（大豆分枝期）

一是理化诱控措施，在玉米螟、棉铃虫、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾等成虫发生期使用杀虫灯、性诱剂、食诱剂诱杀。**二是**生物防治措施，选用苏云金杆菌、球孢白僵菌、核型多角体病毒、金龟子绿僵菌、短稳杆菌等生物制剂防治棉铃虫、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、豆卷叶螟等害虫。**三是**化学防治措施，选用四氯虫酰胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、乙基多杀菌素、茚虫威、噻虫嗪等杀虫剂防治甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、蚜虫、烟粉虱等害虫；选用阿维菌素、唑螨酯、乙螨唑、哒螨灵等杀螨剂防治叶螨；选用吡唑醚菌酯、戊唑醇、香菇多糖、宁南霉素等杀菌剂，可结合使用植物诱抗剂，防治玉米、大豆地上部病害。选用烯效唑、多效唑等生长调节剂控旺，大豆带荫蔽较重地块，花期可加喷一次。

（三）花期（玉米抽雄期）—成熟期

根据玉米大小斑病、南方锈病、褐斑病、钻蛀性害虫，大豆锈病、叶斑病、豆荚螟、大豆食心虫、甜菜夜蛾等发生情况，针对性选用枯草芽孢杆菌、井冈霉素、吡唑·氟环唑、苯甲·嘧菌酯、丙环·嘧菌酯等杀菌剂和氯虫苯甲酰胺、高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、噻虫嗪成分的杀虫剂喷施防治。防治蜗牛、蛞蝓类害虫可撒施四聚乙醛颗粒剂等。防治点蜂缘蝽可用聚集信息素诱捕或喷施噻虫嗪等药剂。采用植保无人飞机施药时要注意添加增效剂、沉降剂，保证每亩药液量。

更多精彩内容请关注

今日头条 学习强国 微信公众号 微信视频号 抖音

相关新闻

全国大豆大面积单产提升技术培训班在内蒙古扎兰屯举办 2026-08-03
2026年华南地区春花生生产技术指导意见 2026-02-03
2026年冬油菜春季管理技术意见 2026-02-02
2025年油菜冬前田间管理技术意见 2025-11-28
江淮冬油菜抗湿应急飞播技术意见 2025-11-10

体系网站 省级农业农村部门网站 中华人民共和国农业农村部 业务系统 资料下载

关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

您是第 700446 位访客 总访问量 858137 人次
主办单位：全国农业技术推广服务中心
地 址：北京市朝阳区麦子店街20号 邮 编：100125
京ICP备13002323号-1 京公网安备11010502034442

官 方 微 信