2024年大豆病虫害防控技术方案

日期：2024-03-12 来源：病虫害防治处 【字体：大 中 小】 打印本页

据全国农技中心预测分析，预计2024年全国大豆病虫害总体中等发生，发生面积1.30亿亩次，重于上年。其中，大豆根腐病、大豆食心虫在东北春大豆区，甜菜夜蛾在黄淮海大豆玉米复合种植区，烟粉虱在黄淮南部有偏重发生风险。为做好2024年大豆病虫防控工作，制定本方案。

一、防控目标

重大病虫防治处置率达到90%以上，绿色防控覆盖率达到54%以上，总体防治效果达到85%以上，重大病虫危害损失率控制在5%以内，保障大豆生产安全和有效供给。

二、防控策略

坚持预防为主、综合防治的原则，以健康栽培为基础，合理利用生态调控、理化诱控、生物防治、科学用药等技术措施，分区施策，切实保障防控技术到位，提高防治效果。

三、防控对象

（一）北方春大豆区

根腐病、胞囊线虫病、菌核病、霜霉病、灰斑病、细菌性斑点病、大豆食心虫、豆荚螟、大豆蚜、红蜘蛛、棉铃虫、苜蓿夜蛾、地下害虫、叶甲等。

（二）黄淮夏大豆区

根腐病、病毒病、拟茎点种腐（茎枯）病、炭疽病、地下害虫、烟粉虱、点蜂缘蝽、甜菜夜蛾、棉铃虫、大豆食心虫、豆荚螟、大豆蚜等。

（三）南方多作大豆区

根腐病、锈病、病毒病、炭疽病、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、豆卷叶螟、豆秆黑潜蝇、高隆象、点蜂缘蝽、稻绿蝽、豆荚螟、地下害虫等。

四、防控措施

（一）播种期。合理轮作，减少重迎茬；选用耐抗病虫品种，做好种子包衣。防治大豆根腐病、胞囊线虫病等根部病害可选用含有精甲·咯菌腈、吡唑醚菌酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐等成分的种子处理剂。防治地下害虫、大豆蚜等苗期害虫可选用含有噻虫嗪、吡虫啉等成分的种子处理剂，蛴螬等地下害虫重发区可选用吡虫啉或金龟子绿僵菌等颗粒剂进行撒施或种肥同播。

（二）苗期至分枝期。根腐病重发区可选用氟环唑、嘧菌酯、精甲霜灵等药剂喷施茎基部。食叶类害虫可选用氯虫苯甲酰胺等药剂喷雾防治；刺吸类害虫可选用吡虫啉、高氯·吡虫啉、噻虫·高氯氟等化学药剂，或苦参碱、阿维菌素等生物农药喷雾。防治病毒病需及时防治刺吸类害虫，阻断其传播病毒，可结合喷施氨基寡糖素等植物诱抗剂进行预防。大面积连片田块可结合使用黄板、灯诱等物理防控技术，监测并诱杀烟粉虱、金龟子和鳞翅目等害虫成虫。

（三）开花至鼓粒期。发病初期喷施唑醚·氟环唑、丙环·嘧菌酯等防治锈病、茎枯病和炭疽病，兼治霜霉病和细菌性斑点病，同时喷施叶面肥、生长调节剂、诱抗剂等，强健植株，预防早衰。防控点蜂缘蝽选用聚集信息素诱捕，并喷施噻虫嗪等药剂，同时兼治其它刺吸式害虫。大豆食心虫、豆荚螟成虫盛发期选用食诱剂、性诱剂诱杀，产卵初期释放赤眼蜂灭卵；初孵幼虫选用苏云金杆菌、氯虫苯甲酰胺、高效氯氟氰菊酯等杀虫剂防治；老熟幼虫开始脱荚入土前，选用球孢白僵菌粉剂均匀撒施于地表防治越冬幼虫。红蜘蛛选用阿维菌素、乙螨唑、哒螨灵等杀螨剂喷雾防治。蜗牛等软体类害虫发生为害时，撒施或喷施四聚乙醛或四聚·杀螺胺等进行防治。

（四）收获期。收获时秸秆粉碎还田，深翻耕耙，降低病虫基数。

五、注意事项

（一）在病虫害发生前期或初期优先选用生物、物理等非化学防治措施，注意保护利用自然天敌和生物多样性。

（二）防治食叶害虫在大豆营养生长期可适当减少化学用药，注重开花结荚鼓粒期的防控。

（三）大豆登记用药品种有限，本方案中提到的药剂仅供参考，根据当地农业农村部门有关规定和指导意见，科学选用药剂，注意合理轮换用药和交替使用。

更多精彩内容请关注

今日头条 学习强国 微信公众号 微信视频号 抖音

相关新闻

全国大豆大面积单产提升技术培训班在内蒙古扎兰屯举办	2026-08-03
2026年华南地区春花生生产技术指导意见	2026-02-03
2026年冬油菜春季管理技术意见	2026-02-02
2025年油菜冬前田间管理技术意见	2025-11-28
江淮冬油菜抗湿应急飞播技术意见	2025-11-10

体系网站 省级农业农村部门网站 中华人民共和国农业农村部 业务系统 资料下载

关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

事业单位

您是第 700447 位访客 总访问量 858141 人次

主办单位：全国农业技术推广服务中心

地 址：北京市朝阳区麦子店街20号 邮 编：100125

京ICP备13002323号-1 京公网安备11010502034442

官 方 微 信