2024年棉花重大病虫害防控技术方案

日期：2024-03-13 来源：病虫害防治处 【字体：大 中 小】 打印本页

据预测，2024年棉蚜、棉叶螨、蓟马、棉铃虫、棉盲蝽、苗病（立枯病、猝倒病、炭疽病等）、黄萎病、铃病（疫病、炭疽病、红腐病等）将在各棉区普遍发生，烟粉虱、斜纹夜蛾、地下害虫（地老虎、蝼蛄、蛴螬等）、枯萎病、红叶茎枯病、甜菜夜蛾等病虫害局部发生。为做好2024年棉花病虫害防控工作，保障棉花生产安全，特制定本方案。

一、防控目标

重大病虫防治处置率达到95%以上，绿色防控覆盖率达到50%以上，专业化防治覆盖率达到45%以上，总体防治效果达到85%以上，病虫危害损失率控制在8%以内。

二、防控策略

突出做好播前和苗期预防、蕾铃期控害。优先采用抗（耐）性品种、种子处理、生态调控、农艺措施、生物防治等技术，充分发挥棉花自身补偿能力和自然天敌持续控害能力；优先选用生物源和环境友好型农药，推行达标用药、精准施药，实现控害保铃保产。推进绿色防控和专业化统防统治，提高防治效益，减少化学农药用量。

三、防控重点

（一）西北内陆棉区。包括新疆、甘肃棉区。重点防治棉蚜、棉叶螨、蓟马、棉盲蝽、棉铃虫、苗病、黄萎病、铃病，密切关注烟粉虱、甜菜夜蛾、枯萎病。

（二）黄河流域棉区。包括河北、山东、河南、天津、山西和陕西棉区。重点防治棉蚜、棉盲蝽、棉铃虫、烟粉虱、棉叶螨、苗病、铃病，密切关注蓟马、甜菜夜蛾、黄萎病、枯萎病。

（三）长江流域棉区。包括江苏、安徽、湖北、江西和湖南棉区。重点防治棉盲蝽、棉叶螨、棉铃虫、棉蚜、斜纹夜蛾、苗病、铃病，密切关注黄萎病、枯萎病、红叶茎枯病、蓟马、烟粉虱、红铃虫、甜菜夜蛾。

四、防控措施

（一）预防控制技术

1. 选用抗（耐）病虫品种。因地制宜选用抗枯萎病、耐黄萎病品种，优先选用抗虫棉兼抗（耐）病性较好的优质高产品种，并适时播种预防苗病。

2. 种子处理。针对苗期主要病虫种类，选用适宜的杀虫剂、杀菌剂进行种子包衣。杀虫剂可选用吡虫啉或噻虫嗪种子处理剂，杀菌剂可选用枯草芽孢杆菌、苯醚甲环唑、咯菌腈、吡唑醚菌酯等，植物生长调节剂可选用芸苔素内酯、赤·吲乙·芸苔、氨基寡糖素等。

3. 生态调控和生物多样性利用。西北内陆棉区在田边和林带下种植苜蓿等植物，保留田埂边碱蓬、苦豆子、甘草、骆驼刺、罗布麻、新疆大蒜芥、顶羽菊等植物带，其他棉区田边或条带种植蛇床草、波斯菊、百日菊等显花植物，引诱、涵养天敌，增强天敌对棉蚜、棉铃虫、棉叶螨和棉盲蝽等害虫的控制能力。棉铃虫常发区棉花套种玉米，地边种植苘麻条带，诱集棉铃虫成虫产卵，集中杀灭。在棉田周边、田埂种植早熟芥菜型油菜、红花、向日葵诱集带可阻隔或集中诱集防治棉蚜、牧草盲蝽等害虫。

4. 天敌保护和利用。一是保护利用自然天敌。棉花生长前期注重保护利用棉田自然天敌，小麦、油菜收获后，秸秆在田间放置2 - 3天，促进瓢虫、草蛉等天敌向棉田转移。苗蚜发生期，当棉田天敌单位（以1头天敌瓢虫、2头蚜狮、4头食蚜蝇、6头蜘蛛、120头蚜茧蜂为1个天敌单位）与蚜虫种群数量比，西北内陆棉区高于1:360时，不施药防治，充分发挥天敌控害作用。二是人工释放天敌。棉铃虫成虫始盛期人工释放卵寄生蜂螟黄赤眼蜂或松毛虫赤眼蜂，每代放蜂2 - 3次，间隔3 - 5天，每次放蜂10000头/亩，降低棉铃虫幼虫量。在棉花叶螨点片发生期，每个中心株挂一袋胡瓜钝绥螨、巴氏新小绥螨等捕食螨，每次释放100000头/亩，控制棉叶螨发生。

5. 理化诱控。棉铃虫越冬代成虫始见期至末代成虫末期，棉田和周边寄主作物田连片使用棉铃虫性诱剂，一是交配干扰，每3亩设置1套高剂量性信息素智能喷施装置，傍晚至日出定时喷施性信息素。二是群集诱杀，每亩设置1个挥散芯和干式飞蛾诱捕器，长江流域棉区斜纹夜蛾常发区，连片使用斜纹夜蛾性诱剂，每亩1个挥散芯和夜蛾型诱捕器，群集诱杀成虫，降低田间落卵量。三是连片施用生物食诱剂，于夜蛾科害虫（棉铃虫、地老虎、甜菜夜蛾等）主害代羽化前1 - 2天，以条带方式滴洒，每隔50 - 80米于1行棉株顶部叶面均匀施药，可诱杀成虫。

6. 农艺措施。清洁田园，棉花收获后及时清除棉秆和病虫残体。秋季深翻，有条件的棉区秋冬灌水保墒，压低病虫越冬基数。清除田边无保育天敌功能的杂草，中耕除草，减少害虫的转移危害。西北棉区合理布局棉田，提倡棉花与冬小麦间作，尽量避免棉花与大面积的春玉米、加工番茄、十字花科作物邻作，并远离集中连片的温室大棚，减少棉铃虫、棉盲蝽、烟粉虱转移为害。

（二）合理用药技术

1. 棉蚜。当益害比低于防治指标时，黄河流域棉区和西北内陆棉区苗蚜3片真叶前卷叶株率达5 % - 10 %时，或4片真叶后卷叶株率10 % - 20 %时，进行药剂点片挑治。伏蚜单株上中下3叶蚜量平均200 - 300头时，全田防治。合理选用氟啶虫胺腈、氟啶虫酰胺·烯啶虫胺、双丙环虫酯、吡蚜酮等药剂交替使用。

2. 棉叶螨。点片发生时或有螨株率低于15%时挑治中心株，有螨株率超过15%时全田防治。药剂选用乙螨唑、阿维菌素等杀螨剂。

3. 蓟马。苗期和蕾期以烟蓟马为主，主要通过噻虫嗪、吡虫啉等种子包衣防治。花铃期以花蓟马为主，可选用金龟子绿僵菌CQMa421、噻虫嗪等喷雾防治。

4. 棉盲蝽。以保蕾保顶尖为重点，达标用药。防治指标：西北内陆棉区以牧草盲蝽为主，百株虫量蕾期12头、花期20头、铃期40头；黄河流域棉区以三点盲蝽、绿盲蝽为主，百株虫量蕾期5头、花铃期10头；长江流域棉区以绿盲蝽、中黑盲蝽为主，新被害率3%或百株虫量5头。由田边向内施药，药剂选用金龟子绿僵菌CQMa421、啶虫脒、噻虫嗪、氟啶虫胺腈等。

5. 棉铃虫。优先选用棉铃虫核型多角体病毒、甘蓝夜蛾核型多角体病毒、短稳杆菌、苏云金杆菌、印楝素、多杀霉素等生物农药，化学农药选用氯虫苯甲酰胺、虱螨脲、茚虫威、氟铃脲等。

6. 苗病。以种子包衣预防为主，选用咯菌腈、精甲霜灵、嘧菌酯等拌种。发病初期尤其是遇低温阴雨天气时及时药剂防治，选用枯草芽孢杆菌、多抗霉素、噁霉灵等喷施。

7. 黄萎病和枯萎病。选用枯草芽孢杆菌种子包衣。苗期至蕾期发病前或发病初期，选用枯草芽孢杆菌、氨基寡糖素、乙蒜素等喷施或随水滴施。

8. 铃病。发病前或初见病时，以花蕾和幼铃为重点喷药预防，或花铃期雨前预防、雨后及时喷药控制，药剂可选用三乙膦酸铝、多抗霉素等。

五、注意事项

（一）优先选用生物农药，注意保护和利用自然天敌。

（二）根据棉蚜、棉叶螨等害虫的抗药性监测结果，合理选用、轮换使用不同作用机理药剂，避免一季多次使用同一药剂。

（三）严格遵守农药使用操作规程，执行农药安全间隔期。

更多精彩内容请关注

今日头条 学习强国 微信公众号 微信视频号 抖音

相关新闻

2024年东北水稻育插秧技术意见 2024-04-12
2024年芸豆生产技术指导意见 2024-04-10
2024年玉米春耕春播技术意见 2024-04-09
2024年青稞生产技术指导意见 2024-04-08
2024年薏苡生产技术指导意见 2024-04-07

您是第 689392 位访客 总访问量 846041 人次
主办单位：全国农业技术推广服务中心
地 址：北京市朝阳区麦子店街20号 邮 编：100125
京ICP备13002323号-1 京公网安备11010502034442

官 方 微 信