2024年花生病虫害防控技术方案

日期：2024-03-13 来源：病虫害防治处 【字体：大 中 小】 打印本页

为指导各地开展花生绿色生产，提高病虫害绿色防控技术应用水平，保障花生生产安全和质量安全，制定本方案。

一、防控目标

花生大面积集中种植区主要病虫害防治处置率85%以上，综合防治效果80%以上，病虫危害损失率控制在8%以内，绿色防控覆盖率54%以上。

二、防控策略

贯彻“预防为主，综合防治”的植保方针，优化田间生态系统，推广抗（耐）病虫品种、健康栽培、理化诱控、生物防治等技术措施，科学使用高效低风险农药，推进花生病虫害可持续治理，保障花生生产安全和质量安全。

三、防控对象

病害：根腐病、茎腐病、白绢病、冠腐病、果腐病、褐斑病、黑斑病、网斑病、锈病、青枯病、疮痂病、病毒病、根结线虫病等。

虫害：地下害虫、棉铃虫、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、蚜虫、蓟马、叶螨等。

四、防控技术措施

（一）播种期

因地制宜与玉米等禾本科作物轮作，适时深耕。选用抗（耐）病虫抗逆的优质高产品种，适时播种，合理密植。根据土传病害、地下害虫、刺吸性害虫的发生情况，选用咯菌腈、精甲·咯·嘧菌等杀菌剂和吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺等杀虫剂合理混配进行种子处理。拌种时可加入芸苔素内酯、吲哚丁酸或糠氨基嘌呤等植物生长调节剂或氨基寡糖素等免疫诱抗剂，促进植株生长发育，增强抗逆抗病虫能力。播种时可沟施球孢白僵菌、金龟子绿僵菌防治地下害虫。

（二）苗期

在茎腐病、根腐病、冠腐病等发病初期选用四霉素、噻呋·戊唑醇、噻呋·吡唑酯等杀菌剂喷施植株茎基部；蚜虫、蓟马、叶螨等刺吸性害虫选用阿维菌素、溴氰菊酯等杀虫剂喷雾防治，同时预防虫传病毒病；蛴螬、金针虫、地老虎可选用高效氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯喷淋灌根，也可用毒死蜱颗粒剂拌沙土撒施。

（三）开花下针至饱果成熟期

在褐斑病、黑斑病、网斑病、锈病等叶部病害发生初期，选用枯草芽孢杆菌、多抗霉素等生物农药或选用唑醚·氟环唑、吡唑醚菌酯、苯甲·嘧菌酯等化学药剂喷雾防治；花生封垄前，选用枯草芽孢杆菌、噻呋酰胺、氟胺·嘧菌酯、噻呋·戊

唑醇或氟酰胺等杀菌剂喷淋花生茎基部，防治白绢病、根腐病、茎腐病、果腐病。注意合理排灌，保持适宜田间湿度。

在棉铃虫、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、蛴螬、地老虎等成虫发生期，使用杀虫灯、性诱剂、食诱剂等诱杀成虫。食叶类害虫低龄幼虫期，选用苏云金杆菌、核型多角体病毒、灭幼脲等生物制剂喷雾防治，化学防治选用溴氰菊酯等杀虫剂喷雾；花生荚果期选用辛硫磷颗粒剂或噻虫嗪颗粒剂防治蛴螬等地下害虫。

对植株密、长势旺的花生田，开花下针期合理使用烯效唑、调环酸钙或多唑·甲哌鎓等植物生长调节剂控旺。

五、注意事项

（一）在病虫害发生初期优先选用生物、物理等非化学防治措施，注意保护利用自然天敌。

（二）使用性诱剂诱杀宜大面积连片使用，且不能将不同害虫的诱芯置于同一诱捕器内。

（三）使用灯光诱杀应在害虫成虫羽化高峰期和夜间活跃时段使用，尽量减少对天敌和非靶标生物影响。

（四）花生登记用药品种有限，本方案中提到的药剂仅供参考，根据当地农业农村部门有关规定和指导意见，科学选用药剂，注意合理轮换用药和交替使用。

更多精彩内容请关注

今日头条 学习强国 微信公众号 微信视频号 抖音

相关新闻

2024年东北水稻育插秧技术意见	2024-04-12
2024年芸豆生产技术指导意见	2024-04-10
2024年玉米春耕春播技术意见	2024-04-09
2024年青稞生产技术指导意见	2024-04-08
2024年薏苡生产技术指导意见	2024-04-07

体系网站 省级农业农村部门网站 中华人民共和国农业农村部 业务系统 资料下载

关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

您是第 689430 位访客 总访问量 846081 人次
主办单位：全国农业技术推广服务中心
地 址：北京市朝阳区麦子店街20号 邮 编：100125
京ICP备13002323号-1 京公网安备11010502034442

官 方 微 信