2026年小麦春季重大病虫害防控技术方案

日期：2026-03-16 来源：病虫害防治处 【字体：大 中 小】 打印本页

受去年秋汛影响，大部分麦区晚播。入春以来，各地气温起伏较大，田间苗情复杂，利于纹枯病、条锈病、茎基腐病发生。据全国农技中心预测，2026年全国小麦重大病虫害总体偏重发生。赤霉病在长江中下游及黄淮南部麦区流行风险高；条锈病在西南和汉水流域局部麦区中等发生；茎基腐病在黄淮北部和华北南部局部麦区偏重发生；蚜虫在黄淮海局部麦区偏重发生。为有效控制病虫危害，支撑小麦大面积单产提升，特制定本方案。

一、防控策略

坚持因地制宜、分区施策、分类指导，根据苗情、病虫情、天气及重点区域，针对性提出防控方案，突出预防控制、绿色防控、统防统治，防病虫提单产和促壮苗保品质同步推进，确保病虫危害损失率控制在5%以内。

二、重点防控对象

（一）华北麦区。以茎基腐病、纹枯病、白粉病和蚜虫为主，兼顾锈病、赤霉病、麦蜘蛛和吸浆虫等病虫。

（二）黄淮麦区。以赤霉病、茎基腐病、条锈病、纹枯病、蚜虫、麦蜘蛛等病虫为主，兼顾白粉病、叶锈病、根腐病等病害。黄淮南部麦区注意预防黄花叶病毒病。

（三）长江中下游麦区。以赤霉病、纹枯病、蚜虫为主，兼顾锈病、白粉病、麦蜘蛛等病虫。

（四）西北麦区。以条锈病、茎基腐病、赤霉病、蚜虫为主，兼顾白粉病、麦蜘蛛等病虫；新疆麦区春季注意防控雪霉叶枯病。

（五）西南麦区。以条锈病、赤霉病、蚜虫为主，兼顾白粉病、麦蜘蛛等病虫。

三、防控措施

（一）返青拔节期。以防控条锈病、纹枯病、茎基腐病为重点，挑治蚜虫和麦蜘蛛。**对条锈病，**要加强病情监测，实施分区防控。西南、汉水流域和陕西关中、甘肃陇南等菌源区，要全面落实“带药侦查、打点保面”措施，及时封锁发病田块，延缓菌源向黄淮麦区扩散蔓延。黄淮春季流行区，要强化监测预警及发生动态研判分析，坚持“发现一点，防治一片”，及时控制发病中心；当田间平均病叶率达到0.5%—1%时，组织开展应急防控，做到同类型区域防控全覆盖，药剂可选用戊唑醇、丙硫菌唑·戊唑醇、氟环唑、吡唑醚菌酯、三唑酮、嘧啶核苷类抗菌素等。**对小麦茎基腐病、纹枯病等茎基部病害，**抓住返青至拔节期前喷雾防治。茎基腐病病株率达5%田块，可选用丙硫菌唑、丙硫菌唑·戊唑醇、戊唑·噻霉酮、粉唑醇等药剂进行防治；纹枯病病株率达10%田块，可选用噻呋酰胺、戊唑醇、丙环唑、烯唑醇、肟菌·戊唑醇等化学药剂或井冈霉素、多抗霉素等生物药剂进行防治。防治茎基部病害施药时，要加大水量，推荐使用自走式喷杆喷雾机等机械，重点喷淋麦株茎基部，确保防治效果。**对麦蜘蛛，**当平均每 33 厘米行长螨量达200头或每株6头以上时，选用阿维菌素、联苯菊酯、联苯·三唑磷等药剂喷雾防治，同时可通过防除多花黑麦草等杂草、合理肥水等田间管理措施，降低虫量。**对蚜**

虫，当百株蚜量达到200头时，可选用氟啶虫酰胺、呋虫胺、噻虫嗪、噻虫胺、高效氯氟氰菊酯等单剂或复配剂喷雾防治。

（二）抽穗扬花期。以预防小麦赤霉病为主，兼顾锈病、白粉病、蚜虫、吸浆虫等。**长江中下游和黄淮南部等赤霉病常年病害流行区，**首次化学用药应抓住齐穗至扬花初期的关键时期；生物药剂防治时期可提早至抽穗初期，扬花期视情况使用化学药剂补防。可选用氰烯菌酯或丙硫菌唑及其复配剂、氟唑菌酰羟胺、叶菌唑、丙唑·戊唑醇、吡唑醚菌酯、肟菌·戊唑醇、丁香·戊唑醇等化学药剂，或结合井冈·枯芽菌、四霉素、枯草芽孢杆菌等生物药剂进行防治。施药后 4—6 小时遇雨，应及时补治；如抽穗扬花期遇连阴雨天气，需隔 5—7 天再轮换用药防治 1 次，确保防治效果。吡唑醚菌酯、肟菌·戊唑醇等泛醇氧化酶抑制剂类药剂，应提前到扬花初期使用，降低赤霉毒素积累；苯并咪唑类药剂抗性水平较高的地区，应停止使用多菌灵、甲基硫菌灵等药剂，提倡轮换用药。**小麦锈病、白粉病常发区，**可结合赤霉病进行兼防；当白粉病田间病叶率达 10% 、锈病田间病叶率达到 0.5%—1% 时，选用丙硫菌唑、叶菌唑、戊唑醇、氟环唑等杀菌剂进行防治，严重发生田块，应间隔 7—10 天再轮换用药防治 1 次。**对小麦吸浆虫，**应重点做好抽穗期的成虫防控。在抽穗初期田间每 10 复网 20 头以上成虫时，及时选用阿维·吡虫啉、高效氯氟氰菊酯、氯氟·吡虫啉等药剂进行防治，重发区间隔 3 天轮换用药，再防治 1 次，确保防治效果。

当田间百穗蚜量达 500 头以上时，选用氟啶虫酰胺、呋虫胺、噻虫嗪、噻虫胺、高效氯氟氰菊酯等单剂或复配剂喷雾防治。有条件的地区，提倡释放蚜茧蜂等天敌昆虫进行生物防治。

（三）灌浆期。重点防控穗蚜、白粉病和锈病以及应对后期干热风、早衰等。针对白粉病、锈病等，选用戊唑醇、丙唑·戊唑醇、叶菌唑等杀菌剂；针对蚜虫，选用氟啶虫酰胺、高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪等杀虫剂；针对早衰、干热风等天气情况，喷施芸苔素内酯、二氢卟吩铁等植物生长调节剂或磷酸二氢钾等叶面肥，可结合小麦“一喷三防”进行综合防控。

四、关键技术

（一）小麦促弱转壮。当前，我国小麦主产区苗情复杂，要做到分区分类施策。对部分播期推迟、土壤湿度偏大、苗情较差的田块，可结合返青拔节期防控，添加赤·吲乙·芸苔、氨基寡糖素、二氢卟吩铁、芸苔素内酯（甾醇）或免疫激活蛋白等植物生长调节、免疫诱抗剂，及时促进苗情转化，增强小麦抗逆能力；同时强化田间病虫调查，如多种病虫同时发生，可分别选择对路农药或广谱性药剂兼治。

（二）小麦“一喷三防”。“一喷三防”作为小麦中后期防病虫提产量的关键措施，各地要根据当地小麦生长情况、气候条件和病虫害发生危害特点，指导选用高效对路的喷防投入品，如丙硫菌唑、噻虫嗪、芸苔素内酯（甾醇）、磷酸二氢钾等杀菌剂、杀虫剂、植物生长调节剂、叶面肥和桶混助剂等，科学混用、综合施药，明确喷防时间节点，提升“一喷三防”作业质量与防控效果，达到防病虫、提单产、促品质的目的。

（三）精准用药提质增效。在病虫发生关键时期，各麦区强化大区流行性病虫害监测信息交流共享，根据病虫发生种类选用对路药剂，科学混配植物生长调节剂、免疫诱抗剂等增强抗逆性。推广自走式喷杆喷雾机、植保无人飞机等高效施药机械，添加相应的沉降、抗蒸发等功能的助剂，使用植保无人飞机防控时亩施药液量2升以上。

更多精彩内容请关注

今日头条 学习强国 微信公众号 微信视频号 抖音

相关新闻

全国农技中心关于印发2026年小麦秋播药剂拌种及秋冬季病虫防控技术指导意见的通知 2026-09-30
当前水稻稻飞虱防控技术指导意见 2026-08-17
大豆：“人，我好热，需要喝水” 2026-08-06

秋季粮油作物防病虫提单产技术培训班在辽宁大连举办 2026-07-27

全国农技中心关于加强秋粮作物重大病虫害防控工作的通知 2026-07-22

体系网站 省级农业农村部门网站 中华人民共和国农业农村部 业务系统 资料下载

您是第 689261 位访客 总访问量 845904 人次
主办单位：全国农业技术推广服务中心
地 址：北京市朝阳区麦子店街20号 邮 编：100125
京ICP备13002323号-1 京公网安备11010502034442
官 方 微 信