2026年水稻重大病虫害防控技术方案

日期：2026-03-30 来源：病虫害防治处 【字体：大 中 小】 打印本页

据全国农技中心预测， 2026 年全国水稻病虫害总体偏重发生，其中二化螟总体大发生，稻飞虱、稻纵卷叶螟、纹枯病、福寿螺等总体偏重发生，稻瘟病总体中等发生，稻曲病、南方水稻黑条矮缩病、白叶枯病、细菌性基腐病、水稻线虫病、稻蓟马、稻秆潜蝇、跗线螨、稻叶蝉、稻粉虱、稻瘿蚊等病虫在局部稻区发生。为做好2026年水稻病虫害防控工作，促进水稻大面积单产提升，特制定本方案。

一、防控策略

坚持预防为主、综合防治，立足关口前移、治早治小，以选用抗（耐）病虫品种、建立健康稻田生态系统为基础，落实生态调控和农艺措施，推广应用理化诱控、生物防治等绿色防控技术，合理安全使用高效低风险农药，确保病虫危害损失率控制在5%以内。

二、防控重点

（一）华南稻区。包括广东、广西、福建、海南等省（自治区）的传统双季稻种植区，重点防控稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟、福寿螺、稻瘟病、纹枯病、白叶枯病、稻曲病，密切关注南方水稻黑条矮缩病、台湾稻螟、大螟、稻蓟马、稻秆潜蝇、稻瘿蚊、跗线螨、稻粉虱、稻粒黑粉病。

（二）长江中下游单双季混栽稻区。包括湖南、江西、湖北、浙江、福建等省的单双季稻混合种植区，重点防控二化螟、稻飞虱、稻纵卷叶螟、福寿螺、纹枯病、稻瘟病、稻曲病、穗腐病、恶苗病、白叶枯病、细菌性基腐病，密切关注南方水稻黑条矮缩病、稻秆潜蝇、大螟、稻蓟马、稻叶蝉、三化螟、跗线螨、水稻线虫病。

（三）长江中下游单季稻区。包括湖北、江苏、浙江、安徽、上海等省（直辖市）的单季稻种植区，重点防控稻飞虱、二化螟、稻纵卷叶螟、福寿螺、稻瘟病、纹枯病、稻曲病、白叶枯病，密切关注大螟、细菌性基腐病、水稻线虫病、穗腐病。

（四）西南稻区。包括云南、贵州、四川、重庆等省（直辖市）的单季稻种植区，重点防控稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、福寿螺、稻瘟病、纹枯病、稻曲病、南方水稻黑条矮缩病，密切关注黏虫、稻秆潜蝇、白叶枯病、细菌性基腐病、水稻线虫病、穗腐病。

（五）黄淮稻区。包括安徽、江苏北部以及河南、山东等省单季稻种植区，重点防控二化螟、稻飞虱、稻瘟病、纹枯病、稻曲病，密切关注水稻线虫病、稻纵卷叶螟、黑条矮缩病、条纹叶枯病。

（六）北方稻区。包括黑龙江、吉林、辽宁、河北、天津、内蒙古、宁夏、新疆等省（自治区、直辖市）单季粳稻种植区，重点防控稻瘟病、恶苗病、纹枯病、水稻线虫病、二化螟，密切关注稻曲病、穗腐病、稻潜叶蝇、负泥虫、灰飞虱、黏虫、稻螟蛉。

三、防控措施

（一）非化学绿色防控技术

1. 选用抗（耐）性品种。因地制宜选用抗（耐）稻瘟病、白叶枯病、条纹叶枯病、稻曲病、黑条矮缩病、南方水稻黑条矮缩病、褐飞虱、白背飞虱等病虫的水稻品种，避免种植高感品种。注意根据当地稻瘟病、白叶枯病病原菌的优势小种，合理布局种植不同遗传背景的抗性水稻品种。

2. 生态调控。采用生态工程技术，在田埂、路边沟边、机耕道旁种植芝麻、大豆、波斯菊、硫华菊、紫花苜蓿等显花植物，保留秕谷草等功能性禾本科植物，构建生态防控廊道，涵养和保护寄生蜂、蜘蛛等天敌，提高稻田生物多样性，增强天敌自然控害能力；在螟虫重发区，种植香根草等诱集植物，丛距3—5米，降低螟虫种群基数。

3. 农艺措施。（1）翻耕灌水灭蛹。在螟虫重发区，越冬代螟虫蛹期连片统一翻耕冬闲田、绿肥田，灌深水翻耕整田，浸没稻桩7—10天，降低虫源基数。（2）健身栽培。适时晒田，避免重施、偏施氮肥，适当增施磷钾肥和硅肥，配合使用微生物菌剂，改善根际土壤环境。（3）稻鸭共育。有条件的稻田，在水稻分蘖初期每亩放入15—20日龄的雏鸭10只左右，水稻齐穗时收鸭，减轻纹枯病、稻飞虱和福寿螺等的发生为害。（4）清洁田园。低茬收割，稻草离田后综合利用，避免将螟虫、稻瘟病、纹枯病、细菌性病害重发田的稻草直接还田。

4. 理化诱控。越冬代二化螟、大螟和主害代稻纵卷叶螟始蛾期，集中连片设置性信息素，交配干扰或群集诱杀。一是交配干扰，采用高剂量性信息素智能喷施装置，每3亩设置1套，或田间放置二化螟袋状迷向散发器，平均每亩放置6个。二是群集诱杀，采用持效期3个月以上的挥散芯（诱芯）和干式飞蛾诱捕器，平均每亩放置1套，田间均匀放置。

5. 生物农药。针对二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱、福寿螺、稻瘟病、纹枯病、立枯病等病虫害，优先使用苏云金杆菌、金龟子绿僵菌、短稳杆菌、甘蓝夜蛾核型多角体病毒、稻纵卷叶螟颗粒体病毒、印楝素、苦参碱、茶皂素、枯草芽孢杆菌、井冈霉素A、春雷霉素、多抗霉素、申嗪霉素、井冈·枯芽菌、蛇床子素、乙蒜素、寡雄腐霉菌等生物农药。

6. 释放赤眼蜂。在二化螟、稻纵卷叶螟主害代蛾始盛期释放稻螟赤眼蜂，每代放蜂2—3次，每次间隔3—5天，每亩每次放蜂量8000—10000头，均匀放置5—8点。蜂卡放置高度以分蘖期高于植株顶端5—20厘米、穗期低于植株顶端5—10厘米为宜。可降解释放球直接抛入田中。高温季节宜在傍晚放蜂。

7. 物理阻隔。在南方水稻黑条矮缩病、黑条矮缩病等病毒病流行区以及二化螟重发区，采用20—40目防虫网或15—20克/平方米无纺布全程覆盖秧田育秧，或采用工厂化集中育秧。在福寿螺重发生的灌溉渠入口、出口或者稻田进水、出水口安装阻隔网，防止福寿螺随水进入田间。

（二）科学用药技术

1. 种子处理。在播种前，使用氟唑菌酰羟胺、咯菌腈、噻虫嗪、噻虫·咯菌腈、精甲·咯菌腈、肟菌·异噻胺、氟啶·戊·杀螟等种子处理剂浸种或拌种，预防恶苗病、稻瘟病、水稻线虫病、稻飞虱及其传播的病毒病、立枯病、稻蓟马等种传或苗期病虫。

2. 带药移栽。秧苗移栽前3天施用内吸性药剂，预防螟虫、稻叶瘟、稻蓟马、稻飞虱及其传播的病毒病；对于水稻线虫病发生区，苗床土壤处理和移栽前使用药剂浸根处理。

3. 免疫诱抗。施用二氢卟吩铁、多效唑、萘乙酸、赤·吲乙·芸苔等植物生长调节剂或氨基寡糖素等植物诱抗剂，增强水稻抗性。

4. 综合施药。根据水稻各生育期主要病虫种类、发生程度、发生期，因地制宜确定主治对象和防治适期，施药预防稻瘟病、稻曲病、纹枯病等病害，配合茶·黄液等农药助剂，防控二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱等害虫。

（1）二化螟。药剂防治指标为分蘖期枯鞘丛率达到8%—10%或枯鞘株率3%；穗期重点防控上代残虫量大的稻田，于卵孵化高峰期施药。根据本地螟虫抗药性发展，合理选择甲氧虫酰肼、乙基多杀菌素、阿维·氯苯酰、阿维·茚虫威等药剂。

（2）稻飞虱。华南、西南、长江中下游稻区重点防控褐飞虱和白背飞虱，黄淮稻区重点防控白背飞虱和灰飞虱。防治指标为分蘖期百丛虫量1000头、穗期百丛虫量1000—1500头。西南和华南稻区还需注意分蘖期迁入代的防控。根据本地飞虱抗药性发展，合理选择三氟苯嘧啶、烯啶虫胺、醚菊酯、氟啶虫胺腈等药剂。

（3）稻纵卷叶螟。水稻分蘖期发挥植株补偿功能，减少用药。药剂防治指标为分蘖期百丛水稻束叶尖150个，孕穗后百丛水稻束叶尖60个。在卵孵化始盛期至低龄幼虫高峰期施药，药剂可选用四氯虫酰胺、茚虫威、多杀霉素等。

（4）三化螟。水稻破口抽穗初期施药，重点防控每亩卵块数达到40块的稻田，方法同二化螟。

（5）稻瘟病。防治叶瘟在田间初见病斑时施药，叶瘟发病严重田块，可7天后第二次施药；预防穗瘟在破口初期施药，若气候适温高湿，在齐穗期第二次施药。保护性药剂可选用三环唑、丙硫唑、咪铜·氟环唑；治疗性药剂可选用吡唑醚菌酯等。

（6）纹枯病。分蘖末期至孕穗期病丛率达到20%时和破口抽穗初期结合保穗，药剂选用氟环唑、己唑醇、咪铜·氟环唑、噻呋酰胺等。

（7）稻曲病和穗腐病。水稻破口前7—10天（10%水稻剑叶叶枕与倒二叶叶枕齐平时）施药预防，如遇多雨天气，间隔7天第2次施药。药剂选用氟唑菌酰羟胺、苯甲·丙环唑、肟菌·戊唑醇等。

（8）立枯病。秧田出现症状时，苗床叶面喷雾防控。药剂可选用噁霉灵等。

（9）细菌性病害。针对白叶枯病等细菌性病害，在种子处理和带药移栽的基础上，当田间出现发病中心时立即施药防控。重发区在台风、暴雨前后施药预防。药剂选用噻唑锌、噻霉酮等。

（10）水稻病毒病。针对南方水稻黑条矮缩病，华南、西南南部常发区采用内吸性杀虫剂拌种和带药移栽，春季（4—5月）迁入白背飞虱带毒率大于1%或早稻中后期南方水稻黑条矮缩病的病株率大于3%的稻区，中稻、晚稻秧田期和分蘖初期需防控。选用内吸性长持效期药剂防控白背飞虱，结合使用毒氟磷、宁南霉素等防病毒药剂。针对条纹叶枯病和黑条矮缩病，秧田期至分蘖前期施药防控灰飞虱，药剂使用参照南方水稻黑条矮缩病。

（11）福寿螺。在做好稻田养鸭捕食、水渠物理阻隔等措施基础上，当水稻秧田期螺密度达到1—2头/平方米，分蘖期达到3—4头/平方米时，可使用四聚乙醛、杀螺胺乙醇胺盐等药剂。也可结合引诱剂，配合茶麸或熟石灰拌匀撒施防控。

四、注意事项

（一）优先使用生物防治，生物农药应适当提前施用，确保药效。

（二）白叶枯病等细菌性病害流行期，适当提高植保无人飞机飞行高度，减少叶面摩擦出现伤口导致病菌侵染。

（三）稻鸭、稻虾、稻鱼、稻蟹等种养区和种桑养蚕区及其邻近区域，应慎重选用药剂，施药后的田水不可直接排入鱼塘等养殖区，避免对养殖造成影响。

（四）水稻分蘖期尽量避免使用甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、阿维菌素，减少诱发稻飞虱增殖风险；破口抽穗期慎用三唑类杀菌剂。

（五）根据抗药性监测结果，在二化螟、稻飞虱、稻纵卷叶螟等产生抗性的稻区，停止使用氯虫苯甲酰胺、阿维菌素、吡虫啉等高抗性药剂，合理交替轮换使用农药，延缓抗药性发展。

更多精彩内容请关注

微信公众号 微信视频号 抖音

相关新闻

全国农技中心关于印发2026年小麦秋播药剂拌种及秋冬季病虫防控技术指导意见的通知

当前水稻稻飞虱防控技术指导意见

大豆：“天，我好热，需要喝水”

秋季粮油作物防病虫提单产技术培训班在辽宁大连举办

全国农技中心关于加强秋粮作物重大病虫害防控工作的通知

2026-07-22

体系网站 省级农业农村部门网站 中华人民共和国农业农村部 业务系统 资料下载

关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

您是第 689246 位访客 总访问量 845888 人次

主办单位：全国农业技术推广服务中心

地 址：北京市朝阳区麦子店街20号 邮 编：100125

京ICP备13002323号-1 京公网安备11010502034442

官 方 微 信