2026年玉米重大病虫害防控技术方案

日期：2026-03-30 来源：病虫害防治处 【字体：大 中 小】 打印本页

据全国农技中心预测分析，2026年全国玉米病虫害总体偏重发生，玉米螟、棉铃虫、黏虫等害虫在东北、黄淮海局部地区偏重发生，穗腐病在黄淮海、西南和东北地区重发风险高。为做好2026年玉米重大病虫害防控技术指导工作，制定本方案。

一、防控策略

坚持预防为主、综合施策、联防联控、统防统治。协同应用抗（耐）性品种、生态调控、理化诱控、生物防治和科学用药等措施，加强种子药剂处理和关键期综合防控，分区域应用绿色防控集成技术，病虫危害损失率总体控制在5%以内，有效推进大面积单产提升，保障玉米生产安全和质量安全。

二、防控对象

（一）东北春玉米区。重点防控玉米螟、黏虫、棉铃虫、双斑长跗萤叶甲、蚜虫、叶螨、地下害虫，大斑病、穗腐病、灰斑病、北方炭疽病、白斑病、茎腐病、线虫矮化病等。

（二）黄淮海夏玉米区。重点防控玉米螟、甜菜夜蛾、棉铃虫、黏虫、桃蛀螟、蓟马、蚜虫、叶螨，穗腐病、南方锈病、褐斑病、小斑病、弯孢叶斑病、茎腐病等。

（三）西南及南方丘陵玉米区。重点防控草地贪夜蛾、玉米螟、桃蛀螟、黏虫、蚜虫、叶螨，纹枯病、大斑病、穗腐病、白斑病、灰斑病等。

（四）西北玉米区。重点防控地下害虫、蚜虫、叶螨、棉铃虫、玉米螟、双斑长跗萤叶甲，茎腐病、大斑病、穗腐病、锈病等。

三、防控措施

（一）播种至苗期。加强地下害虫、苗期害虫和土传种传病害防控。对于蛴螬、地老虎、金针虫、二点委夜蛾以及线虫矮化病等，选用含有噻虫胺、噻虫嗪等新烟碱类杀虫剂与氯虫苯甲酰胺、溴氰虫酰胺或丁硫克百威、硫双威复配的种子处理剂，兼治蓟马、灰飞虱、草地贪夜蛾、甜菜夜蛾等。播前灭茬、清茬或清除播种沟上的覆盖物防治二点委夜蛾。生物防治选用金龟子绿僵菌、球孢白僵菌颗粒剂，随种肥沟施。对于根腐病、纹枯病、茎腐病和丝黑穗病等，首选抗（耐）病品种，并采用含有精甲·咯菌腈、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、噻呋酰胺、三氟吡啶胺、氟唑环菌胺、种菌唑或戊唑醇等成分的种子处理剂。种子处理时根据靶标病虫害情况可进行二次包衣，添加冠菌素等植物生长调节剂促进出苗生长，增强抗逆能力。

（二）喇叭口期。加强食叶、钻蛀性害虫和叶斑病防控。对于草地贪夜蛾、黏虫、玉米螟等害虫，成虫发生期使用杀虫灯、食诱剂、性诱剂防治；产卵初期释放赤眼蜂或夜蛾黑卵蜂等天敌灭卵；幼虫低龄期优先选用苏云金杆菌、球孢白僵

菌、金龟子绿僵菌、核型多角体病毒、印楝素等生物农药防治；化学防治可选用四氯虫酰胺、虱螨脲、氯虫苯甲酰胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、乙基多杀菌素、四唑虫酰胺等杀虫剂及其复配剂，强化虫卵兼治。大斑病、小斑病、南方锈病、白斑病、灰斑病、纹枯病等病害发病初期，选用氟唑菌酰羟胺、吡唑醚菌酯、丙环·嘧菌酯、肟菌·戊唑醇、唑醚·氟环唑、氟硅唑、代森铵、枯草芽孢杆菌、井冈霉素等杀菌剂，兼治弯孢叶斑病、褐斑病，视发病情况隔7—10天再喷1次。

（三）抽雄吐丝至灌浆成熟期。加强穗部害虫、叶斑病和穗腐病防控。蚜虫盛发初期，选用噻虫嗪、噻虫胺、吡虫啉、溴氰菊酯等药剂喷施，兼治双斑长跗萤叶甲，重点喷洒叶背面和雌穗周围；叶螨发生初期如遇持续高温干旱，选用唑螨酯等药剂喷施，重点喷洒叶背面。综合防控玉米螟、桃蛀螟、棉铃虫、南方锈病、穗腐病，可选用吡唑醚菌酯、氯氟醚菌唑、醚菌酯等杀菌剂，以及四氯虫酰胺、氯虫苯甲酰胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、溴氰菊酯等杀虫剂喷雾，避开玉米授粉期。可添加植物生长调节剂，提升玉米植株健康状况，加强对功能叶保护防早衰，减少钻蛀害虫、病菌侵染为害果穗。收获后及时晾晒、干燥脱水，减少病菌侵染和毒素积累，提质增产保安全。

四、综合防控技术

（一）秸秆处理与深耕灭茬技术。采取秸秆综合利用、粉碎还田、深翻入土、播前灭茬等措施处理秸秆及残茬，病虫害严重发生地块秸秆离田处理。

（二）选用抗（耐）性品种。根据玉米病虫害发生种类，选用抗（耐）病品种控制茎腐病、穗腐病和叶斑病；在生物育种品种种植区，选用审定的转基因抗虫玉米品种，同时应加强非靶标害虫的防控。

（三）种子处理技术。根据不同区域地下害虫、种传土传病害和苗期病虫害发生种类和危害规律，选择适宜的包衣种子，或种子处理剂进行包衣。

（四）中后期一喷多促技术。心叶末期至灌浆初期，根据穗腐病、叶斑病、玉米螟、桃蛀螟、棉铃虫、黏虫、甜菜夜蛾、双斑长跗萤叶甲等病虫害发生情况，合理混用杀虫剂、杀菌剂、叶面肥和植物生长调节剂，注重不同作用机理的农药交替使用、轮换使用、安全使用。集中连片种植区，推荐使用高地隙喷杆喷雾机或植保无人飞机作业，提升防控效果和效率。

（五）成虫诱杀技术。在鳞翅目和鞘翅目等具有较强趋光性的害虫成虫期，使用灯光诱杀；草地贪夜蛾、玉米螟、棉铃虫、黏虫等害虫可利用性诱剂诱杀；草地贪夜蛾、黏虫、棉铃虫、金龟子等害虫可结合食诱剂诱杀。灯诱、性诱、食诱技术应大面积连片应用，灯光诱杀注意在害虫成虫高峰期以及活跃时段使用。

（六）卵寄生蜂防虫技术。在玉米螟、棉铃虫、桃蛀螟和草地贪夜蛾等成虫始盛期，选用当地优势蜂种（如螟黄赤眼蜂、夜蛾黑卵蜂、松毛虫赤眼蜂等），采用植保无人飞机释放蜂球，每亩设置5—8个释放点，亩放蜂总量1—2万头，放蜂前后10天避免使用杀虫剂。

更多精彩内容请关注

今日头条 学习强国 微信公众号 微信视频号 抖音

相关新闻

全国农技中心关于印发2026年小麦秋播药剂拌种及秋冬季病虫防控技术指导意见的通知 2026-09-30
当前水稻稻飞虱防控技术指导意见 2026-08-17
大豆：“人，我好热，需要喝水” 2026-08-06
秋季粮油作物防病虫提单产技术培训班在辽宁大连举办 2026-07-27

全国农技中心关于加强秋粮作物重大病虫害防控工作的通知 2026-07-22

体系网站 省级农业农村部门网站 中华人民共和国农业农村部 业务系统 资料下载

关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

您是第 688916 位访客 总访问量 845553 人次

主办单位：全国农业技术推广服务中心

地 址：北京市朝阳区麦子店街20号 邮 编：100125

京ICP备13002323号-1 京公网安备11010502034442

官 方 微 信