2026年马铃薯重大病虫害防控技术方案

日期：2026-03-30 来源：病虫害防治处 【字体：大 中 小】 打印本页

据全国农技中心预测，2026年马铃薯晚疫病总体中等发生，在西南及武陵山区局部产区，以及西北地区中西部、华北和东北的局部产区偏重以上流行风险高。为有效控制马铃薯晚疫病等重大病虫危害，制定本方案。

一、防控策略

贯彻“预防为主，综合防治”的植保方针，优先采用抗病品种、优质脱毒种薯、种薯处理技术，实施达标防治和精准用药，大力推进全生育期绿色防控技术，切实提高防控效果，促进产量和品质双提升。

二、防控重点

（一）南方冬作区。重点防控晚疫病、早疫病、黑胫病、青枯病、疮痂病、蚜虫、蓟马、地下害虫，兼顾粉痂病、黑痣病、枯萎病、黄萎病和二十八星瓢虫等病虫。

（二）西南混作区。重点防控晚疫病、早疫病、病毒病、蚜虫，兼顾疮痂病、粉痂病、青枯病、黑痣病、黑胫病、地下害虫、马铃薯块茎蛾等病虫。

（三）北方一作区。重点防控晚疫病、早疫病、黑痣病、枯萎病、黄萎病、粉痂病、疮痂病、黑胫病、病毒病、地下害虫、蚜虫，兼顾环腐病、二十八星瓢虫、豆芫菁、蓟马等病虫。

（四）中原二作区。重点防控早疫病、黑痣病、疮痂病、地下害虫，兼顾蚜虫、黑胫病、枯萎病和黄萎病等病虫。

三、防控措施

（一）播种期

1. **轮作适播。**与玉米、小麦、大豆、蚕豆等非茄科作物轮作，精细整地，适时播种，避免因地温偏低和播种过深导致出苗缓慢加重黑痣病、枯萎病等土传病害发生。

2. **高垄种植。**播种前深耕细耙，使土壤疏松并起高垄播种。

3. **选用抗病品种和脱毒种薯。**根据不同生产区域主要病害发生情况，选择适合的抗病品种，优先选择脱毒马铃薯原种或一级种薯。

4. **种薯切刀消毒。**种薯切块过程中，用75%酒精、3%来苏水或0.5%高锰酸钾溶液浸泡切刀5—10分钟进行消毒，多把切刀轮换使用。

5. **种薯处理。**选用甲基硫菌灵、咯菌腈、氟环·咯菌腈、霜脲氰、吡醚·咯·噻虫等化学药剂或春雷霉素、中生菌素等生物药剂进行拌种，晾干后播种，预防控制土传、种传病害和地下害虫。

6. **药剂沟施。**对黑痣病、枯萎病、黄萎病等土传病害重发田，随播种沟施嘧菌酯或噻呋酰胺；对疮痂病等病害发生田，沟施解淀粉芽孢杆菌，兼防粉痂病。地下害虫重发区，可沟施氟氯氰·噻虫胺、氯虫·噻虫胺或辛硫磷颗粒剂。

（二）苗期。以防控晚疫病和地下害虫为主。根据晚疫病田间监测预警信息，提前喷施代森锰锌或苦参碱等保护性药剂进行预防，利用杀虫灯或者信息素诱杀地下害虫成虫。

（三）块茎形成期。防控重点是晚疫病、疮痂病、蚜虫、二十八星瓢虫等病虫。针对晚疫病，根据田间监测情况，适时选用代森锰锌、氟啶胺、氰霜唑、噁唑菌酮等保护性杀菌剂或烯酰吗啉、氟菌·霜霉威、丁子香酚等内吸性杀菌剂进行全田喷雾。施药间隔期根据天气情况和药剂持效期决定，一般间隔7—10天。喷药后遇雨应及时补喷。疮痂病严重的地块可用解淀粉芽孢杆菌等生物菌剂滴灌。如有黑胫病、青枯病等病害发生，可选用噻唑锌、噻霉酮、春雷霉素、中生菌素等药剂滴灌或灌根。二十八星瓢虫防控应在成虫发生盛期，选用高效氯氰菊酯等进行叶面喷雾，施药间隔期7—10天。蚜虫可选用氟啶虫酰胺、噻虫嗪、吡蚜酮、高效氯氟氰菊酯等化学药剂喷雾防治。

（四）块茎膨大期。防控重点是晚疫病、早疫病、二十八星瓢虫、马铃薯块茎蛾、豆芜菁等病虫。针对晚疫病，依据田间监测预警系统或田间病圃监测结果确定最佳喷施时间，做到达标防治、科学精准用药，可同时使用内吸治疗剂和保护剂，防治药剂可选择含有氟噻唑吡乙酮、噁唑菌酮、霜脲氰、丁子香酚、代森锰锌等成分药剂。早疫病可选用苯甲·丙环唑、啶酰菌胺、肟菌·戊唑醇、苯甲·嘧菌酯等药剂喷雾防治。疮痂病严重的地块，可使用春雷·喹啉铜、解淀粉芽孢杆菌等药剂开展防控。黑胫病、环腐病和青枯病严重的地块，可选用噻唑锌、噻霉酮等药剂滴灌或喷淋。马铃薯块茎蛾发生前期可选用食诱、性诱、灯光诱杀成虫，卵孵化盛期至二龄幼虫分散前可选用高效氯氟氰菊酯或与对路生物农药混合进行叶面喷雾。

（五）收获至贮藏期。收获前7—10天机械杀秧。杀秧后至收获前喷施一次杀菌剂，如烯酰吗啉、氢氧化铜或噁酮·霜脲氰等，杀死土壤表面及残秧上的病菌，防止其侵染受伤薯块。杀秧后如不能及时收获，种薯田还应加喷1次噻虫嗪防治蚜虫，避免种薯感染病毒；块茎蛾重发区，薯块可选用高效氯氟氰菊酯等药剂喷雾，晾干后入库贮藏。

四、关键技术

利用智能监测预警系统，实施**马铃薯晚疫病精准防控技术。一是精准预警，及时防控。**依托“马铃薯晚疫病监测预警系统”提示，结合田间实际和气候条件，组织开展精准防控，抓住雨前、雨后关键窗口期进行防控。**二是科学用药，提质增效。**科学选用高效、低风险药剂，苗期至块茎期选用代森锰锌、氟啶胺等保护性杀菌剂预防晚疫病发生，块茎期至收获期选用烯酰吗啉、氟吡菌胺·霜霉威、丁子香酚等治疗性药剂降低晚疫病危害；注重保护剂与治疗剂交替使用、化学药剂与生物制剂（如芽孢杆菌、免疫诱抗剂）协同使用、可配合茶·黄液等抗沉降、抗蒸发的农药助剂开展防控。**三是统防统治，联防联控。**针对晚疫病流行传播速度快的特点，统一组织、连片实施专业化统防统治，提高防控覆盖率和时效性，遏制病害扩散蔓延。

更多精彩内容请关注

今日头条 学习强国 微信公众号 微信视频号 抖音

相关新闻

全国农技中心关于印发2026年小麦秋播药剂拌种及秋冬季病虫防控技术指导意见的通知 2026-09-30
当前水稻稻飞虱防控技术指导意见 2026-08-17
大豆：“人，我好热，需要喝水” 2026-08-06
秋季粮油作物防病虫提单产技术培训班在辽宁大连举办 2026-07-27

全国农技中心关于加强秋粮作物重大病虫害防控工作的通知 2026-07-22

体系网站 省级农业农村部门网站 中华人民共和国农业农村部 业务系统 资料下载

关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

您是第 688903 位访客 总访问量 845537 人次

主办单位：全国农业技术推广服务中心

地 址：北京市朝阳区麦子店街20号 邮 编：100125

京ICP备13002323号-1 京公网安备11010502034442

官 方 微 信