全国冬小麦春季田间管理技术意见

来源： 河北省农业农村厅 时间： 2023-6-21 13:56:15

“立春”将至，全国各地冬小麦即将陆续开始返青，正是抓好春季田间管理、促进苗情转化升级的关键时期。总体看，各地小麦群体普遍较足，个体发育较好，地上地下协调，但也存在旺苗弱苗并存、部分地区旱象抬头、个别田块出现冻害、病虫草基数较高等问题，同时早春干旱、“倒春寒”等威胁大，对抓好麦田管理带来不利影响。针对今年冬小麦苗情特点和天气情况，要**“因地制宜、因苗施策，促控结合、分类管理，控旺促弱、防冻抗旱”**，加强春季麦田管理，促进小麦长势均衡，着力实现稳穗数、增粒数、争粒重，全力夺取夏粮丰产丰收。

一、黄淮海冬麦区

秋播前本区域普降透雨，播种期间底墒充足表墒适宜，天气晴好为主，茬口衔接较好，各地趁墒播种、应播尽播，适期播种面积比例较常年增加。冬前温度和墒情适宜，有利于苗情转化升级。目前本区域存在的不利因素，一是苗情两极分化现象明显，部分麦田偏旺和偏弱“两头苗”现象较为突出；二是病虫草害隐患较大，部分未进行播后封闭处理和冬前化除的田块杂草较重，春季化除压力增大；三是冻害干旱风险大，冬季降水偏少、降温频繁，个别旺苗及弱苗麦田有明显冻害。针对本区域越冬期苗情，春管要以“控旺促弱转壮，保苗稳健生长”为目标，因苗施策，强化分类管理。

（一）早春镇压划锄，适时浇水保墒。早春镇压可压碎土块，弥封裂缝，沉实冬季冻融疏松的土壤，改善墒情，使土壤与根系密接起来，有利于根系吸收养分；锄地能提高地温，减少土壤水分蒸发。镇压和划锄结合进行，先压后锄，达到土壤上松下实、提墒保墒增温、抗旱促苗早发的作用。对吊根苗和耕种粗放、坷垃较多、秸秆还田导致土壤墒松的麦田，在早春土壤化冻后补灌，抗旱保苗。对没有水浇条件的旱地麦田，土壤化冻后及时镇压，促土壤下层水分向上移动，起到提墒、保墒、抗旱的作用。对冬前和越冬期冻害较重的麦田，要及早采取促弱转壮管理措施，早春适时搂麦或划锄，去除枯叶，促新生叶早生快发。

（二）因地因苗分类，科学调控肥水。对旺苗麦田，返青至起身期采取镇压或深锄断根，抑制分蘖滋生，旺长严重地块可镇压2—3次；也可在起身期进行化学调控，适度控制生长预防后期倒伏；推迟春季肥水管理，在拔节后期追肥浇水，一般亩施尿素8—10公斤。对冬前过旺、返青后有脱肥现象麦田，在拔节前期或中期因苗追肥浇水。对弱苗麦田，开春后及早中耕划锄，提温保墒、促苗早发；返青到拔节期结合春灌分别追肥二铵或尿素，或借助春季降雨（雪）追肥以促进小麦生长，一般亩追施二铵和尿素总量不超过15公斤，要避免浇水过早导致地温低而延迟返青。对于壮苗麦田，于起身后期至拔节期因墒灌水追肥，一般结合浇水亩施尿素6—10公斤，促进小麦稳健生长。对无灌溉条件麦田，应在小麦返青后至起身期趁墒亩追施尿素10公斤左右，并配施适量磷酸二铵，促春生分蘖早发快长。对冻害较重麦田，在土壤解冻后及时追肥，一般每亩施尿素8—10公斤左右，缺磷地块亩施氮磷复合肥15公斤左右，促进分蘖成穗。在拔节期再根据苗情酌情追施氮肥或氮磷复合肥，提高穗粒数。

（三）抓好预测预报，防治病虫草害。加强病虫草害预警预报，科学制定防治预案，指导农民科学选药、安全用药，及时防治、联防联治、统防统治。重点预防条锈病、赤霉病、茎基腐病、金针虫、蚜虫等病虫害大面积发生，抽穗-扬花期要全面预防赤霉病，灌浆期做好“一喷三防”。关注多花黑麦草、雀麦、节节麦、看麦娘、猪秧秧等恶性杂草蔓延趋势，对冬前未进行化除的麦田，当日平均气温稳定通过6℃以后，选择晴好天气于上午10点至下午4点，及时化学除草，根据田间杂草种类选择适宜除草剂，并严格按照要求操作，以免发生药害。

（四）关注天气变化，主动防范“倒春寒”。早春要注意天气预报，提前做好“倒春寒”防控准备。在低温天气来临前，对土壤墒松、尚未拔节的麦田进行镇压，弥补土壤缝隙，防止透风跑墒，亦可控制旺长；对缺墒的麦田，寒潮到来前提前灌水，改善土壤墒情，调节土温和近地层小气候，缓冲降温影响，预防冻害发生；对已拔节或孕穗抽穗小麦可通过根外喷施磷酸二氢钾及生长调节剂，减轻低温影响。寒潮过后2—3天，及时调查幼穗受冻情况，一旦发生冻害，要及时采取追肥、叶面喷肥等措施，分类施肥补

救。对茎蘖幼穗冻死率10%—30%的麦田亩施尿素5公斤左右，冻死率30%—50%的麦田亩施尿素7—10公斤，冻死率50％以上的麦田亩施尿素12—15公斤，促进恢复生长。

二、长江中下游冬麦区

本区域小麦秋播时气象条件有利于提高播种质量，适期播种比例常年最高，苗情基础总体较好。目前本区域存在的不利因素，一是农户习惯性播量偏大，旺长苗占有一定比例，部分晚播麦苗小苗弱，苗情两极分化明显；二是春季冻害、渍害、倒伏风险较大，目前已有部分麦田出现轻度冻害、渍害等现象；三是病虫基数大，部分稻茬麦田杂草较多，防控压力大。针对本区域越冬期苗情，春管要坚持“控旺促弱、高效施肥、绿色防控、抗逆保丰”的技术途径，切实加强因地因苗分类管理，促进苗情转化升级，稳穗、增粒、争重，实现优质丰产。

（一）控旺促弱，防倒防早衰。开春时要及时查苗，对群体过大、有倒伏风险的麦田，应强化控旺防倒，严格控制早春施肥。搞好镇压，旺长苗拔节前要及时镇压，连续镇压2—3次，土壤过湿、叶片潮湿、封冻、盐碱土等情况下不宜镇压。拔节后的小麦不能镇压。在倒5叶至倒4叶初，叶面喷施生长抑制剂，可控旺防倒伏。严格控制早春施肥，推迟拔节肥的施用。对群体偏小、穗数可能不足的弱小苗和脱肥严重麦田，应尽早促弱转壮，一般可亩施尿素5公斤和15:15:15三元高效复合肥15公斤；在倒2叶末至剑叶期再亩追施尿素5—8公斤，有利于防早衰，高产、提质、增效。

（二）保壮保优，施好拔节肥。壮苗夺高产麦田，重点是施好拔节肥。对群体茎蘖数适宜的壮苗麦田，在叶色正常褪淡、基部第二节间开始伸长时追施拔节肥，一般可亩施尿素5—8公斤和15:15:15三元高效复合肥10—15公斤。高产攻关麦田提倡施用孕穗肥，掌握在剑叶（旗叶）露出一半时施用，一般可亩追施尿素5—10公斤，有显著的增粒、增重效果。对弱筋小麦麦田，氮肥前移，以施用拔节肥为主，不宜追施孕穗肥。为避免因施肥过量导致小麦贪青、倒伏，务必掌握好追肥时期和总量，拔节期、孕穗期的追肥总量以每亩15公斤左右的尿素为宜。对有转旺风险的壮苗麦田，要通过镇压、化控等措施控旺促壮，保苗稳健生长。

（三）病虫防治，突出绿色防控。春季要根据草相选择适宜除草剂，及时进行化学除草、控制杂草为害，要注意安全用药、防止低温药害。要注意加强纹枯病、白粉病、赤霉病、锈病、蚜虫等病虫害的防治，对病虫防治要选择对路药剂，及时用药、用对药剂、足量用药；白粉病、纹枯病主要是防止过迟防治，赤霉病要抓住防治关键时期，做到见花打药。要密切监控并及时防治草地贪夜蛾。突出强化“一喷三防”工作，抽穗后注意结合病虫防治进行药肥混喷，可一喷多防、保绿防早衰、保粒增重。

（四）清沟理墒，降渍抗干旱。要及时清沟理墒、疏通田内外沟系，保证排水畅通，到雨止田干、沟无积水。淮北地区尤其旱茬小麦春后要注意防旱，及时清理“三沟”，以利于中后期灌好拔节孕穗水。秸秆还田量大、播后镇压不到位、土壤墒松的麦田，在土壤墒情适宜时，选择晴好、无霜冻天气尽早进行镇压，以促进根土密接，防止失墒干冻死苗。

（五）提前防御冻害，因灾及早补救。根据当前小麦苗情，本区域早春发生冻害的风险可能较高。各地要密切关注天气变化，寒流来临前后采取措施预防冻害。具体措施参照黄淮海冬麦区。

三、西南冬麦区

春节过后本区域小麦大部分将处于拔节后期，目前大部土壤墒情适宜、病虫发生较轻，苗情总体较好，生育进程略快于常年。目前本区域存在的不利因素，一是生育进程过快麦田长势偏旺，抵御春季低温冻害能力减弱；二是部分麦田播期偏迟，春季苗情转化存在难度；三是部分麦田过干或过湿，存在渍害或干旱风险；四是部分农户盲目追肥，叠加旺长因素，后期倒伏风险加剧。针对本区域越冬期苗情，春季管理应采取“以促为主、促控结合”的技术路径，强化分类管理，搭好丰产架子。

（一）促弱转壮，控旺稳长。对晚播弱苗麦田，应措施前移、以促为主，提前亩追施尿素3—5公斤，在适当情况下可喷施叶面肥，有利于弱苗转化。对旺长麦田，应于拔节前镇压控旺或喷施生长延缓剂，降低后期倒伏风险；同时，取消苗期追肥，尽量不灌或少灌水，推迟拔节肥施用。对壮苗麦田，按既定产量目标实施管理，根据播种时基肥施用情况确定追肥数量，全生育期亩施纯氮总量控制在9—12公斤，肥力高、基础好的取下限，地力差、苗数稍显不足的取上限。

（二）清沟理墒，降渍防旱。稻茬麦田“三沟”配套尤其重要，但生产中有很多的麦田没有开好边沟、背沟、厢沟，即使开了“三沟”也很少与田外沟渠形成互通，使得部分稻茬麦田的土壤含水量偏高，加重了渍害的发生。土壤过湿麦田更易形成弱苗，需要及时清沟降渍，改善土壤通气性。对有渍害倾向的稻茬麦田，应全面开沟、清沟，确保田内沟系与田外沟渠相通；地势偏高的旱地麦田，有条件的尽量结合追肥进行补水，提升苗情质量，抵御可能遭遇的春旱。

（三）监测锈病，化学除草。本区域冬前小麦冬繁区已发现条锈病零星发病麦田，越冬期温度偏高有利于条锈病冬季侵染繁殖，冬暖春早条件下，春季最易出现条锈病“中心病团”，也会因为气温持续升高而加速蚜虫、红蜘蛛等繁殖，要及时预测预报，加强巡查，及时处理病叶或中心病团，以防蔓延扩散。冬前未开展化学除草麦田，应抓紧进行化除工作。需要注意的是，低温极易造成除草剂药害，应严格根据不同除草剂的要求，选择晴好天气喷药。

（四）预防冻害，控旺防倒。对长势偏旺麦田，根据群体状况实施控旺，预防倒伏和低温冻害。拔节后一旦遭遇持续多日的0℃以下低温，小麦主茎往往会被冻死，寒潮过后应尽快调查幼穗受冻情况，分类施肥补救，促进恢复生长。具体措施参照黄淮海冬麦区。

四、西北冬麦区

本区域小麦冬前麦田墒情较好，目前苗情总体良好，群体适宜且充足，苗情理想；个别地区受连阴雨影响，播期推迟，冬前生长量较上年和常年略小。目前本区域存在的不利因素，一是条锈病威胁较大，冬前发生面积比上年同期明显增加；二是气候变化异常，部分麦田已显旱象和冻害；三是麦苗两极分化，灌区部分麦田有旺长现象，晚播麦田冬前苗小苗弱。针对本区域越冬期苗情，春季水浇地麦田管理参照黄淮海冬麦区进行，旱地小麦春季管理要以促弱控旺和抗旱防寒为中心，做好早春镇压耙耱工作，早抓水肥，因苗施策。

（一）早春耙耱镇压，抗旱保墒。入冬以来有效降水偏少，且气温整体偏高，当前首要工作是要做好雨雪之后各类麦田的保墒工作。对墒情较好、土壤冻结的麦田，早春当表层土壤解冻2厘米时，即可采取早春顶凌耙耱措施，促进小麦返青生长。对降雪较少、墒情较差麦田，早春土壤全部解冻后，要及早采取镇压提墒措施，消除明暗坷垃。对于旺苗和壮苗麦田，要及早中耕和镇压。对于群体偏少、个体偏弱麦田，在早春土壤全部解冻后实施浅锄细锄。同时，灌区在春季浇水后或雨后也要适时划锄，破除板结。

（二）强化水肥管理，促弱控旺。春季管理仍要把水肥管理作为重点，做好防旱和促弱控旺工作。对一类苗，突出氮肥后移；未浇冬水的一类苗麦田应在起身前期浇水；已浇冬水的一类苗麦田，肥水条件好，返青期亩总茎蘖数可达80—90万，可将肥水管理推迟到拔节期，控制早春分蘖，促进个体稳健生长。对二类苗，重点是适当促进春季分蘖，巩固冬前分蘖，提高分蘖成穗率；未浇冬水的二类麦田应在返青期浇水，并亩追施尿素6—8公斤；已浇冬水的二类苗麦田，应在起身后期浇水追肥，若返青期表墒较差，可提前至起身前中期，一般结合浇水亩追施尿素5—7公斤。对三类苗，应以促为主；未浇冬水三类苗麦田应返青前期浇水，并结合浇水亩追施尿素5—7.5公斤，磷酸二铵5—6公斤；对于已浇冬水的三类苗麦田，加强返青期肥水管理，以促为主；墒情好的三类苗麦田，做好返青前期中耕锄划提温保墒，促早发，增加早春分蘖，起身期配合浇水，亩追施尿素7.5—10公斤，配施磷酸二铵3—5公斤，提高成穗数；表墒差的三类苗麦田，春季应进行两次肥水管理，第一次浇水追肥应在返青时，亩追施尿素5—7公斤，配施磷酸二铵3—5公斤，拔节期进行第二次浇水追肥，亩追施尿素5—7公斤，提高成穗率，促进小花发育，增加穗粒数。旱地晚播弱苗田应趁雨雪追肥和早春返浆期追施速效氮肥，一般亩施尿素5—7公斤，磷肥施用不足田块可配施磷酸二铵5公斤。对旺长麦田，早春可控制肥水，起身初期采取镇压或化控措施控制旺长，在拔节后期浇水施肥，防止脱肥转弱。

（三）中耕化控施肥补救，防冻抗倒。要密切关注天气变化，做好应对“倒春寒”的准备。对土壤松垣麦田，要及早镇压；对旺长麦田，要深耘、镇压相结合，增强抗逆能力。在大幅降温前及时灌水，平抑地温，或采取叶面喷施磷酸二氢钾或植物细胞膜稳态剂等生长调节剂，预防春季冻害。寒潮过后应尽快调查幼穗受冻情况，分类施肥补救，促进恢复生长。具体措施参照黄淮海冬麦区。有倒伏倾向的旺苗麦田，返青后尽早镇压一次，同时在拔节前采取喷施“壮丰安”或多效唑等化控措施预防。

（四）及时防病治虫，适时化除。冬前未化学除草的麦田，要根据田间杂草种类，选择对路除草剂，也可结合中耕划锄进行人工除草。灌区小麦叶龄大于3叶、旱地小麦叶龄大于4叶可适时适墒适温化学除草，一般选择在喷药前后3天内日平均气温在6℃以上晴天进行。重点做好病害（条锈病、根腐病、叶锈病、纹枯病、白粉病）和虫害（红蜘蛛、蚜虫）的监测防治，拔节前做到“准确监测，带药侦察，发现一点，控制一片”。及时指导农民科学选药、安全用药，绿色早防早治，统防统治。

分享到：

浏览量：【字体： 大 中 小 】 【 关闭 】

联系我们 | 关于本站 | 网站地图 | 网站声明

党政机关

版权所有：河北省农业农村厅 网站维护制作：河北省农业信息中心

冀ICP备06019716号-5 | 网站标识码：1300000031

冀公网安备 13010802000775号

网站保留所有权，未经许可不得复制、镜像