ICS 65.100
B 17

中华人民共和国国家标准

GB/T 8321.1—2000

农药合理使用准则(一)

Guideline for safety application of pesticides (Ⅰ)

2000-06-13 发布　　2000-10-01 实施

国家质量技术监督局 发布

前　　言

为指导科学、合理、安全使用农药，有效防治农作物病、虫、草害，防止农产品中农药残留量超过规定的限量标准，保护环境，保障人体健康而制定本标准。

本标准对《农药合理使用准则》(一)(GB 8321.1—1987)进行修订，参照《农药合理使用准则》(五)(GB/T 8321.5—1997)编写格式，依照我国和FAO/WHO规定的MRL值，按照1999年度《农药登记公告》中的施药量、施药方法等而修订。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由中华人民共和国农业部归口。

本标准由农业部农药检定所等十七个单位起草。

本标准主要起草人：李本昌、高晓辉。

本标准委托农业部农药检定所负责解释。

中华人民共和国国家标准

农药合理使用准则(一)

GB/T 8321.1—2000

Guideline for safety application of pesticides (Ⅰ)

1 范围

本标准规定了18种农药在11种农作物上32项合理使用准则。

本标准适用于农作物病、虫、草害的防治。

2 项目和技术指标

项目和技术指标见表1、表2、表3。

3 实施说明

3.1 防治农作物病虫草害时,应切实贯彻执行“预防为主,综合防治”的方针,积极采用各种有效的非化学防治手段;使用化学农药时,各地要因地制宜,灵活掌握,但不得超过本标准规定的施药量(浓度)和最多使用次数;提倡不同类型的农药交替使用。

3.2 各地有关部门要做好宣传和教育工作,普及科学、合理、安全使用农药的科技知识,提高施药人员的素质。

3.3 使用农药时要做好防护,施药后要及时彻底清洗,并注意防止污染水源和环境。

国家质量技术监督局2000-06-13批准　　2000-10-01实施

表 1　杀虫剂/杀螨剂

农药			适用作物	主要防治对象	每667 m² 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
涕灭威 aldicarb	铁灭克 Temik	15%颗粒剂 5%颗粒剂	棉花	蚜虫、螨类	200～400 g(30～60 g) 600～1 200 g(30～60 g)	沟施或穴施	1		剧毒注意安全	棉籽 0.01
双甲脒 amitraz	螨克 Mitac	20%乳油	柑桔	螨类、介壳虫	1 000～1 500 倍液（133～200 mg/L）	喷雾	春梢3次 夏梢2次	21		全果 0.5
溴螨酯 bromopropylate	螨代治 Neoron	50%乳油	苹果	螨类	1 000～2 000 倍液（250～500 mg/L）	喷雾	2	21		全果 5
克百威 carbofuran	呋喃丹 Furadan	3%颗粒剂	棉花	棉蚜	1 500～2 000 g(45～60 g)	沟施	1		播前或播时施	棉籽 0.1
			水稻	螟虫、稻飞虱等	2 000～3 000 g(60～90 g)	撒施	2	60	一般只在秧田施一次	糙米 0.2 稻谷 0.5
杀螟丹 cartap	巴丹 padan	50%可溶性粉剂	水稻	螟虫等	40～100 g(20～50 g)	喷雾	3	21		糙米 0.1
毒死蜱 chlorpyrifos	乐斯本 lorsban	48%乳油	棉花	棉蚜、棉铃虫、红铃虫等	62.5～125 mL(30～60 g)	喷雾	3	21		棉籽 0.05
氯氰菊酯 cypermethrin	安绿宝 Arrivo 灭百可 Ripcord	10%乳油 5%乳油	叶菜	菜青虫、蚜虫等	25～35 mL(10%)(2.5～3.5 g) 50～70 mL(5%)(2.5～3.5 g)	喷雾	3	5		1
			果菜（番茄）	蚜虫、棉铃虫等			2	1		0.5

表 1(续)

农药			适用作物	主要防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
溴氰菊酯 deltamethrin	敌杀死 Decis	2.5%乳油	苹果	桃小食心虫等	1 250～2 500 倍液(5～10 mL/L)	喷雾	3	5		0.1
			柑桔	潜叶蛾、蚜虫等	2 500～5 000 倍液(5～10 mg/L)		3	28		0.05
			叶菜	菜青虫、小菜蛾、蚜虫等	20～40 mL(0.5～1 g)		3	2		0.2
			茶树	茶尺蠖、茶毛虫、茶小绿叶蝉、介壳虫等	800～1 500 倍液(20～31 mg/L)		1	5		10
			烟草	烟青虫、蚜虫等	20～40 mL(0.5～1 g)		3	15		2
氰戊菊酯 fenvalerale	速火杀丁 Sumicidin	20%乳油	苹果	桃小食心虫等	2 000～4 000 倍液(50～100 mg/L)	喷雾	3	14		2
			棉花	棉蚜、棉铃虫、红铃虫等	25～50 mL(5～10 g)		3	7		棉籽 0.2
			叶菜	菜青虫、小菜蛾等	20～40 mL(4～8 g)		3	夏季 5 天，秋冬季 12 天		1
			茶树	茶尺蠖、茶毛虫、丽绿刺蛾、黑刺粉虱等	8 000～10 000 倍液(20～25 mg/L)		1	10		2

表 1(完)

农药			适用作物	主要防治对象	每667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
抗蚜威 pirimicarb	辟蚜雾 Pirimor	50%可湿性粉剂	叶菜	蚜虫	10～18 g(5～9 g)	喷雾	3	11		1
喹硫磷 quinalphos	爱卡士 Ekalux	25%乳油	柑桔	蚜虫、潜叶蛾、介壳虫等	1 000倍液(250 mg/L)	喷雾	3	28		全果0.5
			叶菜	菜青虫、斜纹夜蛾、蚜虫等	60～80 mL(15～20 g)		2	24	适用于甘蓝、大白菜	0.2
			水稻	螟虫、稻瘿蚊、稻飞虱、蓟马、叶蝉等	150～200 mL(37.5～50 g)		3	14		糙米0.2
			茶树	茶尺蠖、叶蝉、介壳虫等	1 500～2 500倍液(100～167 mg/L)		1	14		0.2

表 2　杀菌剂

农药			适用作物	主要防治对象	每667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
四氯苯酞(稻瘟酞) fthalide	热必斯 Rabcide	50%可湿性粉剂	水稻	稻瘟病	64～100 g(32～50 g)	喷雾	4	21		糙米1

表 2(完)

农药			适用作物	主要防治对象	每 667 m² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
稻瘟灵 isoprothiolane	富士一号 FujiOne	40%乳油	水稻	稻瘟病	66.5～100 mg(26.6～40 g)	喷雾	3(早稻) 2(晚稻)	14(早稻) 28(晚稻)		糙米 2
		40%可湿性粉剂								
三唑酮 triadimefon	百理通 粉锈宁 Bayleton	25%可湿性粉剂	小麦	白粉病、锈病	28～33 g(7～8.25 g)	喷雾	2	20	防锈病用高剂量	籽粒 0.5
三环唑 tricyclazole	比艳 Beam	75%可湿性粉剂	水稻	稻瘟病	20～27 g(15～20.25 g)	喷雾	2	21		糙米 2

表 3　除草剂

农药			适用作物	主要防治对象	每 667 m² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
甲草胺 alachlor	拉索 Lasso	48%乳油	花生	一年生杂草	150～250 mL(72～120 g)	土壤喷雾	1		芽前土壤处理,避免在多雨、沙性土壤和地下水位高的地区使用,有机质含量高的地块用高剂量	籽粒 0.05
			大豆		300～467 mL(144～224.16 g)					籽粒 0.2
丁草胺 butachlor	马歇特 Mathete	60%乳油	水稻	一年生杂草	83～142 mL(49.8～85.2 g)	喷雾或毒土	1		插秧前 2～3 天或插秧后 4～6 天施	糙米 0.5
		5%颗粒剂			1 000～1 700 g(50～85 g)					
烯禾定 sethoxydin	拿捕净 Nabu	20%乳油	大豆	一年生禾本科杂草	100～200 mL(20～40 g)	喷雾	1		杂草 3～5 叶期,大豆苗期喷施	籽粒 2

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
农药合理使用准则(一)
GB/T 8321.1—2000
*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
http://www.bzcbs.com
电话:63787337、63787447
2002年4月第一版 2004年11月电子版制作
*
书号:155066·1-18323

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

GB/T 8321.1-2000