ICS 65.100
B 17

中华人民共和国国家标准

GB/T 8321.7—2002

农药合理使用准则(七)

Guideline for safety application of pesticides(Ⅶ)

2002-09-24 发布　　2003-03-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局　发布

前　言

《农药合理使用准则》分为以下几个部分：

——GB/T 8321.1—2000　农药合理使用准则(一)

——GB/T 8321.2—2000　农药合理使用准则(二)

——GB/T 8321.3—2000　农药合理使用准则(三)

——GB 8321.4—1993　农药合理使用准则(四)

——GB/T 8321.5—1997　农药合理使用准则(五)

——GB/T 8321.6—2000　农药合理使用准则(六)

……

本部分为 GB/T 8321 的第七部分。

为指导科学、合理、安全使用农药，有效防治农作物病、虫草害，并使农产品中农药残留不超过规定的限量标准，保护环境，保障人体健康而制定 GB/T 8321 的本部分。

本部分根据 1996～1998 年农药残留试验结果，依照我国、联合国粮农组织(FAO)/世界卫生组织(WHO)及参照其他国家现有的农药最高残留限量标准(MRL)值而制定。本部分中的施药量(浓度)、施药方法，按照《农药登记公告》而定。

本部分由中国人民共和国农业部提出并归口。

本部分由农业部农药检定所等三十个单位起草。

本部分主要起草人：刘光学、高晓辉、秦冬梅、龚勇、何艺兵、陶传江、朱光艳。

农药合理使用准则(七)

1 范围

GB/T 8321 的本部分规定了 32 种农药在 17 种作物上 42 项合理使用准则。

本部分适用于农作物病、虫、草害的防治。

2 项目和技术指标

项目和技术指标见表 1、表 2、表 3。

表 1　杀虫剂/杀螨剂

农药			适用作物	防治对象	每公顷每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参照值/(mg/kg)
通用名	商品名[a]	剂型及含量								
啶虫咪 acetamiprid	莫比朗 Mospilan	3%乳油	黄瓜	蚜虫	2 000 倍液～2 500 倍液 (12 mg/L～15 mg/L)	喷雾	3	2		0.5
			苹果				1	30		
			柑桔					14		
丙硫克百威 benfuracarb	安克力 Oncol	20%乳油	棉花	蚜虫	750 mL～1 000 mL	喷雾	2	30		棉籽 0.2
			苹果		1 500 倍液～3 000 倍液 (66.7 mg/L～133.3 mg/L)			50		0.05
丁硫克百威 carbosulfan	好年冬 Marshal	20%乳油	棉花	蚜虫	450 mL～900 mL	喷雾	2	30		棉籽 0.05
			甘蓝		281 mL～562 mL			7		0.2
			苹果		3 000 倍液～4 000 倍液 (50 mg/L～66.7 mg/L)		3	30		0.05
氟氯氰菊酯 cyfluthrin	百树得 Paythroid	5.7%乳油	甘蓝	菜青虫	350 mL～440 mL	喷雾	2	7		0.5
β-氟氯氰菊酯 beta-cyfluthrin	保得 Bulldock	2.5%乳油		菜青虫 蚜虫	400 mL～500 mL					
[a] 啶虫咪等的商品名是适合的市售产品的多个实例。给出这一信息是为了方便本标准的使用者,并不表示对这些商品的认可。										
硫丹 endosulfan	赛丹 Thiodan 硕丹 thionex	35%乳油	烟草	烟蚜 烟青虫	1 000 mL～1 500 mL	喷雾	3	15		20
氟虫腈 fipronil	锐劲特 Regent	5%悬浮剂	甘蓝	小菜蛾	250 mL～500 mL	喷雾	3	3		0.05
吡虫啉 imidacloprid	康福多 Confidor	20%浓可溶剂	水稻	稻飞虱	100 mL～150 mL	喷雾	2	7		糙米 0.2
			棉花	苗蚜 伏蚜	75 mL～150 mL 150 mL～225 mL	喷雾	3	14		棉籽 1
四聚乙醛 metaldehyde	密达 Meta	6%颗粒剂	叶菜	蜗牛 蛞蝓	700 g～8 500 g	撒施	2	7		1

表 2　杀菌剂/杀线虫剂

农药			适用作物	防治对象	每公顷每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参照值/(mg/kg)
通用名	商品名	剂型及含量								
氟苯唑 fenbuconazole	应得 Indar	24%悬浮剂	香蕉	叶斑病	960 倍液～1 200 倍液 (200 mg/L～250 mg/L)	喷雾	3	42		全蕉 3 香蕉肉 0.05
抑霉唑 imazalil	戴唑霉 Decozil	22.2%乳油	柑桔	青绿霉菌	444 倍液～888 倍液 (250 mg/L～500 mg/L)	浸果	1	60 (处理后距上市时间)	浸 1 min 取出	全果 5 果肉 0.1
	万利得 Magnate	50%乳油			1 000 倍液～2 000 倍液 (250 mg/L～500 mg/L)					
双胍辛胺乙酸盐 iminoctadine-triacetate	百可得 Bellkute	40%可湿性粉剂	柑桔	储存期病害	1 000 倍液～2 000 倍液 (200 mg/L～400 mg/L)	浸果	1	60(处理后距上市时间)	浸 1 min 取出	全果 4 果肉 0.8
			苹果	斑点落叶病	800 倍液～1 000 倍液 (400 mg/L～500 mg/L)	喷雾	3	21		全果 1
代森锰锌 mancozeb	大生 Dithane-M-45	80%可湿性粉剂	西瓜	炭疽病	2 490 g～3 750 g	喷雾	3	21		代森锰锌 1 乙撑硫脲 0.05
	喷克 Vondozeb	42%干悬浮剂	香蕉	叶斑病	300 倍液～400 倍液 (1 400 mg/L～1 050 mg/L)	喷雾	3	7		代森锰锌 1 乙撑硫脲 0.1
咪鲜胺 prochloraz	扑霉灵 Mirage	45%乳油	芒果	储存病害	450 倍液～900 倍液 (500 mg/L～1 000 mg/L)	浸果	1	7(处理后距上市时间)	浸 1 min 取出	柑桔类水果 5
咪鲜胺＋氯化锰 prochloraz＋manganese chloride	施保功 Sporgon	50%可湿性粉剂	蘑菇	褐腐病、湿泡病	0.8 g/(m²·次)～1.2 g(m²·次)	喷雾	2	8	均匀喷雾在培养料上	咪鲜胺 2
丙环唑 propiconazol	敌力脱 Tilt 必扑尔 Bumper	25%乳油	香蕉	叶斑病	500 倍液～1 000 倍液 (250 mg/L～500 mg/L)	喷雾	2	42		0.1

表 2 （续）

农药			适用作物	防治对象	每公顷每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参照值/(mg/kg)
通用名	商品名	剂型及含量								
霜脲氰＋代森锰锌 cymoxanil＋mancozeb	克露 Cuzate-M8	72%可湿性粉剂（霜脲氰 8%）	黄瓜	霜霉病	2 000 g～2 500 g	喷雾	3	2		番茄(霜脲氰) 2
福美双＋戊菌隆 thiram＋pencycuron	苗盛 Moncer-cent	47%湿拌剂（福美双 32%，戊菌隆 15%）	棉花	立枯病、炭疽病	2.35 g/kg 种子～3.525 g/kg 种子	拌种	1		播种前拌种	小麦：福美双 0.2 糙米：戊菌隆 0.5

表 3 除草剂/植物生长调剂

农药			适用作物	防治对象	每公顷每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参照值/(mg/kg)
通用名	商品名	剂型及含量								
乙草胺 acetochlor	禾耐斯 Harness	90%乳油	花生	一年生禾本科杂草、部分阔叶杂草	867 g～1 416 g	喷施	1		播后苗前喷施	0.01
莠火净 ametryn	阿火净 Ametrex	80%可湿性粉剂	甘蔗	一年生禾本科杂草、部分阔叶杂草	1 950 g～3 000 g	喷施	1		苗期喷施	0.3
莎稗磷 anilofos	阿罗津 Arozin	30%乳油	水稻	一年生禾本科杂草莎草	900 mL～1 200 mL	毒土或喷雾	1		移栽后 7 d～10 d 施用	糙米 0.1
禾草丹 thiobencarb	杀草丹 Saturn	10%颗粒剂	水稻	一年生禾本科杂草	19 950 g～30 000 g	毒土	1		移栽后 7 d～10 d 撒施	糙米 0.2

表 3 （续）

农药			适用作物	防治对象	每公顷每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参照值/(mg/kg)
通用名	商品名	剂型及含量								
醚磺隆 cinosulfuron	涉多伏 Setoff	20%水分散粒剂	水稻	一年生阔叶杂草	90 g～150 g	毒土	1		移栽后7 d～10 d撒施	糙米 0.1
环丙嘧磺隆 cyclosulfamuron	金秋 Jin-Qiu	10%可湿性粉剂	水稻	阔叶杂草	150 g～400.5 g	毒土或喷雾	1		移栽后7 d～15 d施用	糙米 0.05
野燕枯 difenzoquat	燕麦枯 野麦枯 Avenge	40%水剂	小麦	野燕麦	3 000 g～3 750 g	喷雾	1		苗后喷施	籽粒 0.05
乙氧磺隆 ethoxysufuron	太阳星 Sunstar	15%水分散粒剂	水稻	阔叶杂草及莎草	45 g～75 g(华南) 75 g～105 g(长江流域) 105 g～210 g(东北华北地区)	毒土	1		移栽后7 d～10 d撒施	糙米 0.01
氟磺草胺 flumets-ulam	阔草清 Broads-trike	80%水分散粒剂	玉米	阔叶杂草	56 g～75 g	喷雾	1		苗后喷施	籽粒 0.1
			大豆						播后苗前喷施	籽粒 0.05
异丙甲草胺 metolachlor	都尔 Dual	72%乳油	玉米	一年生杂草	1 350 g～2 700 g	喷雾	1		苗期喷施	鲜籽粒 0.1
oxadiargyl	稻思达 Topstar	80%水分散粒剂	水稻	稗草莎草及阔叶杂草	75 g～124.95 g	毒土	1		移栽后7 d～10 d毒土撒施	糙米 0.01
百草枯 paraquat	百朵 Pectone	20%水剂	棉花	枯叶剂	1 200 g～1 500 g(新疆) 1 500 g～2 100 g (其他地区)	喷雾	1	14	第一次霜降前两周喷施	棉籽 0.2

表 3 （续）

农药			适用作物	防治对象	每公顷每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参照值/(mg/kg)
通用名	商品名	剂型及含量								
莎稗磷＋乙氧磺隆 anilofos＋ethoxysufuron	必宁特 Benefiter	30%可湿性粉剂(莎稗磷 27%，乙氧磺隆 3%)	水稻	杂草	750 g～900 g(长江以北的其他地区) 900 g～1 050 g(东北)	毒土	1		移栽后 7 d～10 d 毒土撒施长江以北不能用	糙米：莎稗磷 0.1 乙氧磺隆 0.01
苄嘧磺隆＋禾草丹 bensulfuron-M＋thiobencarb	龙杀 Lonsat	35.75 可湿性粉剂(苄嘧磺隆 0.75%禾草丹 35%)	水稻	稗草莎草及阔叶杂草	3 000 g～4 500 g(南方) 4 500 g～6 000 g(北方) 2 250 g～3 000 g(秧田)	毒土或喷雾	1		移栽后 7 d～10 d 毒土撒施或喷施	糙米：禾草丹 0.2 苄嘧磺隆 0.02

3 实施说明

3.1 防治农作物病虫草害时，应贯彻执行“预防为主，综合防治”方针，积极采用各种有效的非化学防治手段；使用农药时，各地要因地制宜，灵活掌握，但不得超过GB/T 8321的本部分规定的施药量（浓度）和最多使用次数；提倡不同类型的农药交替使用。

3.2 各地有关部门要做好宣传和教育工作，普及科学、合理、安全使用农药的科技知识，提高施药人员的素质。

3.3 使用农药时要做好防护，施药后要及时彻底清洗，并注意防止污染水源和环境。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
农药合理使用准则(七)
GB/T 8321.7—2002
*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
http://www.bzcbs.com
电话:63787337、63787447
2003年2月第一版 2004年11月电子版制作
*
书号:155066·1-19110

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

GB/T 8321.7-2002