ICS 65.100
B 17

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 8321.3—2000

# 农药合理使用准则(三)

**Guideline for safety application of pesticides (Ⅲ)**

2000-06-13 发布　　2000-10-01 实施

国家质量技术监督局 发布

# 前　言

为指导科学、合理、安全使用农药，有效防治农作物病、虫、草害，防止农产品中农药残留量超过规定的限量标准，保护环境，保障人体健康而制定本标准。

本标准对《农药合理使用准则》(三)(GB 8321.3—1987)进行修订，参照《农药合理使用准则》(五)(GB/T 8321.5—1997)编写格式，依照我国和FAO/WHO规定的MRL值，按照1999年度《农药登记公告》中的施药量、施药方法等而修订。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由中华人民共和国农业部归口。

本标准由农业部农药检定所等四十个单位起草。

本标准主要起草人：李本昌、高晓辉。

本标准委托农业部农药检定所负责解释。

中华人民共和国国家标准

# 农药合理使用准则(三)

GB/T 8321.3—2000

**Guideline for safety application of pesticides (Ⅲ)**

代替 GB 8321.3—1987

## 1 范围

本标准规定了53种农药在13种农作物上83项合理使用准则。

本标准适用于农作物病、虫、草害的防治。

## 2 项目和技术指标

项目和技术指标见表1、表2、表3。

## 3 实施说明

3.1 防治农作物病虫草害时,应切实贯彻执行"预防为主,综合防治"的方针,积极采用各种有效的非化学防治手段;使用化学农药时,各地要因地制宜,灵活掌握,但不得超过本标准规定的施药量(浓度)和最多使用次数;提倡不同类型的农药交替使用。

3.2 各地有关部门要做好宣传和教育工作,普及科学、合理、安全使用农药的科技知识,提高施药人员的素质。

3.3 使用农药时要做好防护,施药后要及时彻底清洗,并注意防止污染水源和环境。

国家质量技术监督局2000-06-13批准　　2000-10-01实施

表 1　杀虫剂/杀螨剂

| 农药 | | | 适用作物 | 主要防治对象 | 每 667 $m^2$ 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度） | 施药方法 | 每季作物最多使用次数 | 最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）d | 实施要点说明 | 最高残留限量（MRL）值 mg/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用名 | 商品名 | 剂型及含量 | | | | | | | | |
| 涕灭威 aldicarb | 铁灭克 Temik | 15%颗粒剂 | 花生 | 根结线虫、地下害虫等 | 1 000～1 333 g(150～200 g) | 沟施 | 1 | | 播种时施入沟内，避免在多雨沙性土壤和地下水高的地区使用 | 花生仁 0.05 |
| | | 5%颗粒剂 | | | 3 000～4 000 g(150～200 g) | | | | | |
| 顺式氯氰菊酯 alphacypermethrin | 百事达 Bestox | 5%乳油 | 棉花 | 棉蚜、棉铃虫、红铃虫、棉盲蝽等 | 34～46 mL(1.7～2.3 g) | 喷雾 | 3 | 14 | 防棉铃虫、红铃虫时用高剂量 | 棉籽 0.2 |
| | | 10%乳油 | 叶菜 | 菜青虫、蚜虫、小菜蛾等 | 5～10 mL(0.5～1 g) | | 3 | 3 | | 1 |
| | | | 黄瓜 | 蚜虫等 | | | | | | 0.2 |
| 二唑锡 azocyclotin | 倍乐霸 Peropal | 25%可湿性粉剂 | 苹果 | 红蜘蛛等 | 1 000～1 330 倍液（185～250 mg/L） | 喷雾 | 3 | 14 | | 2 |
| 丙硫克百威 benfuracarb | 安克力 Oncol | 5%颗粒剂 | 棉花 | 棉蚜等 | 2 000 g(100 g) | 沟施 | 1 | | | 棉籽 0.1 |
| | | | 水稻 | 螟虫等 | 2 000～2 500 g(100～125 g) | 撒施 | 1 | 60 | 一般只在秧田施 | 糙米 0.2 |
| 联苯菊酯 biphenthrin | 天王星 Talstar | 10%乳油 | 棉花 | 棉铃虫、红铃虫等 | 20～35 mL(2～3.5 g) | 喷雾 | 3 | 14 | | 棉籽 0.5 |
| | | | | 红蜘蛛等 | 30～40 mL(3～4 g) | | | | | |
| | | | 番茄 | 白粉虱等 | 5～10 mL(0.5～1 g) | | 3 | 4 | 大棚 | 0.5 |

表 1(续)

| 农药 | | | 适用作物 | 主要防治对象 | 每 667 m² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度) | 施药方法 | 每季作物最多使用次数 | 最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d | 实施要点说明 | 最高残留限量(MRL)值 mg/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用名 | 商品名 | 剂型及含量 | | | | | | | | |
| 噻嗪酮 buprofenzin | 优乐得 扑虱灵 稻虱净 Applaud | 25%可湿性粉剂 | 水稻 | 稻飞虱等 | 20～30 g(5～7.5 g) | 喷雾 | 2 | 14 | | 糙米 0.3 |
| 杀螟丹 cartap | 巴丹 Padan | 50%可溶性粉剂 | 茶树 | 茶小绿叶蝉等 | 750～1 000 倍液(500～667 mg/L) | 喷雾 | 2 | 7 | | 20 |
| | | 98%原粉 | | | 1 500～2 000 倍液(490～653 mg/L) | | | | | |
| 氯氟氰菊酯 cyhalothrin | 功夫 Kung Fu | 2.5%乳油 | 柑桔 | 螨类、潜叶蛾、介壳虫等 | 4 000～6 000 倍液(4.2～6.2 mg/L) | 喷雾 | 3 | 21 | | 全果 0.2 |
| | | | 叶菜 | 蚜虫、菜青虫、红蜘蛛等 | 25～50 mL(6.25～12.5 g) | | 3 | 7 | | 0.2 |
| | | | 茶树 | 茶尺蠖、茶小绿叶蝉等 | 2 000～4 000 倍液(25～50 mg/L) | | 3 | 7 | | 3 |
| 氯氰菊酯 cypenmethrin | 赛波凯 Cyperkill | 25%乳油 | 苹果 | 桃小食心虫等 | 4 000～5 000 倍液(50～60 mg/L) | 喷雾 | 3 | 21 | | 2 |
| | | | 棉花 | 棉蚜、棉铃虫、红铃虫等 | 12～16 mL(3～4 g) | | 3 | 14 | | 棉籽 0.2 |
| | | | 叶菜 | 菜青虫、蚜虫等 | 10～14 mL(2.5～3.5 g) | | 3 | 3 | | 1 |

表 1(续)

| 农药 | | | 适用作物 | 主要防治对象 | 每 667 $m^2$ 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度) | 施药方法 | 每季作物最多使用次数 | 最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d | 实施要点说明 | 最高残留限量(MRL)值 mg/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用名 | 商品名 | 剂型及含量 | | | | | | | | |
| 溴氰菊酯 deltamethrin | 敌杀死 Decis | 2.5%乳油 | 棉花 | 蚜虫、棉铃虫、红铃虫、蓟马等 | 20～40 mL(0.5～1 g) | 喷雾 | 3 | 14 | | 棉籽 0.1 |
| 除虫脲 diflubenzuron | 敌灭灵 Dimilin | 25%可湿性粉剂 | 苹果 | 尺蠖、桃小食心虫等 | 1 000～2 000 倍液(125～250 mg/L) | 喷雾 | 3 | 21 | | 1 |
| | | | 小麦 | 粘虫等 | 6～20 g(1.5～5 g) | | 2 | 21 | | 籽粒 0.1 |
| 顺式氰戊菊酯 esfenvalerate | 来福灵(双爱士) Sumialpha | 5%乳油 | 苹果 | 桃小食心虫等 | 2 000～3 125 倍液(16～25 mg/L) | 喷雾 | 3 | 14 | | 全果 2 |
| | | | 柑桔 | 潜叶蛾等 | 7 000～8 000 倍液(6～7 mg/L) | | | 21 | | 全果 2 |
| | | | 棉花 | 棉铃虫、红铃虫、蚜虫等 | 25～35 mL(1.25～1.75 g) | | | 14 | | 棉籽 0.2 |
| | | | 叶菜 | 菜青虫、小菜蛾等 | 10～20 mL(0.5～1 g) | | | 3 | | 2 |
| | | | 茶树 | 茶尺蠖、茶小绿叶蝉等 | 8 000～10 000 倍液(5～6.25 mg/L) | | 1 | 7 | | 2 |
| 苯丁锡 fenbutatin-oxide | 托尔克 Torgue | 50%可湿性粉剂 | 柑桔 | 螨类、锈壁虱等 | 2 000～3 000 倍液(167～250 mg//L) | 喷雾 | 2 | 21 | | 全果 5 |
| | | | 番茄 | 红蜘蛛 | 20～40 mL(10～20 g) | | | 7 | | 1 |

表 1(续)

| 农药 | | | 适用作物 | 主要防治对象 | 每 667 m² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度) | 施药方法 | 每季作物最多使用次数 | 最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d | 实施要点说明 | 最高残留限量(MRL)值 mg/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用名 | 商品名 | 剂型及含量 | | | | | | | | |
| 甲氰菊酯 fenpropathrin | 灭扫利 Meothrin | 20%乳油 | 苹果 | 桃小食心虫、红蜘蛛等 | 2 000～3 000 倍液(67～100 mg/L) | 喷雾 | 3 | 30 | 防红蜘蛛用低浓度 | 全果 5 |
| | | | 棉花 | 棉铃虫、红铃虫、蚜虫等 | 30～40 mL(6～8 g) | | | 14 | | 棉籽 0.1 |
| | | | 叶菜 | 菜青虫、小菜蛾等 | 25～30 mL(5～6 g) | | | 3 | | 0.5 |
| 氟胺氰菊酯 fluvalinate | 马扑立克 Mavrik | 10%乳油 | 棉花 | 棉铃虫、红铃虫、蚜虫、螨类等 | 25～50 mL(2.5～5 g) | 喷雾 | 3 | 14 | | 棉籽 0.2 |
| | | | 叶菜 | 菜青虫等 | | | | 7 | | 1 |
| 地虫硫磷 fonofos | 大风雷 Dyfonate | 5%颗粒剂 | 花生 | 蛴螬等 | 2 000～3 000 g(100～150 g) | 沟施 | 1 | | 播种时沟施 | 花生仁 0.1 |
| | | 3%颗粒剂 | | | 3 333～5 000 g(100～150 g) | | | | | |
| 稻丰散 phenthoate | 爱乐散 Elsan | 50%乳油 | 柑桔 | 矢尖蚧、红腊蚧、矢虱等 | 1 000～1 500 倍液(333～500 mg/L) | 喷雾 | 3 | 30 | | 全果 1 |
| 伏杀硫磷 phosalone | 佐罗纳 Zolone | 35%乳油 | 棉花 | 蚜虫、棉铃虫、红铃虫等 | 131～189 mL(45.85～66.15 g) | 喷雾 | 3 | 14 | | 棉籽 0.1 |
| 抗蚜威 pirimicarb | 辟蚜雾 Pirimor | 50%可湿性粉剂 | 大豆 | 蚜虫 | 10～16 g(5～8 g) | 喷雾 | 3 | 10 | | 籽粒 1 |
| | | | 烟草 | | 16～22 g(8～11 g) | | | 7 | | 1 |

表 1(完)

| 农药 | | | 适用作物 | 主要防治对象 | 每 667 m² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度) | 施药方法 | 每季作物最多使用次数 | 最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d | 实施要点说明 | 最高残留限量(MRL)值 mg/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用名 | 商品名 | 剂型及含量 | | | | | | | | |
| 快螨特<br>propargite | 螨除净<br>Comite | 73%乳油 | 苹果 | 螨类 | 2 000～3 000 倍液(243～365 mg/L) | 喷雾 | 3 | 30 | | 全果 5 |
| 噻嗪酮<br>buprofezen＋<br>异丙威<br>isoprocarb | 优佳安<br>Applandmipcin | 25%可湿性粉剂 | 水稻 | 稻飞虱等 | 100～150 g(25～37.5 g) | 喷雾 | 2 | 21 | | 糙米：<br>噻嗪酮 0.3<br>异丙威 0.2 |

表 2　杀菌剂/杀线虫剂

| 农药 | | | 适用作物 | 主要防治对象 | 每 667 m² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度) | 施药方法 | 每季作物最多使用次数 | 最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d | 实施要点说明 | 最高残留限量(MRL)值 mg/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用名 | 商品名 | 剂型及含量 | | | | | | | | |
| 灭瘟素<br>blasticidin-S | 勃拉益斯<br>Bla-S | 2%乳油 | 水稻 | 稻瘟病 | 75～100 mL(1.5～2 g) | 喷雾 | 3 | 7 | | 糙米 0.05 |
| 灭线磷<br>ethoprophos | 益收宝<br>Mocap | 20%颗粒剂 | 花生 | 根结线虫 | 1 500～1 750 g(300～350 g) | 沟施 | 1 | | 播种时沟施，避免与种子接触 | 花生仁 0.02 |
| 氟酰胺<br>flutolanil | 望佳多<br>Moncut | 20%可湿性粉剂 | 水稻 | 纹枯病 | 100～125 g(20～25 g) | 喷雾 | 2 | 21 | | 糙米 1 |
| 恶霉灵<br>hymexazol | 土菌消<br>Tachigaren | 30%水剂 | 水稻 | 立枯病 | 3～6 mL/m² 苗床<br>(0.9～1.8 g/m² 苗床) | 浇施 | 3 | | 秧田播前至苗期施 | 糙米 0.5 |
| | | 70%可湿性粉剂 | 甜菜 | | 4～7 g/kg 种子<br>(2.8～4.9 g/kg 种子) | 拌种 | | | 可与福美双混用，加福美双 28～49 g/kg 种子(有效成分 2～4 g/kg) | 0.5 |

表 2(完)

| 农药 | | | 适用作物 | 主要防治对象 | 每 667 m² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度) | 施药方法 | 每季作物最多使用次数 | 最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d | 实施要点说明 | 最高残留限量(MRL)值 mg/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用名 | 商品名 | 剂型及含量 | | | | | | | | |
| 灭锈胺<br>mepronil | 纹达克<br>Basitac | 75%可湿性粉剂 | 水稻 | 纹枯病 | 66.7～75 g(50～56.25 g) | 喷雾 | 2 | 30 | | 糙米 1 |
| 腐霉利<br>procymidone | 速克灵<br>Sumilex | 50%可湿性粉剂 | 油菜 | 菌核病 | 30～60 g(15～30 g) | 喷雾 | 2 | 25 | | 籽粒 2 |
| 噻菌灵<br>thiabendazole | 特克多<br>Tecto | 45%悬浮剂 | 柑桔 | 贮藏病害 | 300～450 倍液(1 000～1 500 mg/L) | 浸果 | 1 | | 浸泡 1 min 后取出贮存 | 全果 10 |
| 甲基硫菌灵<br>thiophana-temethyl | 甲基托布津<br>Topsin-M | 70%可湿性粉剂 | 水稻 | 稻瘟病、纹枯病 | 100～143 g(70～100 g) | 喷雾 | 3 | 30 | 不得与铜制剂混用 | 糙米 0.1 |
| | | | 小麦 | 黑穗病、赤霉病 | 71～100 g(49.7～70 g) | | 1 | | | 籽粒 0.1 |
| 萎锈灵<br>carboxin＋<br>福美双<br>thiram | 卫福<br>Vitavax | 75%可湿性粉剂 | 小麦 | 黑穗病、根腐病、条纹病 | 2.5～2.8 g/kg 种子(1.88～2.1 g/kg 种子) | 拌种 | | | | 籽粒：<br>萎锈灵 0.2<br>福美双 0.2 |
| | | 40%悬浮剂 | | | 2.7～3.3 g/kg 种子(1.08～1.32 g/kg 种子) | | | | | |
| 丁、戊、己二酸酮<br>copper guccinate＋<br>copper glutarte＋<br>copper adioate＋ | 琥胶肥酸铜(二元酸铜)<br>DT | 30%悬浮剂 | 黄瓜 | 角斑病 | 200～233 mL(60～70 g) | 喷雾 | 3 | 3 | | 铜 5 |
| 恶霜灵<br>oxadixyl<br>代森锰锌<br>mancozeb | 杀毒矾<br>Sandofan MZ | 64%可湿性粉剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | 172～203 g(110.1～130 g) | 喷雾 | 3 | 3 | | 恶霜灵 5 |
| | | | 烟草 | 黑胫病 | 203～250 g(130～160 g) | | | 20 | | 恶霜灵 30 |

表 3　除草剂/植物生长调节剂

| 农药 | | | 适用作物 | 主要防治对象 | 每 667 $m^2$ 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度） | 施药方法 | 每季作物最多使用次数 | 最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）d | 实施要点说明 | 最高残留限量（MRL）值 mg/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用名 | 商品名 | 剂型及含量 | | | | | | | | |
| 甲草胺<br>alachlor | 拉索<br>Lasso | 48%乳油 | 棉花 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 150～250 mL(72～120 g) | 土壤处理 | 1 | | 播后芽前施，避免在多雨，沙性土壤和地下水位高的地区使用，有机质含量高的地块用高剂量 | 棉籽 0.05 |
| 灭草松<br>bentazon | 排草丹<br>苯达松<br>Basagran | 48%液剂 | 水稻 | 莎草科杂草及阔叶杂草 | 133～200 mL(63.84～96 g) | 喷雾 | 1 | | 插秧后 20～30 天，杂草 3～5 叶期，排水后施 | 糙米 0.1 |
| 麦草畏<br>dicamba | 百草敌<br>Banvel | 48%水剂 | 小麦 | 一年生或多年生杂草 | 20～27 mL(9.6～12.96 g) | 喷雾 | 1 | | 小麦 3 叶期至分蘖末期喷施 | 籽粒 0.5 |
| 哌草丹<br>dimepiperate | 优克稗<br>MY-93 | 50%乳油 | 水稻 | 稗草 | 150～267 mL(75～133.5 g) | 撒施 | 1 | | 播后 1～4 天或插秧后 3～7 天拌细沙撒施 | 糙米 0.03 |
| 双苯酰草胺<br>diphenamid | 草乃敌、益乃得、双苯胺<br>Enide | 90%可湿性粉剂 | 烟草 | 一年生禾本科杂草，莎草科及阔叶杂草 | 333～481 g(299.7～432.9 g) | 喷雾 | 1 | | 烟田起垄后，杂草出土前施 | 2 |

表 3(续)

| 农药 | | | 适用作物 | 主要防治对象 | 每 667 m² 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度） | 施药方法 | 每季作物最多使用次数 | 最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）d | 实施要点说明 | 最高残留限量(MRL)值 mg/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用名 | 商品名 | 剂型及含量 | | | | | | | | |
| 精吡氟禾草灵 fluazifop-p-butyl | 精稳杀得 Onecide-p | 15%乳油 | 棉花 | 一年生禾本科杂草 | 33～67 mL(4.95～10.05 g) | 喷雾 | 1 | | 作物苗期，杂草 3～5 叶期喷施 | 棉籽 0.1 |
| | | | 花生 | | 50～67 mL(7.5～10.05 g) | | | | | 花生仁 0.1 |
| | | | 大豆 | | | | | | | 籽粒 0.1 |
| | | | 甜菜 | | | | | | | 0.1 |
| 氟草隆 fiuometuron | 棉草伏 Cotrom | 80%可湿性粉剂 | 棉花 | 一年生禾本科和阔叶杂草 | 133～150 g(106.4～120 g) | 土壤处理 | 1 | | 播后芽前施 | 棉籽 0.1 |
| 氟磺胺草醚 fomesafen | 虎威 Flex | 25%水剂 | 大豆 | 一年生阔叶杂草 | 66.8～133.2 mL(16.7～33.3 g) | 喷雾 | 1 | | 作物苗期，杂草 2～3 叶期喷施 | 籽粒 0.05 |
| 氟吡乙禾灵 behaloxyfopethyl | 盖草能 Gallant | 12.5%乳油 | 棉花 | 一年生禾本科杂草 | 40～64 mL(5～8 g) | 喷雾 | 1 | | 作物苗期，杂草 3～5 叶期喷施 | 棉籽 0.2 |
| | | | 花生 | | 64～80 mL(8～10 g) | | | | | 花生仁 0.05 |
| | | | 大豆 | | | | | | | 籽粒 0.5 |
| 乳氟禾草灵 lactofen | 克阔乐 Cobra | 24%乳油 | 大豆 | 阔叶杂草 | 25～40 mL(6～9.6 g) | 喷雾 | 1 | | 北方用 30～40mL/667m²，南方用 25～30mL/667m²，大豆 2～4 叶期喷施 | 籽粒 0.5 |
| 异丙甲草胺 metolach-lor | 都尔 Dual | 72%乳油 | 大豆 | 一年生禾本科及部分阔叶杂草 | 100～180 mL(72～129.6 g) | 土壤处理 | 1 | | 芽前施，避免在多雨、沙性土壤和地下水位高的地区使用 | 籽粒 0.1 |

表 3(续)

| 农药 | | | 适用作物 | 主要防治对象 | 每 667 m² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度) | 施药方法 | 每季作物最多使用次数 | 最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d | 实施要点说明 | 最高残留限量(MRL)值 mg/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用名 | 商品名 | 剂型及含量 | | | | | | | | |
| 嗪草酮<br>metribuzin | 赛克津<br>Sencor | 70%可湿性粉剂 | 大豆 | 一年生阔叶杂草 | 32.8～75.7 g(22.96～53 g) | 土壤处理 | 1 | | 施时避开雨天,施后避免灌水 | 籽粒 0.1 |
| 恶草酮<br>oxadiazon | 农思它<br>Ronstar | 25%乳油 | 花生 | 一年生杂草 | 100～150 mL(25～37.5 g) | 喷雾 | 1 | | 苗喷施 | 花生仁 0.3 |
| 乙氧氟草醚<br>oxyfluorfen | 果尔<br>Goal | 23.5 乳油 | 水稻 | 一年生杂草 | 10～20 mL(2.35～4.7 g) | 撒施 | 1 | | 插秧后 3～7 天,拌细土 10～15 kg 撒施 | 糙米 0.05 |
| 百草枯<br>paraquat | 克芜踪<br>Gramoxne | 20%水剂 | 柑桔 | 杂草 | 200～300 mL(40～60 g) | 喷雾 | 3 | | 杂草旺期低压喷雾,避免喷到树上 | 全果 1 |
| 哒草特<br>pyridate | 连达克兰<br>Lentagram | 45%乳油 | 花生 | 阔叶杂草 | 130～200 mL(58.5～90 g) | 喷雾 | 1 | | 花生、小麦 4 叶期,杂草 2～4 叶期对水 50 升喷施 | 花生仁 0.5 |
| | | 45%可湿性粉剂 | 小麦 | | 130～200 g(58.5～90 g) | | | | | 籽粒 0.5 |
| 喹禾灵<br>quizalofopethyl | 禾草克<br>NC-302 | 10%乳油 | 棉花 | 一年生禾本科杂草 | 50～80 mL(5～8 g) | 喷雾 | 1 | | 棉花 4 叶期,杂草 3～5 叶期喷施 | 棉籽 0.2 |
| | | | 大豆 | | 60～100 mL(6～10 g) | | | | 大豆 1～4 叶期,杂草 3～5 叶期,喷施 | 籽粒 0.2 |
| | | | 甜菜 | | 80～100 mL(8～10 g) | | | | 甜菜 4～5 叶期,杂草 3～5 叶期,喷施 | 0.2 |

表 3(完)

| 农药 | | | 适用作物 | 主要防治对象 | 每 667 $m^2$ 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度) | 施药方法 | 每季作物最多使用次数 | 最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d | 实施要点说明 | 最高残留限量(MRL)值 mg/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用名 | 商品名 | 剂型及含量 | | | | | | | | |
| 烯禾定<br>sethoxydim | 拿捕净<br>Nabu | 20%乳油 | 甜菜 | 一年生禾本科杂草 | 100 mL(20 g) | 喷雾 | 1 | | 作物苗期，杂草 3～5 叶期喷施 | 0.5 |
| 灭草敌<br>vernolate | 卫农<br>Vernam | 88.5%乳油 | 大豆 | 一年生禾本科杂草 | 170～225 mL(150.45～199.13 g) | 土壤处理 | 1 | | 播前土壤喷雾，耙土 5～7 cm | 籽粒 0.1 |
| 净哌磷混剂<br>dimethametryn＋piperophos | 威罗生<br>Avirosan | 50%乳油 | 水稻 | 一年生杂草 | 160～200 mL(80～100 g) | 撒施 | 1 | | 插秧后 15 天内拌细沙土撒施 | 糙米：二甲丙乙净 0.05<br>哌草磷 0.05 |
| 禾草特<br>molinate<br>西草净<br>simetryn<br>二甲四氯<br>MCPB | 禾田净<br>Ordram-SM | 78.4%乳油 | 水稻 | 一年生杂草 | 200～255 mL(156.8～199.92 g) | 撒施 | 1 | | 插秧苗后 15～18 天内拌细沙 10 kg 撒施 | 糙米：禾草特 0.1<br>西草净 0.02 |

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
**农药合理使用准则(三)**
GB/T 8321.3—2000
*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
http://www.bzcbs.com
电话:63787337、63787447
2002年4月第一版 2004年11月电子版制作
*
书号:155066·1-18325

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

GB/T 8321.3-2000