ICS 65.100
B 17

中华人民共和国国家标准

GB/T 8321.9—2009

农药合理使用准则(九)

Guideline for safety application of pesticides(Ⅸ)

2009-10-30 发布　　2009-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　言

GB/T 8321《农药合理使用准则》由下列几部分组成：

——GB/T 8321.1—2000　农药合理使用准则(一)；

——GB/T 8321.2—2000　农药合理使用准则(二)；

——GB/T 8321.3—2000　农药合理使用准则(三)；

——GB/T 8321.4—2006　农药合理使用准则(四)；

——GB/T 8321.5—2006　农药合理使用准则(五)；

——GB/T 8321.6—2000　农药合理使用准则(六)；

——GB/T 8321.7—2002　农药合理使用准则(七)；

——GB/T 8321.8—2007　农药合理使用准则(八)；

——GB/T 8321.9—2009　农药合理使用准则(九)。

本部分为GB/T 8321的第9部分。

本部分由中华人民共和国农业部提出并归口。

本部分起草单位：农业部农药检定所。

本部分主要起草人：秦冬梅、刘光学、龚勇、何艺兵、季颖、朱光艳、郑尊涛。

农药合理使用准则(九)

1 范围

GB/T 8321 的本部分规定了 56 种农药在 23 种作物上 69 项合理使用准则。

本部分适用于农作物病、虫、草害的防治。

2 项目和技术指标

项目和技术指标见表 1、表 2、表 3。

表 1　杀虫剂、杀螨剂

农药		适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
通用名	剂型及含量								
啶虫脒 acetamiprid	20%可溶性粉剂	黄瓜	蚜虫	12 g～24 g	喷雾	3	1	—	5
	3%乳油	烟草	蚜虫	30 mL～40 mL			15		5
丁硫克百威 carbosulfan	5%颗粒剂	甘蔗	蔗龟	3 000 g～5 000 g	沟施	1	192	—	0.05
			蔗螟	3 000 g～4 000 g					
毒死蜱 chlorpyrifos	48%乳油	小麦	蚜虫	15 mL～25 mL	喷雾	2	14	—	0.1（籽粒）
甲基毒死蜱 chlorpyrifos-methyl	40%乳油	棉花	棉铃虫	100 mL～175 mL	喷雾	3	30	—	0.02（棉籽）
		甘蓝	菜青虫	60 mL～80 mL	喷雾	3	7	—	0.1
氯氰菊酯 cypermethrin	5%乳油	荔枝	荔枝蝽蠓	1 000 倍液～2 000 倍液（25 mg/L～50 mg/L）	喷雾	2	14	—	0.5
溴氰菊酯 deltamethrin	25%水分散片剂	甘蓝	菜青虫	3 g～4 g	喷雾	2	3	—	0.5
	2.5%乳油	油菜	蚜虫	10 mL～20 mL	喷雾	2	5	—	0.1（籽粒）
		花生	蚜虫	20 mL～25 mL			14	—	0.01
			棉铃虫	25 mL～30 mL					
氟虫腈 fipronil	25%悬浮种衣剂	水稻	稻瘿蚊、稻纵卷叶螟、稻蓟马	320 g/100 kg 种子～640 g/100 kg 种子	拌种	—	—	—	0.04（糙米）

表 1（续）

农药		适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
通用名	剂型及含量								
吡虫啉 imidacloprid	5%乳油	节瓜	蓟马	1 111 倍液～1 389 倍液 （36 mg/L～45 mg/L）	喷雾	3	3	—	1
	60%悬浮剂 种衣剂	棉花	棉蚜	350 g/100 kg 种子～500 g/100 kg 种子	拌种	1	—	—	1（棉籽）
	70%湿拌种剂	棉花	棉蚜	350 g/100 kg 种子～500 g/100 kg 种子					1
	20%浓可溶性液剂	番茄（保护地）	白粉虱	15 mL～20 mL	喷雾	2	7	—	0.1
杀虫单 monosultap	80%可溶性粉剂	水稻	二化螟	56.3 g～67.5 g	喷雾	2	30	—	0.2（糙米）
			稻纵卷叶螟	35 g～50 g					
甲基嘧啶磷 pirimiphos-methyl	50%乳油	稻谷原粮	玉米螟	5 mg/L～10 mg/L	喷雾	1	90	—	2（糙米）
炔螨特＋唑螨酯 propargite＋ fenpyroximate	13%水乳剂 （炔螨特 10%＋唑螨酯 3%）	柑橘	红蜘蛛	1 000 倍液～1 450 倍液 （86.7 mg/L～130 mg/L）	喷雾	2	14	—	炔螨特 5（全果） 唑螨酯 2（果肉）

表 2　杀菌剂和杀线虫剂

农药		适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
通用名	剂型及含量								
克菌丹 captan	80%可湿性粉剂	苹果	轮纹病	600 倍液～800 倍液（1 000 mg/L～1 333 mg/L）	喷雾	6	15	—	15
百菌清 chlorothalonil	40%悬浮剂	番茄	早疫病	150 mL～175 mL	喷雾	3	3	—	1
苯醚甲环唑 difenoconazole	10%水分散粒剂	梨	黑星病	6 000 倍液～7 000 倍液（14.3 mg/L～16.7 mg/L）	喷雾	3	14	—	0.2
咯菌腈 fludioxonil	2.5%悬浮种衣剂	棉花	立枯病	600 g/100 kg 种子～800 g/100 kg 种子	拌种	1	—	—	0.1（棉籽）
己唑醇 hexaconazole	5%悬浮剂	水稻	纹枯病	80 mL～100 mL	喷雾	2	45	—	0.1（糙米）
亚胺唑 imibenconazole	5%可湿性粉剂	柑橘	疮痂病	600 倍液～900 倍液（55 mg/L～83 mg/L）	喷雾	2	14	—	1
异菌脲 iprodione	50%悬浮剂	番茄	灰霉病、早疫病	50 g～100 g	喷雾	3	7	—	5
		苹果	斑点落叶病	1 000 倍液～2 000 倍液（250 mg/L～500 mg/L）			14	—	5
春雷霉素 kasugamycin	2%水剂	蕃茄	叶霉病	140 mL～175 mL	喷雾	3	4	—	0.05

表 2（续）

农药		适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
通用名	剂型及含量								
代森锰锌 mancozeb	80%可湿性粉剂	荔枝	霜疫霉病	400 倍液～600 倍液（1 333 mg/L～2 000 mg/L）	喷雾	3	10	—	二硫化碳：2 乙撑硫脲：0.05
		烟草	赤星病	117 g～140 g	喷雾	2	21	—	二硫化碳：25 乙撑硫脲：1
		马铃薯	晚疫病	83 g～125 g	喷雾	3	3	—	二硫化碳：0.2 乙撑硫脲：0.05
		花生	叶斑病	50 g～67 g	喷雾	3	7	—	二硫化碳：0.1 乙撑硫脲：0.05
溴甲烷 methyl bromide	98%熏蒸剂	草莓	线虫	51 g/m^2～82 g/m^2	熏蒸	1	120	土壤熏蒸	30
腈菌唑 myclobutanil	40%可湿性粉剂	梨	黑星病	8 000 倍液～10 000 倍液（40 mg/L～50 mg/L）	喷雾	3	7	—	0.5
咪鲜胺 prochloraz	25%乳油	贮藏柑橘	炭疽病、蒂腐病、绿霉病、青霉病	500 倍液～1 000 倍液（250 mg/L～500 mg/L）	浸果	1	14	贮藏防腐	5（柑橘） 0.5（柑汁）
		贮藏芒果	炭疽病	250 倍液～1 000 倍液（250 mg/L～1 000 mg/L）	浸果或喷雾	1	20	—	2
	45%乳油	水稻	恶菌病	2 600 倍液～7 200 倍液（62.5 mg/L～173 mg/L）	浸种	—	—	浸种（南方 3 d，北方 5 d）	0.5（糙米）

表 2（续）

农药		适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
通用名	剂型及含量								
咪鲜胺锰盐 prochloraz-manganese chloride	50%可湿性粉剂	贮藏芒果	炭疽病	500 倍液～2 000 倍液（250 mg/L～1 000 mg/L）	浸果或喷雾	1	10	—	2
		贮藏柑橘	炭疽病	1 000 倍液～2 000 倍液（250 mg/L～500 mg/L）	浸果	1	15	浸果 1 min	5
		黄瓜	炭疽病	37.5 g～75 g	喷雾	2	7	—	2
丙森锌 propineb	70%可湿性粉剂	黄瓜	霜霉病	150 g～214 g	喷雾	3	5	—	2
		番茄	早疫病、晚疫病、霜霉病	125 g～214 g	喷雾	3	7	—	2
嘧霉胺 pyrimethanil	40%悬浮剂	黄瓜	灰霉病	62.5 g～93.8 g	喷雾	2	3	—	2
烯肟菌酯	25%乳油	黄瓜	霜霉病	26.7 mL～53.3 mL	喷雾	3	3	—	1
噻菌灵 thiabendazole	40%可湿性粉剂	贮藏香蕉	贮藏病害	500 倍液～1 000 倍液（400 mg/L～800 mg/L）	浸果 1 min	1	14	—	5
噁唑菌酮＋代森锰锌 famoxadone＋mancozeb	68.75%水分散粒剂 ①6.25% ②62.5%	苹果	斑点落叶病、轮斑病	1 000 倍液～1 500 倍液（458.3 g/L～687.5 g/L）	喷雾	3	7	—	噁唑菌酮：2
噁唑菌酮＋霜脲氰 famoxadone＋cymoxanil	52.5%水分散粒剂（噁唑菌酮 22.5%＋霜脲氰 30%）	黄瓜	霜霉病	23.33 g～35 g	喷雾	3	3	—	噁唑菌酮：0.3 霜脲氰：0.3

表 3　除草剂和植物生长调节剂

农　药		适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
通用名	剂型及含量								
莠灭净 ametryn	80%可湿性粉剂	菠萝	一年生单、双子叶杂草	120 g～150 g	喷雾	1	—	覆土后（或新移植苗地）杂草萌发前施药	0.2
四唑嘧磺隆 azimsulfuron	50%水分散粒剂	水稻	阔叶杂草和莎草	1.33 g～2.67 g	毒土撒施	1	—	用毒砂土法于水稻移栽后 7 d～12 d 撒施于水稻田中	0.1（糙米）
双丙氨膦 bialaphos-sodium	20%可溶性粉剂	柑橘	一年生和多年生禾本科杂草及阔叶杂草	333.3 g～666.7 g	喷雾	2	21	柑橘地杂草生长期施药	0.1
烯草酮 clethodim	12%乳油	油菜	一年生禾本科杂草	30 mL～40 mL	喷雾	1	—	于禾本科杂草 2 叶～4 叶期施药	0.5（籽粒）
精噁唑禾草灵 fenoxaprop-P-ethyl	6.9%水乳剂	花生	一年生禾本科杂草	43 mL～60 mL	喷雾	1	—	于禾本科杂草 2 叶～4 叶期喷雾	0.05
		棉花	一年生禾本科杂草	50 mL～60 mL	喷雾	1	—	棉花出苗后禾本科杂草 2 叶～4 叶期喷雾	0.05（棉籽）
	8.05%乳油	花生	一年生禾本科杂草	35 mL～52 mL	喷雾	1	—	于禾本科杂草 2 叶～4 叶期施药	0.05
草甘膦异丙胺盐 glyphosate-isopropyl ammonium	41%水剂	茶叶	一年生、多年生杂草	150 mL～400 mL	喷雾	2	3	杂草生长盛期施药	0.1
	74.7%水溶性粒剂	柑橘	一年生、多年生杂草	100 g～150 g	喷雾	2	35	于春、夏季杂草生长盛期各施药 1 次	0.1

表 3（续）

农药		适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
通用名	剂型及含量								
甲咪唑烟酸 imazapic	24%水剂	花生	一年生禾本科杂草、阔叶杂草及莎草	20 mL～30 mL	喷雾	1	—	于花生 1.5 复叶期施药，茎叶施药	0.1
抑芽丹 maleic hydrazide	18%水剂	烟草	抑制腋芽的生长	1 mL/株	喷雾	1	30	于烟株现蕾初花期，打掉顶芽后 24 h内将药液兑水 25 倍～30 倍喷于烟株上部 1/3～1/2 处	100
二甲戊灵 pendimethalin	33%乳油	甘蓝	杂草	100 mL～150 mL	喷雾	1	—	于甘蓝移栽前土壤喷雾	0.2
吡草醚 pyraflufen-ethyl	2%悬浮剂	小麦	猪殃殃为主的阔叶杂草	30 mL～40 mL	喷雾	1	—	—	0.1（籽粒）
精喹禾灵 quizalofop-P-ethyl	5%乳油	芝麻	一年生禾本科杂草	50 mL～60 mL	喷雾	1	—	禾本科杂草 3 叶～6 叶期	0.2
喹禾糠酯 quizalofop-P-tefuryl	4%乳油	油菜	一年生禾本科杂草	60 mL～80 mL	喷雾	1	—	油菜 5 叶～6 叶期施药，茎叶喷雾	0.4
二氯喹啉酸 quinclorac	25%悬浮剂	水稻	稗草	53.3 mL～100 mL	喷雾	1	—	水稻移栽后 7 d～10 d 施药	0.5（糙米）
噻苯隆 thidiazuron	50%可湿性粉剂	棉花	棉花脱叶	20 g～40 g	喷雾	1	—	于棉桃开裂 70%时施药	0.4（棉籽）
氟乐灵 trifluralin	48%乳油	棉花	一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草	100 mL～150 mL	喷雾	1	—	播种前，一次喷施于土表，耙匀	0.05（棉籽）

表 3（续）

农药		适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
通用名	剂型及含量								
苯哒嗪丙酯	10%乳油	冬小麦	诱导小麦雄性不育的作用	500 mL～666.7 mL	喷雾	1	—	小麦雌雄蕊分化期施药	0.05
双氟磺草胺＋2,4-滴异辛酯 florasulam＋2,4-D ethylhexyl	45.9%悬浮剂 ①0.6% ②45.3%	小麦	阔叶杂草	30 mL～40 mL	喷雾	1	—	小麦苗期施药	① 0.01 ② 0.1
双氟磺草胺＋唑嘧磺草胺 florasulam＋flumetsulam	17.5%悬浮剂（双氟磺草胺 7.5%＋唑嘧磺草胺 10%）	小麦	阔叶杂草	3 mL～4.5 mL	喷雾	1	—	小麦苗期施药	① 0.01 ② 0.1