ICS 65.100
B 17

中华人民共和国国家标准

GB/T 8321.2—2000

农药合理使用准则(二)

Guideline for safety application of pesticides (Ⅱ)

2000-06-13 发布　　2000-10-01 实施

国家质量技术监督局 发布

前　　言

为指导科学、合理、安全使用农药，有效防治农作物病、虫、草害，防止农产品中农药残留量超过规定的限量标准，保护环境，保障人体健康而制定本标准。

本标准对《农药合理使用准则》(二)(GB 8321.2—1987)进行修订，参照《农药合理使用准则》(五)(GB/T 8321.5—1997)编写格式，依照我国和FAO/WHO规定的MRL值，按照1999年度《农药登记公告》中的施药量、施药方法等而修订。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由中华人民共和国农业部归口。

本标准由农业部农药检定所等三十四个单位起草。

本标准主要起草人：李本昌、高晓辉。

本标准委托农业部农药检定所负责解释。

中华人民共和国国家标准

农药合理使用准则(二)

GB/T 8321.2—2000

Guideline for safety application of pesticides (Ⅱ)

1 范围

本标准规定了35种农药在14种农作物上51项合理使用准则。

本标准适用于农作物病、虫、草害的防治。

2 项目和技术指标

项目和技术指标见表1、表2、表3。

3 实施说明

3.1 防治农作物病虫草害时,应切实贯彻执行“预防为主,综合防治”的方针,积极采用各种有效的非化学防治手段;使用化学农药时,各地要因地制宜,灵活掌握,但不得超过本标准规定的施药量(浓度)和最多使用次数;提倡不同类型的农药交替使用。

3.2 各地有关部门要做好宣传和教育工作,普及科学、合理、安全使用农药的科技知识,提高施药人员的素质。

3.3 使用农药时要做好防护,施药后要及时彻底清洗,并注意防止污染水源和环境。

国家质量技术监督局2000-06-13批准 2000-10-01实施

表 1　杀虫剂/杀螨剂

农药			适用作物	主要防治对象	每667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
顺式氯氰菊酯 alphacypermethrin	百事达 Bestox	5%乳油	茶树	茶尺蠖、叶蝉等	4 000～5 000 倍液（8.3～12.5 mg/L）	喷雾	1	7		20
	高效火百可 Springtac	10%乳油	柑桔	潜叶蛾、红腊蚧等	10 000～20 000 倍液（5～10 mg/L）	喷雾	3	7		全果 2
			棉花	蚜虫、棉铃虫、红铃虫	6.7～13.3 mL（0.67～1.33 g）		3	7		棉籽 0.2
双甲脒 amitraz	螨克 Mitac	20%乳油	棉花	红蜘蛛	20～40 mL(4～8 g)	喷雾	2	7		棉籽 0.5
联苯菊酯 biphenthrin	天王星 Talstar	10%乳油	茶树	茶尺蠖、茶毛虫、茶小绿叶蝉、黑刺粉虱、象甲虫	4 000～6 000 倍液（16.7～25 mg/L）	喷雾	1	7	防象甲虫用高剂量	5
仲丁威 BPMC	巴沙 Bassa	50%乳油	水稻	稻飞虱、叶蝉、蓟马等	80～160 mL(40～80 g)	喷雾	3	21		糙米 0.3
溴螨酯 bromopropylate	螨代治 Neoron	50%乳油	柑桔	螨类	1 500～3 000 倍液（166.7～333.3 mg/L）	喷雾	3	14		果肉 0.25 全果 5
毒死蜱 chlorpyrifos	乐斯本 Lorsban	48%乳油	叶菜	菜青虫、蚜虫等	50～75 mL(24～36 g)	喷雾	3	7		1

表 1(续)

农药			适用作物	主要防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
氯氰菊酯 cypermethrin	安绿宝 Arrivo 兴棉宝 Cymbush 赛波凯 Cyperkill 灭百可 Ripcord	10%乳油	柑桔	潜叶蛾、蚜虫等	2 000～4 000 倍液(25～50 mg/L)	喷雾	3	7		全果 2
			棉花	棉蚜、棉铃虫、红铃虫等	30～40 mL(3～4 g)		3	7	安绿宝为 50～80 mL	棉籽 0.2
			桃	桃蛀螟	2 000～4 000 倍液(25～50 mg/L)		3	7		2
			茶树	茶尺蠖、茶毛虫、小绿叶蝉等	2 000～3 700 倍液(27～50 mg/L)		1	7		20
二嗪磷 diazinon	二嗪农 地亚农 Diazinon	50%乳油	棉花	棉蚜、红蜘蛛等	100～140 mL(50～70 g)	喷雾	3	41		棉籽 0.1
			小麦	地下害虫	2～4 mL/kg 种子[0.1%～0.2%(种子质量)]	拌种			播前拌种	籽粒 0.1
杀螟硫磷 fenitrothion	杀螟松 速火松 Sumithion	50%乳油	水稻	稻螟、稻纵卷叶螟等	50～100 mL(25～50 g)	喷雾	3	21		糙米 0.4
氰戊菊酯 fenvalerate	速火杀丁 Sumicidin	20%乳油	柑桔	潜叶蛾、介壳虫等	8 000～12 500 倍液(16～25 mg/L)	喷雾	3	7		全果 2
异丙威 isoprocarb	叶蝉散 灭扑散 Mipcin	2%粉剂	水稻	稻飞虱、叶蝉等	1 500～3 000 g(30～60 g)	喷粉	3	14		糙米 0.2
稻丰散 phenthoate	爱乐散 Elsan	50%乳油	水稻	稻螟、稻飞虱、叶蝉、负泥虫等	66～132 mL(33～66 g)	喷雾	3	7		糙米 0.5

表 1(完)

农药			适用作物	主要防治对象	每667 m² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
伏杀硫磷 phosalone	佐罗纳 Zolone	35%乳油	叶菜	蚜虫、菜青虫、小菜蛾等	131～189 mL(45.85～66.15 g)	喷雾	2	7		1
快螨特 propargite	克螨特 Comite	73%乳油	柑桔	螨类	2 000～3 000 倍液(243～365 mg/L)	喷雾	3	30		3
			棉花	红蜘蛛	41～68.5 mL(30～50 g)		3	21		棉籽 0.1
杀虫环 thiocycla mhydrog enoxalate	易卫杀 Evisect S	5%可溶性粉剂	水稻	稻螟、稻纵卷叶螟、稻苞虫等	50～100 g(2.5～5 g)	喷雾	3	15		糙米 0.1
硫双火多威 thiodicarb	拉维因 Larvin	75%可湿性粉剂	棉花	棉铃虫	30～45 g(22.5～33.75 g)	喷雾	3	14	37.5%悬浮剂为 60～90 mL/667 m²	棉籽 0.5
灭幼脲	灭幼脲三号	25%悬浮剂	小麦	粘虫等	40 mL(10 g)	喷雾	2	15		籽粒 3

表 2　杀菌剂

农药			适用作物	主要防治对象	每667 m² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
百菌清 chlorothalonil	百菌清 Daconil	75%可湿性粉剂	花生	叶斑病、锈病等	111～133 g(83.25～99.75 g)	喷雾	3	14		花生仁 0.1
	达科宁 Docotech		番茄	早疫病等	145～270 g(108.75～208.25 g)		3	7		1
敌瘟磷 edifenfos	克瘟散 Hinosan	40%乳油	水稻	稻瘟病	75～100 mL(30～40 g)	喷雾	3	21		糙米 0.1

表 2(完)

农药			适用作物	主要防治对象	每667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
异菌脲 iprodione	扑海因 Rovral	50%可湿性粉剂	苹果	轮斑病、褐斑病等	1 000～1 500 倍液 (333～500 mg/L)	喷雾	3	7		10
春雷霉素 kasugamycin	加收米 Kasumin	2%液剂	水稻	稻瘟病	80～100 mL(1.6～2 g)	喷雾	3	21		糙米 0.04
丙环唑 propiconazole	敌力脱 Tilt	25%乳油	小麦	锈病、白粉病、根腐病等	33.2 mL(8.3 g)	喷雾	2	28		籽粒 0.1
甲霜灵锰锌 1)甲霜灵 metalaxyl+ 2)代森锰锌 mancozeb	瑞毒霉锰锌 Ridornil-MZ	58%可湿性粉剂	黄瓜	霜霉病	77.6～121 g(45～70.2 g)	喷雾	3	1		甲霜灵 0.5

表 3　除草剂

农药			适用作物	主要防治对象	每667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
三氟羧草醚 acifluorfen sodinm	杂草焚 Blazer	21.4%水溶液	大豆	阔叶杂草	112～150 mL(24～32.1 g)	喷雾	1		大豆1～3片复叶,阔叶杂草出齐,5～10 cm 高时施	籽粒 0.1

表 3(续)

农药			适用作物	主要防治对象	每667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
甲草胺 alachlor	拉索 Lasso	48%乳油	玉米	一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草	200～400 mL(96～192 g)	土壤喷雾	1		播后芽前施药,避免在沙性土壤和地下水位高及有机质含量高的地块使用	糙米 0.2
灭草松 benthiocarb	排草丹 苯达松 Basagran	48%液剂	大豆	阔叶杂草	104～208 mL(50～100 g)	喷雾	1		大豆2～3片复叶时施	籽粒 0.05
禾草丹 benthiocarb	杀草丹 Saturn	50%乳油	水稻	稗草、二梭草、鸭舌草、牛毛毡等一年生杂草	266～400 mL(133～200 g)	喷雾或毒土	2		播前或插秧后5～7天施	糙米 0.2
氰草津 cyanazine	百得斯 Bladex	80%可湿性粉剂	玉米	一年生杂草	83～250 g(66.4～200 g)	喷雾	1		播后至玉米4叶期前施	籽粒 0.05 青饲料 0.2
		48%液剂			200～300 mL(96～144 g)					
		43%悬浮剂			280～363 mL(120.4～154.8 g)					
禾草灵 diclofopmethyl	伊洛克桑 Illoxan	36%乳油	甜菜	野燕麦、稗草、马唐等杂草	130～185 mL(46.8～66.6 g)	喷雾	1		杂草2～4叶期施	0.1
			小麦						野燕麦3～5叶期施	籽粒 0.1
燕麦枯 difenzoquat	野燕枯 Avange	64%可溶性粉剂	小麦(大麦)	野燕麦等杂草	78～125 g(50～80 g)	喷雾	1		杂草3～5叶期施	籽粒 0.05
吡氟禾草灵 fluazifopbutyl	稳杀得 Onecide	35%乳油	棉花	一年生禾本科杂草	50～100 mL(17.5～35 g)	喷雾	1		杂草3～5叶期施	棉籽 0.1
			花生							花生仁 0.1
			大豆							大豆籽粒 0.1

表 3(完)

农药			适用作物	主要防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
禾草敌 molinate	禾大壮 Ordram	90.9%乳油	水稻	稗草、牛毛草等	146～220 mL(133.3～200 g)	喷雾或毒土	2		施药时避开雨天，施药后避免灌水	籽粒 0.1
恶草酮 oxadiazon	农思它 Ronstar	25%乳油	水稻	一年生杂草	100～132 mL(25～33 g)	喷雾或毒土	1		播前或插秧后 2～3 天施，北方旱直播田用 25%乳油以每 667 m^2 165～232 mL 南方插秧田以每 667 m^2 65～100mL 施	糙米 0.05 稻草 0.2
		12%乳油			200～270 mL(24～32.4 g)	瓶洒				
烯禾定 sethoxydim	拿捕净 Nabu	12.5%机油乳油	花生	一年生禾本科杂草	66～100 mL(8.25～12.5 g)	喷雾	1		杂草 3～5 叶期施	花生仁 2
			大豆							籽粒 2
野麦畏 triallate	可畏达 Avadex	40%乳油	小麦	野燕麦	150～200 mL(60～80 g)	土壤处理	1		春小麦播前 5～7 天施	籽粒 0.05
氟乐灵 trifluralin	特福力 Treflan 氟特力 Flutrix	48%乳油	玉米	一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草	75～100 mL(36～48 g)	土壤处理	1		播前施，施后耙匀	籽粒 0.05
			大豆		125～175 mL(60～84 g)					籽粒 0.01

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
农药合理使用准则(二)
GB/T 8321.2—2000
*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
http://www.bzcbs.com
电话:63787337、63787447
2002年4月第一版 2004年11月电子版制作
*
书号:155066·1-18324

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

GB/T 8321.2-2000