ICS 65.100
B 17

中华人民共和国国家标准

GB/T 8321.5—2006
代替 GB/T 8321.5—1997

农药合理使用准则(五)

Guideline for safety application of pesticides(V)

2006-06-02 发布　　2006-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　言

为指导使用者合理、安全使用农药，有效防治农作物病、虫、草害，确保农产中农药残留量不超过规定的限量标准，保护环境，保障人体健康而制定本标准。

GB/T 8321《农药合理使用准则》分为以下几部分：

——GB/T 8321.1　农药合理使用准则(一)；

——GB/T 8321.2　农药合理使用准则(二)；

——GB/T 8321.3　农药合理使用准则(三)；

——GB/T 8321.4　农药合理使用准则(四)；

——GB/T 8321.5　农药合理使用准则(五)；

——GB/T 8321.6　农药合理使用准则(六)；

——GB/T 8321.7　农药合理使用准则(七)；

……

本部分为 GB/T 8321 的第 5 部分。

本部分代替 GB/T 8321.5—1997《农药合理使用准则(五)》。

本部分以 GB/T 8321.5—1997 为基础，依照 GB 4839—1998《农药通用名称》，按照 2003 年《农药登记公告》中的施药量、施药方法等修订，其编制格式与 GB/T 8321.7—2002 一致。

本部分由中华人民共和国农业部提出并归口。

本部分由农业部农药检定所负责起草。

本部分委托农业部农药检定所负责解释。

本部分主要起草人：刘光学、秦冬梅、龚勇、何艺兵、陶传江、朱光艳、李友顺、宋稳成。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 8321.5—1997。

农药合理使用准则(五)

1 范围

本部分规定了43种农药在14种农作物及蘑菇上的61项合理使用准则。

本部分适用于农作物病、虫、草害的防治。

2 项目和技术指标

项目和技术指标见表1、表2、表3。

表1 杀虫剂、杀螨剂

农药			适用作物	防治对象	每667 m^2每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参考值/(mg/kg)
通用名	商品名[a]	剂型及含量								
阿维菌素 abamectin	害极灭 Agrimec 爱福丁	1.8%乳油	棉花	红蜘蛛	30 mL～40 mL	喷雾	2	21	—	棉籽 0.01
			叶菜	小菜蛾	33 mL ～50 mL		1	7		0.05
双甲脒 amitraz	螨克 Mitac	20%乳油	苹果	红蜘蛛	1 000倍液～1 500倍液(133 mg/L～200 mg/L)	喷雾	3	20	—	全果 0.5
三唑锡 azocyclotin	倍乐霸 Peropal	25% 可湿性粉剂	柑橘	红蜘蛛	1 500倍液～2 000倍液(125 mg/L～166.7 mg/L)	喷雾	2	30	—	全果 2
	三唑锡	20%悬浮剂			1 000倍液～2 000倍液(100 mg/L～200 mg/L)					
苯螨特 benzoximate	西斗星 Citrastar	10%乳油	柑橘	红蜘蛛	1 500倍液～2 000倍液(50 mg/L～66.7 mg/L)	喷雾	2	21	—	全果 5
噻嗪酮 buprofezin	优乐得 Applaud (扑虱灵、稻虱净)	25% 可湿性粉剂	柑橘	矢尖蚧	1 000倍液～2000倍液(125 mg/L～250 mg/L)	喷雾	2	35	—	全果 0.3

表 1（续）

农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参考值/(mg/kg)
通用名	商品名[a]	剂型及含量								
克百威 carbofuran	大扶农 Diafuran	3%颗粒剂	甜菜	苗期害虫	1 500 g～2 000 g	沟施或条施	1	—	播种前沟施或条施	—
	呋喃丹 Furadan	35%种子处理剂		地下害虫	20 g/kg 种子～28 g/kg 种子	种子处理			播种时拌种	块根 0.1
	大扶农 Diafuran									
丁硫克百威 carbosulfan	好年冬 Marshal	20%乳油	水稻	稻飞虱、三化螟	200 mL～250 mL	喷雾	1	30	—	糙米 0.05
			柑橘	锈壁虱、潜叶蛾、蚜虫	1 000 倍液～2 000 倍液（100 mg/L～200 mg/L）		2	15		全果 2
杀螟丹 cartap	巴丹 Padan	98%可溶性粉剂	柑橘	潜叶蛾	1 800 倍液～2 000 倍液（500 mg/L～550 mg/L）	喷雾	3	21	—	全果 1
四螨嗪 clofentezine	阿波罗 Apollo	50%悬浮剂	苹果	红蜘蛛	5 000 倍液～6 000 倍液（83 mg/L～100 mg/L）	喷雾	2	30	—	全果 0.5
氯氟氰菊酯 cyhalothrin	功夫 Kung Fu	2.5%乳油	苹果	桃小食心虫	4 000 倍液～5 000 倍液（5.0 mg/L～6.2 mg/L）	喷雾	2	21	—	全果 0.2
氟氯氰菊酯 cyfluthrin	百树得 Baythroid	5%乳油	棉花	棉铃虫、红铃虫	32 mL～50 mL	喷雾	2	21	—	棉籽 0.05
除虫脲 diflubenzuron	除虫脲	20%悬浮剂	茶叶	茶毛虫	2 500 倍液～3 200 倍液（63 mg/L～80 mg/L）	喷雾	1	7	—	20
				茶尺蠖	1 600 倍液～2 500 倍液（80 mg/L～125 mg/L）					

表 1（续）

农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参考值/(mg/kg)
通用名	商品名[a]	剂型及含量								
S-氰戊菊酯 esfenvalerate	来福灵 Sumi-alpha	5%乳油	小麦	麦蚜、粘虫	12 mL～15 mL	喷雾	2	21	—	籽粒 0.2
			烟草	烟青虫	10 mL～15 mL		2	10		10
			甜菜	甘蓝夜蛾	10 mL～20 mL		2	60		块根 0.05
醚菊酯 ethofenprox	多来宝 Trebon	4%油剂	水稻	稻象甲	200 mL～250 mL	喷雾或滴施	3	14	滴施时滴于稻田灌溉水中	糙米 0.5
苯硫威 fenothiocarb	排螨净 Panocon	35%乳油	柑橘	全爪螨	800 倍液～1 000 倍液（350 mg/L～438mg/L）	喷雾	2	7	—	橘肉 0.5
唑螨酯 fenproximate	霸螨灵 Danitron	5%悬浮剂	苹果	红蜘蛛	2 000 倍液～3 000 倍液（17 mg/L～25 mg/L）	喷雾	2	15	—	全果 1
				锈壁虱	1 000 倍液～2 000 倍液（25 mg/L～50 mg/L）					
			柑橘	红蜘蛛	1 000 倍液～2 000 倍液（25 mg/L～50 mg/L）	喷雾	2	15	—	全果 2
氟虫脲 flufenoxuron	卡死克 Cascade	5%乳油	苹果	红蜘蛛	667 倍液～1 000 倍液（50 mg/L～75 mg/L）	喷雾	2	30	—	全果 0.2
			柑橘	全爪螨、锈螨	667 倍液～1 000 倍液（50 mg/L～75 mg/L）					全果 0.3
				潜叶蛾	1 000 倍液～2 000 倍液（25 mg/L～50mg/L）					

表 1（续）

农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参考值/(mg/kg)
通用名	商品名[a]	剂型及含量								
噻螨酮 hexythiazox	尼索朗 Nissorun	5%乳油	棉花	红蜘蛛	50 mL～66 mL	喷雾	2	30	—	棉籽 0.5
氯唑磷 isazofos	米乐尔 Miral	3%颗粒剂	水稻	稻瘿蚊、稻飞虱、三化螟	1 000 g	撒施	3	28	拌毒土撒施	糙米 0.05
			甘蔗	蔗龟、蔗螟	2 000 g～3 000 g	沟施	1	60	—	0.05
灭多威 methomyl	万灵 Lannate	24% 水溶性剂	柑橘	柑橘蚜虫	1 000 倍液～2 000 倍液（120 mg/L～240 mg/L）	喷雾	3	15	吸入毒性高，预防中毒	全果 1
				潜叶蛾	800 倍液～1 200 倍液（200 mg/L～300 mg/L）					
		90% 可湿性粉剂	甘蓝	菜青虫	15 g～20 g		1	7		5
甲拌磷 phorate	三九一一	3%颗粒剂	甘蔗	蔗龟	5 000 g	沟施	1	210	高毒，注意安全	0.1
				蔗螟	5 000 g～6 667 g					
喹硫磷 quinalphos	爱卡士 Ekalux	25%乳油	棉花	蚜虫、棉铃虫	80 mL～100 mL	喷雾	3	25	—	棉籽 0.5
吡螨胺 tebufenpyrad	必螨立克 Pyranica MK-239	10% 可湿性粉剂	苹果	红蜘蛛	2 000 倍液～3 000 倍液（33 mg/L～50 mg/L）	喷雾	3	30	—	全果 1
			柑橘				2	14	—	
① 丙溴磷 profenofos＋② 氯氰菊酯 cypermethrin	多虫清 Polytrin	44%乳油	棉花	棉蚜	30 mL～60 mL	喷雾	3	40	—	棉籽中：丙溴磷 3 氯氰菊酯 0.2
				棉铃虫、红铃虫	66 mL～100 mL					

[a] 阿维菌素等的商品名是适合的市售产品的多个实例。给出这一信息是为了方便本标准的使用者，并不表示对这些商品的认可。

表 2　杀菌剂、杀线虫剂

农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参考值/(mg/kg)
通用名	商品名[a]	剂型及含量								
百菌清 chlorothalonil	百菌清 Danconil	45%烟剂	黄瓜	霜霉病	110 g～180 g	烟熏	4	3	适用于大棚和温室	1
氢氧化铜 coper hydroxide	可杀得 Kocide 101	77% 可湿性粉剂	番茄	早疫病	134 g～200 g	喷雾	3	3	—	20
			柑橘	溃疡病	400 倍液～600 倍液（1 283 mg/L～1 925 mg/L）		5	30		
硫线磷 sebufos	克线丹 Rugby	10%颗粒剂	柑橘	根结线虫	4 000 g～6 000 g	沟施	2	120	于树根周围根施（冬前冬后各一次）	0.005
噻菌灵 thiabendazole	特克多 Tecto	60% 可湿性粉剂	蘑菇	真菌病害	200 mg/kg～400mg/kg 木屑（木屑包栽培法）	拌施	1	65	制包前将药均匀拌于木屑中	2
					400 倍液～667 倍液（900 mg/L～1 500 mg/L）（段木剖面栽培法）	喷雾	3	55	菌丝生长期喷施于段木剖面上（施药间隔 30 天）	
乙烯菌核利 vinclozolin	农利灵 Ronilan	50% 可湿性粉剂	黄瓜	灰霉病	75 g～100 g	喷雾	2	4	—	5
① 甲霜灵 metalaxyl+ ② 代森锰锌 mancozeb	雷多米尔·锰锌 RidomilMZ	58% 可湿性粉剂 ① 10% ② 48%	葡萄	霜霉病	500 倍液～800 倍液（725 mL/L～1 160 mL/L）	喷雾	3	21	—	甲霜灵 1
① 辛硫磷 phoxim+ ② 甲拌磷 phorate	辛拌磷	10%粉粒剂 ① 6% ② 4%	柑橘	根结线虫	4 000 g～5 000 g	沟施	1	120	于柑橘树周围沟施	全果：辛硫磷 0.05 甲拌磷不得检出

表 2（续）

农药			适用作物	防治对象	每 667 m² 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参考值/(mg/kg)
通用名	商品名[a]	剂型及含量								
络氨铜·锌 ① 柠檬酸铜＋ ② 硫酸四氨络合铜＋ ③ 硫酸四氨络合锌	抗枯灵	25.9%水剂	西瓜	枯萎病	500 倍液～600 倍液（200 mL/株）	灌根	3	40	—	铜 20 锌 50
					100 mL	喷雾				

[a] 百菌清等的商品名是适合的市售产品的多个实例。给出这一信息是为了方便本标准的使用者，并不表示对这些商品的认可。

表 3 除草剂、植物生长调节剂

农药			适用作物	防治对象	每 667 m² 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参考值/(mg/kg)
通用名	商品名[a]	剂型及含量								
异噁草松 clomazone	广灭灵 Command	48%乳油	大豆	一年生禾本科杂草	140 mL～170 mL	喷雾	1	—	大豆播后芽前喷施	籽粒 0.05
氟吡甲禾灵 haloxyfop	盖草能 Gallant	12.5%乳油	油菜	一年生禾本科杂草	30 mL～50 mL	喷雾	1	—	苗期，杂草 3 叶～5 叶期，兑水 50 L 喷施	油菜籽 1
咪唑乙烟酸 imazethapyr	普杀特 Pursuit	5%水剂	大豆	一年生杂草	100 mL～134 mL	土壤处理	1	—	大豆苗前土壤喷雾。后茬避免种植对咪唑乙烟酸敏感作物（如甜菜、蔬菜、水稻等）	籽粒 0.1
异丙甲草胺 metolachlor	都尔 Dual	72%乳油	甘蔗	一年生杂草	100 mL～150 mL	喷雾	1	—	甘蔗苗前喷施	0.1

表 3（续）

农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参考值/(mg/kg)
通用名	商品名[a]	剂型及含量								
二甲戊乐灵 pendimethalin	除芽通 Accotab	33%乳油	烟草	抑制腋芽	100 倍液（3 300 mg/L）20 mL（倍液）/株～25 mL（倍液）/株	杯淋	1	10	—	5
吡嘧磺隆 pyrazosulfuron-ethyl	草克星 NC-311	10% 可湿性粉剂	水稻	阔叶杂草、莎草、稗草	10 g～20 g（移栽田） 10 g～17 g（直播田）	喷雾	1	—	移栽后 1 周喷施 直播水稻 1 叶～3 叶期喷施	糙米 0.1
二氯喹啉酸 quinclorac	快杀稗 Facet	50% 可湿性粉剂	水稻	稗草等	26 g～55 g	喷雾	1	—	水稻移栽后 5 天～20 天喷施	糙米 0.5
精喹禾灵 quizalofop-*p*-ethyl	精禾草克 NC-302D	5%乳油	棉花 花生 油菜 大豆	一年生禾本科杂草	50 mL～80 mL	喷雾	1	—	杂草 3 叶～6 叶期喷施	棉籽 0.2 花生仁 0.2 油菜籽 0.2 籽粒 0.2
烯禾啶 sethoxydim	拿扑净 Nabu	12.5% 乳油	棉花 油菜 甜菜	一年生禾本科杂草	66 mL～100 mL	喷雾	1	—	杂草 3 叶～5 叶期，作物苗期喷施	棉籽 5 油菜籽 1 块根 0.5
苯磺隆 tribenuron-methyl	巨星 Express	75% 可湿性粉剂 75%干悬剂	小麦	阔叶杂草	0.9 g～1.7 g	喷雾	1	—	小麦拔节期喷施	籽粒 0.05
① 甜菜安 desmedipham+ ② 甜菜宁 phenmedipham	甜安宁 Betanal AM11 凯米双 Kemifams	16%乳油 ① 8% ② 8%	甜菜	一年生阔叶杂草	330 mL～400 mL	喷雾	1	—	甜菜苗期，杂草 2 叶～4 叶期喷施	块根：甜菜安 0.1 甜菜宁 0.1

[a] 异噁草松等的商品名是适合的市售产品的多个实例。给出这一信息是为了方便本标准的使用者，并不表示对这些商品的认可。