ICS 65.100
B 17

中华人民共和国国家标准

GB/T 8321.8—2007

农药合理使用准则(八)

Guideline for safety application of pesticides(Ⅷ)

2007-10-16 发布　　2008-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　言

GB/T 8321《农药合理使用准则》分为以下几部分：

——GB/T 8321.1—2000　农药合理使用准则(一)；

——GB/T 8321.2—2000　农药合理使用准则(二)；

——GB/T 8321.3—2000　农药合理使用准则(三)；

——GB/T 8321.4—2006　农药合理使用准则(四)；

——GB/T 8321.5—2006　农药合理使用准则(五)；

——GB/T 8321.6—2000　农药合理使用准则(六)；

——GB/T 8321.7—2002　农药合理使用准则(七)；

——GB/T 8321.8—2007　农药合理使用准则(八)；

……

本部分为 GB/T 8321 的第 8 部分。

本部分由中华人民共和国农业部提出。

本部分由农业部农药检定所起草并负责解释。

本部分主要起草人：秦冬梅、刘光学、何艺兵、龚勇、朱光艳、李友顺、宋稳成、郑尊涛。

农药合理使用准则(八)

1 范围

GB/T 8321 的本部分规定了 37 种农药在 21 种作物上的 55 项合理使用准则。

本部分适用于农作物病、虫、草害的防治和植物生长调节剂的使用。

2 项目和技术指标

项目和技术指标见表 1、表 2、表 3。

表 1　杀虫剂、杀螨剂

农药		适用作物	防治对象	每公顷每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参照值/(mg/kg)
通用名	剂型及含量								
阿维菌素 abamectin	1.8%乳油	黄瓜	美洲斑潜蝇	900 mL～1 200 mL	喷雾	3	2	—	0.01
		豇豆	美洲斑潜蝇	900 mL～1 200 mL			5		0.01
		梨	梨木虱	3 000 倍液～6 000 倍液 (3 mg/L～6 mg/L)			14		0.02
氟丙菊酯 acrinathrin	2%乳油	茶叶	短须螨	2 000 倍液～4 000 倍液 (5 mg/L～10 mg/L)	喷雾	1	7	—	1
			小绿叶蝉	1 333 倍液～2 000 倍液 (10 mg/L～15 mg/L)					
丙硫克百威 benfuracarb	20%乳油	烟草	蚜虫	300 mL～450 mL	喷雾	3	14	—	3
高效氯氰菊酯 beta-cypermethrin	10%乳油	甘蓝	菜青虫	75 mL～150 mL	喷雾	3	3	—	1
		棉花	棉铃虫	525 mL～720 mL			7		棉籽 0.2
氯氟氰菊酯 cyhalothrin	2.5%乳油	荔枝	蝽象	2 000 倍液～4 000 倍液 (6.25 mg/L～12.5 mg/L)	喷雾	2	14	—	果肉 0.2
虫螨腈 chlorfenapyr	10%悬浮剂	甘蓝	小菜蛾	500 mL～750 mL	喷雾	2	14	—	0.5
除虫脲 diflubenzuron	25%可湿性粉剂	柑橘	潜叶蛾、锈壁虱	2 000 倍液～4 000 倍液 (62.5 mg/L～125 mg/L)	喷雾	3	28	—	1
		甘蓝	菜青虫	756 g～944 g			7		1
苄螨醚 halfenprox	5%乳油	柑橘	红蜘蛛	1 000 倍液～2 000 倍液 (25 mg/L～50 mg/L)	喷雾	2	21	—	0.5

表 1(续)

农药		适用作物	防治对象	每公顷每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参照值/(mg/kg)
通用名	剂型及含量								
吡虫啉 imidacloprid	20%浓可溶剂	甘蓝	菜蚜	75 mL～150 mL	喷雾	2	7	—	0.5
		烟草	蚜虫	150 mL～300 mL			10		10
		番茄	白粉虱	225 mL～450 mL			3		0.1
磷化镁 magnesium phosphide	56%片剂	烟草	烟草甲虫	2 片/30 m^3	熏蒸	1	7	—	0.1
灭多威 methomyl	90%可溶性粉剂	小麦	蚜虫	112.5 g～225 g	喷雾	2	14	—	0.5
烯虫酯 methoprene	4.1%可溶性液剂	仓储烟叶	烟草甲虫	4 100 倍液～5 467 倍液(7.5 mg/L～10 mg/L)	喷雾	1	40	烟草储存初期喷雾 1 次	5
多杀菌素 spinosad	48%乳油	棉花	棉铃虫	63 mL～84 mL	喷雾	3	14	—	棉籽 0.02
	2.5%悬浮剂	甘蓝	小菜蛾	500 mL～1 000 mL			3		1
毒死蜱＋氯氰菊酯 chlorpyrifos＋cypermethrin	52.25%乳油(毒死蜱 47.5%＋氯氰菊酯 4.75%)	荔枝	蒂蛀虫	1 000 倍液～2 000 倍液(260 mg/L～522 mg/L)	喷雾	2	14	—	果肉： 毒死蜱 0.2 氯氰菊酯 2

表 2　杀菌剂

农药		适用作物	防治对象	每公顷每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参照值/(mg/kg)
通用名	剂型及含量								
百菌清 chlorothalonil	40%胶悬剂	花生	花生叶斑病	1 125 mL～2 250 mL	喷雾	3	30	—	花生仁 0.1
氟苯唑 fenbuconazole	24%悬浮剂	桃树	桃树褐斑病	2 500 倍液～3 200 倍液 (75 mg/L～96 mg/L)	喷雾	3	14	—	2.0
氟硅唑 flusilazole	40%乳油	黄瓜	黄瓜黑星病	112.5 mL～187.5 mL	喷雾	2	3	—	0.2
双胍辛烷苯基磺酸盐 iminoctadine tris	40%可湿性粉剂	芦笋	芦笋茎枯病	800 倍液～1 000 倍液 (400 mg/L～500 mg/L)	喷雾	1	5	—	0.3
代森锰锌 mancozeb	75%干悬浮剂	西瓜	西瓜炭疽病	3 000 g～3 600 g	喷雾	3	21	—	代森锰锌 1 乙撑硫脲 0.05
	43%悬浮剂	香蕉	香蕉叶斑病	300 倍液～400 倍液 (1 050 mg/L～1 400 mg/L)			35		代森锰锌 1 乙撑硫脲 0.1
咪鲜胺 prochloraz	25%乳油	水稻	水稻恶苗病	2 000 倍液～4 000 倍液 (63 mg/L～125 mg/L)	浸种	1	—	浸种 48 h	糙米 0.5
	45%水乳剂	香蕉	香蕉冠腐病、炭疽病	900 倍液～1 800 倍液 (250 mg/L～500 mg/L)	浸果		7	浸果 1 min	5

表 2(续)

农药		适用作物	防治对象	每公顷每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参照值/(mg/kg)
通用名	剂型及含量								
戊唑醇 tebuconazole	25%水乳剂	香蕉	叶斑病	1 000 倍液～1 500 倍液 (167 mg/L～250 mg/L)	喷雾	3	42	—	蕉肉 0.2
萎锈灵＋福美双 carboxin＋thiram	40%胶悬剂 (萎锈灵 20%＋福美双 20%)	棉花	棉花立枯病	400 mL～500 mL (每 100 kg 种子)	拌种	—	—	—	棉籽： 萎锈灵 0.2 福美双 1
		水稻	水稻苗期病害						糙米： 萎锈灵 0.2 福美双 1
霜脲氰＋代森锰锌 cymoxanil＋ mancozeb	72%可湿性粉剂 (霜脲氰 8%＋代森锰锌 64%)	荔枝	荔枝霜(疫)霉病	500 倍液～700 倍液 (1 030 mg/L～1 440 mg/L)	喷雾	3	14	—	霜脲氰 1 代森锰锌 0.05
烯酰吗啉＋代森锰锌 dimethomorph＋ mancozeb	69%水分散粒剂 (烯酰吗啉 9%＋代森锰锌 60%)	荔枝	霜(疫)霉病	500 倍液～600 倍液 (1 150 mg/L～1 380 mg/L)	喷雾	3	14	—	烯酰吗啉 3 代森锰锌 0.05

表 3　除草剂、植物生长调节剂

农药		适用作物	防治对象	每公顷每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参照值/(mg/kg)
通用名	剂型及含量								
乙草胺 acetochlor	90%乳油	玉米	一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草	1 500 mL～1 800 mL(东北地区) 900 mL～1 500 mL(其他地区)	土壤喷雾	1	—	于玉米播种后出苗前，土壤喷施 1 次	籽粒 0.02
		油菜	一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草	600 mL～900 mL				移栽后土壤喷施	籽粒 0.2
酰嘧磺隆 amidosulfuron	50%水分散粒剂	小麦	阔叶杂草	45 g～60 g	喷雾	1	—	于小麦返青后、拔节前喷施	籽粒 0.05
双草醚 bispyribac sodium	10%悬浮剂	水稻	稗草、莎草及阔叶杂草	225 mL～300 mL(水稻直播田南方地区) 300 mL～375 mL(水稻直播田北方地区)	喷雾	1	—	于稗草 4～5 叶期，喷施 1 次	糙米 0.1
氯苯胺灵 chloropropham	2.5%粉剂	马铃薯	抑制马铃薯出芽	0.4 g/kg～0.6 g/kg(马铃薯)	撒施或喷粉	1	7	储藏期施用	50
	49.65%气雾液	马铃薯	抑制马铃薯出芽	60.4 mL/kg～80.6 mL/kg(马铃薯)	热喷雾		126		
异噁草酮 clomazone	48%乳油	甘蔗	一年生杂草	1 656 mL～2 094 mL	喷雾	1	—	芽前喷雾	0.05
	36%微囊悬浮剂	水稻	稗草、千金子等杂草	419 mL～525 mL	撒施毒土			水稻移栽后 5 d	糙米 0.01
氰氟草酯 cyhalofopbutyl	10%乳油	水稻	稗草、千金子等禾本科杂草	60 mL～900 mL	茎叶喷雾	1	—	在水稻直播田内，秧苗 2～3 叶期，喷施	糙米 0.1

表 3(续)

农药		适用作物	防治对象	每公顷每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参照值/(mg/kg)
通用名	剂型及含量								
噁唑禾草灵 fenoxaprop-p-ethyl	6.9%水乳剂	油菜	一年生禾本科杂草	600 mL～900 mL	喷雾	1	—	油菜 2～4 叶期,喷施	籽粒 0.05
	8.05%乳油			600 mL～750 mL					
氟节胺 flumetralin	25%乳油	烟草	抑制腋芽生长	350 倍液(714 mg/L)	杯淋或涂抹	1	10	烟草打顶后杯淋或涂抹	20
甲氧咪草烟 imazemox	4%水剂	大豆	一年生杂草	1 125 mL～1 250 mL	茎叶喷雾	1	—	于杂草 2～4 叶期,茎叶喷雾 1 次	籽粒 0.1
乳氟禾草灵 lactofen	24%乳油	花生	阔叶杂草	225 mL～450 mL	喷雾	1	—	在花生 1.5 片复叶期喷雾 1 次	花生仁 0.05
丙草胺 pretilachlor	50%乳油	水稻	一年生禾本科杂草、莎草及部分阔叶杂草	900 mL～1 050 mL	毒土撒施	1	—	水稻移栽后 5 d～10 d,毒土撒施 1 次	糙米 0.1
异丙草胺 propisochlor	72%乳油	大豆	一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草	1 500 mL～2 000 mL	土壤喷雾	1	—	播后苗前土壤喷雾 1 次	籽粒 0.1
		玉米	一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草	1 500 mL～2 000 mL					籽粒 0.1
砜嘧磺隆 rimsulfuron	25%干悬浮剂	玉米	一年生阔叶杂草	75 g～90 g	喷雾	1	—	玉米 1～4 叶期喷雾 1 次	籽粒 0.1