ICS 65.100
B 17

中华人民共和国国家标准

GB/T 8321.6—2000

农药合理使用准则(六)

Guideline for safety application of pesticides (Ⅵ)

2000-06-13 发布　　2000-10-01 实施

国家质量技术监督局 发布

前　言

为指导科学、合理、安全使用农药，有效防治农作物病、虫、草害，防止农产品中农药残留量超过规定的限量标准，保护环境，保障人体健康而制定本标准。

本标准根据1995～1998年农药残留试验结果，依照我国、联合国粮农组织(FAO)/世界卫生组织(WHO)及参照其他国家现有的农药最高残留限量标准(MRL)值而制定。本标准中的施药量(浓度)，施药方法按照《农药登记公告》确定。

本标准是继《农药合理使用准则》(一)(GB 8321.1—1987)，《农药合理使用准则》(二)(GB 8321.2—1987)，《农药合理使用准则》(三)(GB 8321.3—1989)，《农药合理使用准则》(四)(GB 8321.4—1993)，《农药合理使用准则》(五)(GB/T 8321.5—1997)之后研究制定的，其编制格式与《农药合理使用准则》(五)基本一致。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由中华人民共和国农业部归口。

本标准由农业部农药检定所等三十个单位起草。

本标准主要起草人：李本昌、高晓辉。

本标准委托农业部农药检定所负责解释。

中华人民共和国国家标准

农药合理使用准则(六)

GB/T 8321.6—2000

Guideline for safety application of pesticides (Ⅵ)

1 范围

本标准规定了39种农药在15种农作物上52项合理使用准则。

本标准适用于农作物病、虫、草害的防治。

2 项目和技术指标

项目和技术指标见表1、表2、表3。

3 实施说明

3.1 防治农作物病虫草害时,应切实贯彻执行“预防为主,综合防治”的方针,积极采用各种有效的非化学防治手段;使用化学农药时,各地要因地制宜,灵活掌握,但不得超过本标准规定的施药量(浓度)和最多使用次数;提倡不同类型的农药交替使用。

3.2 各地有关部门要做好宣传和教育工作,普及科学、合理、安全使用农药的科技知识,提高施药人员的素质。

3.3 使用农药时要做好防护,施药后要及时彻底清洗,并注意防止污染水源和环境。

国家质量技术监督局2000-06-13批准 2000-10-01实施

表 1　杀虫剂/杀螨剂

农药			适用作物	防治对象	每667 m² 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
阿维菌素 abamectin	害极灭 Agrimec 齐墩螨素 爱比菌素 爱福丁	1.8%乳油	柑桔	潜叶蛾、红蜘蛛	4 000～6 000 倍液（3～4.5 mg/L）	喷雾	2	14		0.01
涕灭威 aldicarb	铁灭克 Temik	5%颗粒剂	烟草	烟蚜	667 g(33.3 g)	撒施	1	60	烟苗移栽后撒施	5
噻嗪酮 buprofezin	优乐得 Applaud 扑虱灵	25%可湿性粉剂	茶树	小绿叶蝉、黑刺粉虱	1 000～1 500 倍液（166.7～250 mg/L）	喷雾	1	10		10
克百威 carbofuran	呋喃丹 Furadan	35%种衣剂	玉米	地下害虫	2～2.9 g/100 g 种子（0.7～1 g/100 g 种子）	包衣	1			籽粒 0.1
丁硫克百威 carbosulfan	好年冬 Marshal	35%种衣剂	水稻	蓟马	0.6～1.2 g/100 g 种子（0.2～0.4 g/100 g 种子）	包衣	1			糙米 0.2
				稻瘿蚊	1.7～2.3/100 g 种子（0.6～0.8 g/100 g 种子）					
		20%乳油	节瓜	蓟马	62.5～125 mL(12.5～25 g)	喷雾	2	7		0.8
顺式氟氯氰菊酯 betacyfluthrin	保得 Bulldock	2.5%乳油	棉花	棉铃虫、红铃虫	25～35 mL(0.6～0.9 g)	喷雾	3	15		棉籽 0.05
毒死蜱 chlorpyrifos	乐斯本 Lorsben	48%乳油	柑桔	红蜘蛛、锈壁虱、矢尖介	1 000～2 000 倍液（240～480 mg/L）	喷雾	1	28		0.3

表 1(续)

农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
杀螺胺 clonitralide (niclosamide)	百螺杀 Bayluscide	70%可湿性粉剂	水稻	福寿螺	28～33 g(19.6～23.1 g)	喷雾	2	52		糙米 3
氯氟氰菊酯 cyhalothrin	功夫 Kung Fu	2.5%乳油	大豆	食心虫	12～20 mL(0.3～0.5 g)	喷雾	2	30		青豆 1 大豆 0.2
			烟草	烟蚜	15～20 mL(0.375～0.5 g)		2	7		3
			小麦	麦蚜、粘虫	12～20 mL(0.3～0.5 g)		2	15		0.05
硫丹 endosulfan	赛丹 Thiodan	35%乳油	苹果	黄蚜	3 000～4 000 倍液(87.5～116.7 mg/L)	喷雾	3	15		1
			棉花	棉铃虫	100～166 mL(35～58 g)		3	14		棉籽 1
			茶树	小绿叶蝉	1 000～1 400 倍液(250～350 mg/L)		1	7		成茶 10
				茶尺蠖	750～1 000 倍液(350～467 mg/L)					
S-氰戊菊酯 esfenvaler-ate	来福灵 Sumialpha	5%乳油	玉米	粘虫	10～20 mL(0.5～1 g)	喷雾	3	50		粮谷 2
醚菊酯 ethofenprox	多来宝 Trebon	20%乳油	水稻	稻飞虱	30～45 mL(6～9 g)	喷雾	2	14		糙米 0.5
火线磷 ethoprophos	益收宝 Mocap	5%颗粒剂	水稻	稻瘿蚊	2 000～2 400 g(100～120 g)	撒施	1		插秧后 10 天拌土撒施	粮谷 0.02
四聚乙醛 metaldehyde	蜜达 Meta	6%颗粒剂	水稻	福寿螺	467～776 g(28～40 g)	撒施	2	70	苗期撒施	糙米 1

表 1(完)

农药			适用作物	防治对象	每667 m² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
灭多威 methomyl	万灵 Lannate	24%水溶性液剂	棉花	棉铃虫、棉蚜	75～100 mL (18～24 g)	喷雾	3	7		棉籽 0.5
			茶树	茶小绿叶蝉	800～1 000 倍液 (240～300 mg/L)	喷雾	1	7		3
		90%可溶性粉剂	棉花	棉铃虫、棉蚜	7.8～13.3 g(7～12 g)	喷雾	3	14		棉籽 0.5
			柑桔	潜叶蛾	3 000～5 000 倍液(180～300 mg/L)	喷雾	3	15		1
			烟草	烟青虫	10～14 g(9～13 g)	喷雾	3	10		3
哒螨灵 pyridaben	哒螨酮 速螨酮	15%乳油	茶树	螨类	2 000～4 000 (37.5～75 mg/L)	喷雾	1	5		成茶 1
硫双威 thiodicarb	拉维因 Larvin	37.5%悬浮剂	棉花	棉铃虫	60～90 mL(22～33.75 g)	喷雾	3	21		棉籽 0.5
鱼藤氰 1) rotenone+ 2) fenvalerate	鱼藤氰	1.3%乳油	叶菜	蚜虫、菜青虫	100～123 mL(1.3～1.6 g)	喷雾	3	5		氰戊菊酯 1

表 2　杀菌剂/杀线虫剂

农药			适用作物	防治对象	每667 m² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
苯线磷 fenamiphos	力满库 Nemacur	10%颗粒剂	花生	线虫	2 000～4 000 g(200～400 g)	条施	1		播种时条施	花生仁 0.05
氟硅唑 flusilazol	福星 Nustar	40%乳油	梨	黑星病	8 000～10 000 倍液 (40～50 mg/L)	喷雾	2	21	发病初期喷施	0.2

表 2(完)

农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
亚胺唑 imibenconazole	霉能灵 Manage	15%可湿性粉剂	梨	黑星病	3 000～3 500 倍液(43～50 mg/L)	喷雾	3	28		1
代森锰锌 mancozeb	大生 DithaneM-45	80%可湿性粉剂	苹果	斑点落叶病、轮纹病	800 倍液(1 000 mg/L)	喷雾	3	10		二硫化碳 3 乙撑硫脲 0.05
			番茄	早疫病	167 g(133.3 g)			15		
溴甲烷 methylbromid	溴灭泰 Metabrom	98%压缩气体	黄瓜	线虫	75 g/m^2	土壤处理	1	54	播种前土壤处理	溴离子 50
稻瘟酯 pefurazoate	净种灵 Healthied	20%可湿性粉剂	水稻	恶苗病	200～400 倍液(500～1 000 mg/L)	浸种			播种前浸种 24 h	糙米 0.005
腐霉利 procymidone	速克灵 Sumilex	50%可湿性粉剂	葡萄	灰霉病	75～150 g(37.5～75 g)	喷雾	2	14		5

表 3　除草剂/植物生长调节剂

农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期) d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
乙草胺 acetochlor	禾耐斯 Harness	90%乳油	大豆	一年生禾本科及部分阔叶杂草	58～72 mL(52～66 g)	喷雾	1		播后苗前喷施	籽粒 0.2
草除灵 benazolin-ethyl	高特克 Galtak	50%乳油	油菜	繁缕、牛繁缕、雀舌草、阔叶杂草	27～30 mL(13.5～15 g)	喷雾	1		油菜移栽后 7 天喷施	油菜籽 0.1

表 3(续)

农药			适用作物	防治对象	每667 m² 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
灭草松 bentazon	排草丹 Basagran 苯达松	48%液剂	小麦	阔叶杂草	133～200 mL(64～96 g)	喷雾	1		冬小麦返青后喷施	籽粒0.05
仲丁灵 butralin	止芽素 Tamex	36%乳油	烟草	抑制烟草腋芽	100倍液(3 600 mg/L) 15～20 mL/株	杯淋	1	15	烟株打顶后24小时内杯淋	2
氯嘧黄隆 chlorimuron-ethyl	豆威 Classic	25%干悬浮剂 25%可湿性粉剂	大豆	阔叶杂草	4～6 g(1～1.5 g)	喷雾	1		播后苗前土壤喷施	籽粒0.05
环庚草醚 cinmethylin	艾割 Argold	10%乳油	水稻	稗草、鸭舌草、异型莎草	13～20 g(1.3～2 g)	毒土或喷雾	1		水稻移栽后5～7天毒土或喷雾	糙米0.05
精恶唑禾草灵 fenoxaprop-p-ethyl	骠马 Pumasuper	6.9%水乳剂	小麦	野燕麦、看麦娘等一年生禾本科杂草	40～58 mL(2.8～4 g)	喷雾	1		冬小麦返青后或春小麦分蘖初期喷施	籽粒0.05
		10%乳油			30～40 mL(3～4 g)					
丙炔氟草胺 flumioxazin	速收 Sumisoya	5%可湿性粉剂	大豆	一年生阔叶杂草及部分禾本科杂草	8～12 g(4～6 g)	喷雾	1		大豆苗期喷施	籽粒0.02
精吡氟乙草灵 haloxyfop-R-methyl	高效盖草能 Gallant Super	10.8%乳油	油菜	一年生禾本科杂草	20～30 mL(2～3 g)	喷雾	1		春季油菜3～5叶期喷施	油菜籽1
			大豆		28～32 mL(3～3.5 g)				大豆苗期喷施	籽粒0.5

表 3(完)

农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）d	实施要点说明	最高残留限量(MRL)值 mg/kg
通用名	商品名	剂型及含量								
氟烯草酸 flumiclorac pentryl	利收 Resource	10%乳油	大豆	阔叶杂草	30～45 mL(3～4.5 g)	喷雾	1		大豆苗期喷施	籽粒 0.02
异丙甲草胺 metolachlor	稻乐思 Dualrice	72%乳油	水稻	稗草等一年生禾本科杂草	10～20 mL(7.2～14.4 g)	喷雾	1		移栽后喷施或撒施毒土	糙米 0.1
噻吩黄隆 thifensulfron-methyl	宝收 Harmony	75%干悬浮剂 75%可湿性粉剂	玉米	阔叶杂草	2～3 g(1.5～2.1 g)	喷雾	1		玉米苗期喷施	籽粒 0.1
			小麦						小麦拔节期喷施	籽粒 0.1
苄甲磺隆 1) metsulfuron-methyl＋2) bensulfuron-methyl	新得力 Sindax	10%可湿性粉剂	水稻	阔叶杂草及一年生莎草等	4～7 g(0.4～0.7 g)	喷雾	1		移栽后 7～10 天喷施	糙米：甲黄隆 0.05 苄嘧黄隆 0.02
复硝酚一铵	多效丰产灵	1.2%水剂	白菜	促进生长	2 000 倍液(6 mg/L)	喷雾	2	7		(1) ONPNH:0.1 (2) PNPNH:0.05 (3) 5NGNH:0.02

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
农药合理使用准则(六)
GB/T 8321.6—2000
*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
http://www.bzcbs.com
电话:63787337、63787447
2002年4月第一版 2004年11月电子版制作
*
书号:155066·1-18326

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

GB/T 8321.6-2000