ICS 65.100
B 17

中华人民共和国国家标准

GB/T 8321.10—2018

农药合理使用准则(十)

Guideline for safety application of pesticides(X)

2018-02-06 发布　　2018-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　项目和技术指标 …… 1
3.1　杀虫剂/杀螨剂 …… 1
3.2　杀菌剂/杀线虫剂 …… 24
3.3　除草剂/植物生长调节剂 …… 46

前　言

GB/T 8321《农药合理使用准则》由下列几个部分组成：

——GB/T 8321.1—2000　农药合理使用准则(一)；

——GB/T 8321.2—2000　农药合理使用准则(二)；

——GB/T 8321.3—2000　农药合理使用准则(三)；

——GB/T 8321.4—2004　农药合理使用准则(四)；

——GB/T 8321.5—2004　农药合理使用准则(五)；

——GB/T 8321.6—2000　农药合理使用准则(六)；

——GB/T 8321.7—2002　农药合理使用准则(七)；

——GB/T 8321.8—2007　农药合理使用准则(八)；

——GB/T 8321.9—2009　农药合理使用准则(九)；

——GB/T 8321.10—2018　农药合理使用准则(十)。

本部分为 GB/T 8321 的第 10 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中华人民共和国农业部提出并归口。

本部分起草单位：农业部农药检定所。

本部分主要起草人：叶贵标、简秋、秦冬梅、龚勇、朱光艳、郑尊涛、顾宝根、季颖、叶纪明、单炜力、周力、武丽芬。

农药合理使用准则(十)

1 范围

GB/T 8321 的本部分规定了 430 种农药在 50 种作物上 580 项合理使用准则。

本部分适用于农作物病、虫、草害的防治和植物生长调节剂的使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

3 项目和技术指标

3.1 杀虫剂/杀螨剂

杀虫剂/杀螨剂见表 1,最大残留限量按 GB 2763 执行。

表 1　杀虫剂/杀螨剂

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/(mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
1	阿维菌素	abamectin	0.2%可湿性粉剂	柑橘	红蜘蛛	800～1 000 倍液（2 mg/L～2.5 mg/L）	喷雾	2	14		0.02
			0.9%乳油		红蜘蛛	1 500～2 000 倍液（4.5 mg/L～6 mg/L）	喷雾	2	14		0.02
			1%乳油	梨	梨木虱	2 000～3 200 倍液（3.1 mg/L～5 mg/L）	喷雾	2	14		0.02
			1.8%乳油	甘蓝	小菜蛾	33 mL～50 mL	喷雾	2	7		0.05
				萝卜	小菜蛾	30 mL～50 mL	喷雾	2	7		0.01
				普通白菜	小菜蛾	30 mL～50 mL	喷雾	2	5		0.05
			2%乳油	水稻	稻纵卷叶螟	20 mL～30 mL	喷雾	2	21		0.02(糙米)
			1.8%可湿性粉剂	小白菜	菜青虫	30 g～40 g	喷雾	2	5		0.05
2	甲氨基阿维菌素	abamectin-aminomethyl	0.5%乳油	甘蓝	小菜蛾	25 mL～50 mL	喷雾	2	7		0.1
3	乙酰甲胺磷	acephate	30%乳油	水稻	二化螟	175 mL～225 mL	喷雾	2	45		1(糙米)

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
4	啶虫脒	acetamiprid	20%可溶粉剂	柑橘	蚜虫	2 500～5 000 倍液（40 mg/kg～80 mg/kg）	喷雾	3	21		0.5
				棉花	棉蚜	6 g～10 g	喷雾	2	21		0.1（棉籽）
			3%乳油	苹果	蚜虫	2 500～3 000 倍液（10 mg/kg～12 mg/kg）	喷雾	1	14		0.8
				小麦	蚜虫	60 mL～80 mL	喷雾	2	14		0.5
			50%乳油	柑橘	蚜虫	4 000～5 000 倍液（10 mg/L～12.5 mg/L）	喷雾	2	14		0.5
			3%微乳剂	苹果	蚜虫	1 500～2 000 倍液（15 mg/kg～20 mg/kg）	喷雾	1	14		0.8
			5%微乳剂	甘蓝	蚜虫	20 mL～40 mL	喷雾	2	7		0.5
5	涕灭威	aldicarb	5%颗粒剂	甘薯	茎线虫	2 000 g～3 000 g	穴施	1	—	甘薯苗移植时穴施	0.1
6	顺式氯氰菊酯	alpha-cypermethrin	20%悬浮种衣剂	玉米	地下害虫	1.5 mL/kg～1.75 mL/kg 种子（0.30 g/kg～0.35 g/kg 种子）	拌种	1	—		0.05
7	磷化铝	aluminum phosphide	85%粒剂	谷物	储粮害虫	3.5 g/m^3～5 g/m^3	熏蒸	1	45		0.05
8	印楝素	azadirachtin	0.3%乳油	甘蓝	小菜蛾	300 mL～500 mL	喷雾	3	5		0.1

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
9	三唑锡	azocyclotin	10％乳油	柑橘	红蜘蛛	1 000～1 500 倍液（67 mg/L～100 mg/L）	喷雾	2	30		2
10	高效氯氰菊酯	beta-cypermethrin	4.5％乳油	甘蓝	菜青虫	30 mL～50 mL	喷雾	2	7		5
			4.5％水乳剂		菜青虫	30 mL～50 mL	喷雾	2	7		5
			4.5％微乳剂	甘蓝	菜青虫	30 mL～40 mL	喷雾	2	7		5
				苹果	桃小食心虫	1 000～1 500 倍液（30 mg/L～45 mg/L）	喷雾	2	14		2
			4.5％悬浮剂	甘蓝	菜青虫	30 mL～40 mL	喷雾	2	7		5
11	甲萘威	carbaryl	85％可湿性粉剂	棉花	地老虎	120 g～160 g	喷雾	3	14		1（棉籽）
12	克百威	carbofuran	10％悬浮种衣剂	玉米	地下害虫	200 g/kg～250 g/kg 种子	种子包衣	1	—		0.1
13	丁硫克百威	carbosulfan	35％种子处理干粉剂	水稻	蓟马	6 g/kg～12 g/kg 种子	拌种	1	—		0.5（糙米）
			5％颗粒剂	甘薯	根结线虫	3 600 g～5 400 g	穴施或沟施	1	—	甘薯定植期用药	1
14	杀螟丹	cartap	4％颗粒剂	水稻	稻纵卷叶螟	1 500 g～2 250 g	撒施	1	21	撒施	0.1（糙米）
15	氯虫苯甲酰胺	chlorantraniliprole	20％悬浮剂	水稻	二化螟、三化螟、稻纵卷叶螟	5 mL～10 mL	喷雾	2	21		

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
16	虫螨腈	chlorfenapyr	24%悬浮剂	黄瓜	斜纹夜蛾	36 mL～60 mL	喷雾	2	3		0.5
				苹果	金纹细蛾	3 333～4 000 倍液（50 mg/kg～60 mg/kg）	喷雾	2	14		
				茄子	蓟马	24 mL～36 mL	喷雾	1	7		
			30%悬浮剂	甘蓝	小菜蛾	11 mL～23 mL	喷雾	1	14		1
17	毒死蜱	chlorpyrifos	10%颗粒剂	甘蔗	蔗龟	1200 g～1 500 g	拌细沙撒施	1	—	苗期用药	0.05
			15%颗粒剂	花生	地老虎、金针虫、蝼蛄	1 000 g～1 500 g	拌细土撒施	1	—	下针前施药	0.2
			5%颗粒剂	花生	蛴螬	1 500 g～3 000 g	拌细土撒施	1	—	下针前施药	0.2
			25%微乳剂	柑橘	红蜘蛛、锈壁虱、矢尖介	520～1 040 倍液（240 mg/L～480 mg/L）	喷雾	2	21		1
			30%水乳剂	水稻	稻纵卷叶螟	80 mL～120 mL	喷雾	2	28		0.5（稻谷）
			30%微乳剂	棉花	蚜虫	100 mL～150 mL	喷雾	2	28		0.3（棉籽）
			40%乳油	大豆	食心虫	80 mL～100 mL	喷雾	2	带荚青豆 21 d，大豆 35 d		0.1
				荔枝	蒂蛀虫	800～1 000 倍液（400 mg/L～500 mg/L）	喷雾	2	14		1
				萝卜	菜青虫、蚜虫	90 mL～120 mL	喷雾	2	14		1
			48%乳油	水稻	稻纵卷叶螟	100 mL～120 mL	喷雾	2	28		0.5（稻谷）
				玉米	地下害虫	150 mL～180 mL	灌根	1		苗期用药	0.05
				甘蓝	地下害虫	80 mL～100 mL	拌细土撒施	1	—	定植后 5 d 左右施药	1

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
18	四螨嗪	clofentezine	10％可湿性粉剂	柑橘	红蜘蛛	800～1 000 倍液（100 mg/L～125 mg/L）	喷雾	2	14		0.5
19	氯氰菊酯	cyperme-thrin	5％微乳剂	萝卜	菜青虫	40 mL～60 mL	喷雾	2	7		
20	灭蝇胺	cyromazine	50％可湿性粉剂	菜豆	美洲斑潜蝇	25 g～30 g	喷雾	2	7		0.5
21	溴氰菊酯	deltamethrin	2.5％乳油	甘蓝	菜青虫	20 mL～40 mL	喷雾	2	7		0.5
				萝卜	菜青虫	20 mL～40 mL	喷雾	2	7		0.2
				普通白菜	菜青虫	30 mL～50 mL	喷雾	2	7		0.5
22	丁醚脲	diafenthiu-ron	25％乳油	甘蓝	小菜蛾	80 mL～120 mL	喷雾	1	7		2
			50％可湿性粉剂	甘蓝	蚜虫、粉虱	37.5 mL～45 mL	喷雾	2	7		2
			50％悬浮剂	茶叶	假眼茶小绿叶蝉	100 mL～120 mL	喷雾	2	7		5
				甘蓝	小菜蛾	37.5 mL～45 mL	喷雾	1	7		2
23	二嗪磷	diazinon	4％颗粒剂	普通白菜	地下害虫	1 200 g～1 500 g	拌土撒施	1	30		0.2
24	敌敌畏	dichlorvos	22％烟剂	黄瓜（大棚）	蚜虫	273 g～400 g	点燃放烟	2	3		0.2
			28％缓释剂	玉米	玉米象	28.6 g～40 g 制剂/吨粮	放置熏蒸	1	180		0.2
			80％乳油	普通白菜	菜青虫	50 mL～100 mL	喷雾	2	5		0.2
				甘蓝	菜青虫	50 mL～100 mL	喷雾	2	5		0.5

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
25	除虫脲	diflubenzuron	20%悬浮剂	甘蓝	菜青虫	30 mL～50 mL	喷雾	2	14		2
			5%乳油	茶叶	茶尺蠖	1 000～1 500 倍液（33 mg/L～50 mg/L）	喷雾	1	5		20
26	乐果	dimethoate	40%乳油	甘蓝	蚜虫	75 mL～100 mL	喷雾	2	7		1
				萝卜	蚜虫	75 mL～100 mL	喷雾	2	7		0.5
				普通白菜	蚜虫	50 mL～100 mL	喷雾	2	10		1
27	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	emamectin benzoate	0.2%乳油	甘蓝	小菜蛾	50 mL～60 mL	喷雾	2	5		0.1
			0.5%乳油			20 mL～24 mL					
			1%乳油	甘蓝	小菜蛾、菜青虫	10 mL～30 mL	喷雾	2	5		0.1
			2%乳油			6 mL～8 mL					0.1
			2.5%水分散粒剂	甘蓝	小菜蛾	4 g～6 g	喷雾	2	5		0.1
			5%水分散粒剂	甘蓝	甜菜夜蛾	3 g～4 g	喷雾	2	21		0.1
28	乙螨唑	etoxazole	11%悬浮剂	柑橘	红蜘蛛	5 000～7 500 倍液（14.7 mg/L～22 mg/L）	喷雾	1	21		0.5
29	苯丁锡	fenbutatin oxide	10%乳油	柑橘	红蜘蛛	500～600 倍液（167 mg/L～200 mg/L）	喷雾	2	21		1
30	甲氰菊酯	fenpropathrin	20%乳油	普通白菜	小菜蛾、菜青虫	40 mL～80 mL	喷雾	1	14		1
				萝卜	菜青虫	40 mL～80 mL	喷雾	2	7		0.5

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
31	唑螨酯	fenpyroximate	5%悬浮剂	棉花	叶螨	20 mL～40 mL	喷雾	2	15		0.1（棉籽）
32	氟铃脲	hexaflumuron	5%乳油	甘蓝	小菜蛾、菜青虫、甜菜夜蛾	27 mL～60 mL	喷雾	2	7		0.5
				棉花	棉铃虫	120 mL～160 mL	喷雾	2	21		
33	吡虫啉	imidacloprid	10%可湿性粉剂	萝卜	蚜虫	10 g～20g	喷雾	2	7		0.5
				苹果	黄蚜	2 000～4 000 倍液（25 mg/L～50 mg/L）	喷雾	2	14		0.5
				水稻	叶蝉、飞虱	10 g～20 g	喷雾	2	14		0.05（糙米）
				小麦	蚜虫	30 g～ 40 g	喷雾	2	14		0.05
			25%可湿性粉剂	水稻	稻飞虱	4 g～8 g	喷雾	2	14		0.05（糙米）
				小麦	蚜虫	北方地区：12 g～16 g；南方地区：4 g～8 g	喷雾	2	14		0.05
			10%乳油	萝卜	蚜虫	20 mL～30 mL	喷雾	2	7		0.5
				水稻	飞虱	20 mL～40 mL	喷雾	2	14		0.05（糙米）
			5%乳油	甘蓝	蚜虫	20 mL～24 mL	喷雾	2	7		1
				水稻	飞虱	40 mL	喷雾	3	14		0.05（糙米）
				烟草	蚜虫	30 mL～50 mL	喷雾	2	21		
			20%可溶性液剂	苹果	黄蚜	2 500～5 000 倍液（40 mg/L～80 mg/L）	喷雾	2	14		0.5

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
33	吡虫啉	imidacloprid	25％悬浮剂	甘蓝	蚜虫	6 mL～8 mL	喷雾	3	7		1
			35％悬浮剂	甘蓝	蚜虫	3 mL～5 mL	喷雾	3	7		1
			60％悬浮剂	水稻	稻飞虱	4 mL～5 mL	喷雾	2	14		0.05（糙米）
			30％微乳剂	水稻	稻飞虱	5 mL～7 mL	喷雾	2	14		0.05（糙米）
			70％水分散粒剂	茶叶	小绿叶蝉	2 g～4 g	喷雾	1	7		0.5
				甘蓝	蚜虫	2.86 g	喷雾	3	7		1
				棉花	蚜虫	2 g～4 g	喷雾	1	14		0.05（棉籽）
				苹果	苹果黄蚜	14 000～25 000 倍液（28 mg/L～50 mg/L）	喷雾	1	14		0.5
				水稻	稻飞虱	2.5 g～3.5 g	喷雾	2	14		0.05（糙米）
34	氯噻啉	imidaclothiz	10％可湿性粉剂	茶叶	小绿叶蝉	20 g～30 g	喷雾	1	5		
				番茄（大棚）	白粉虱	15 g～30 g	喷雾	2	7		
				甘蓝	蚜虫	10 g～15 g	喷雾	3	7		
				柑橘	蚜虫	4 000～5 000 倍液（20 mg/L～25 mg/L）	喷雾	3	14		
				小麦	蚜虫	1 g～20 g	喷雾	2	14		
			40％水分散粒剂	水稻	稻飞虱	4 g～5 g	喷雾	3	21		
35	茚虫威	indoxacarb	15％悬浮剂	甘蓝	小菜蛾	10 mL～18 mL	喷雾	3	7		3
				棉花	棉铃虫	10 mL～18 mL	喷雾	3	14		0.1（棉籽）

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
36	水胺硫磷	isocarbo-phos	40％乳油	棉花	红蜘蛛、棉铃虫	50 mL～100 mL	喷雾	2	28		0.05（棉籽）
				水稻	蓟马、螟虫	75 mL～200 mL	喷雾	3	21		0.1（糙米）
37	甲基异柳磷	isofenphos-methyl	2.5％颗粒剂	甘蔗	蔗龟	5 000 g	沟施或穴施	1	—		0.02
				小麦	吸浆虫	1 320 g～2 000 g	撒施或拌毒土撒施	1	21		0.02
38	异丙威	isoprocarb	20％烟剂	黄瓜（大棚）	白粉虱	200 g～300 g	薰蒸	2	5		0.5
39	高效氯氟氰菊酯	lambda-cyhalothrin	10％可湿性粉剂	甘蓝	菜青虫	8 g～12 g	喷雾	3	7		1
			10％种子处理微囊悬浮剂	玉米	蝼蠓	2 mL/kg～3 mL/kg 种子	种子包衣	1	—		0.02
			5％微乳剂	普通白菜	菜青虫	15 mL～27 mL	喷雾	3	7		2
40	马拉硫磷	malathion	1.8％粉剂	仓储原粮	储粮害虫	666.7 g/1 000 kg 原粮～1 333.3 g/1 000 kg 原粮	拌粮	1	365	原粮晒后降温晾凉储存时拌粮	8
			45％乳油	柑橘	蚜虫	1 500～2 000 倍液（225 mg/L～300 mg/L）	喷雾	3	21		2
41	苦参碱	matrine	0.36％乳油	梨	黑星病	400～600 倍液（6 mg/L～9 mg/L）	喷雾	3	21		

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
42	四聚乙醛	metaldehyde	6%颗粒剂	烟草	蛞蝓、蜗牛	400 g～545 g	撒施	2	42		
43	威百亩	metamsodium	35%水剂	黄瓜	根结线虫	4 000 mL～6 000 mL	沟施	1	—	土壤处理	0.05
44	甲氧虫酰肼	methoxyfenozide	24%悬浮剂	甘蓝	甜菜夜蛾	10 mL～20 mL	喷雾	3	7	生长期施药	2
				苹果	小卷叶蛾	3 000～5 000 倍液（48 mg/L～80 mg/L）	喷雾	1	50		3
				水稻	二化螟	20 mL～28 mL	喷雾	1	45		
45	烯啶虫胺	nitenpyram	10%可溶液剂	柑橘	蚜虫	4 000～5 000 倍液（20 mg/kg～25 mg/kg）	喷雾	3	14		0.5
46	氧乐果	omethoate	18%乳油	棉花	蚜虫	47 g～75 g	喷雾	2	14		0.02（棉籽）
			40%乳油	小麦	蚜虫	50 mL～75 mL	喷雾	2	14		0.02
47	甲拌磷	phorate	3%颗粒剂	棉花	蚜虫	3 000 g～4 000 g	沟施	1	—	苗期沟施	0.05（棉籽）
			30%粉粒剂	小麦	地下害虫	10 g/kg～20 g/kg 种子	拌种	1	—		0.02
			55%乳油	棉花	蚜虫	6 g/kg～8 g/kg 种子	拌种	1	—		0.05（棉籽）
48	辛硫磷	phoxim	3%颗粒剂	花生	地下害虫	6 667 g～8 333 g	穴施	1	—	播种时撒施	0.05
				玉米	玉米螟	250 g～350 g	撒施	1	—	喇叭口期施药	0.05
			40%乳油	甘蓝	菜青虫	75 mL～100 mL	喷雾	3	7		0.1
				萝卜	菜青虫	75 mL～100 mL	喷雾	3	7		0.05
				普通白菜	菜青虫	60 mL～90 mL	喷雾	2	7		0.1

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
49	甲基嘧啶磷	pirimiphos-methyl	50%乳油	仓储稻谷	赤拟谷盗、谷蠹、玉米象	10 mg/kg～15 mg/kg 稻谷	喷雾	1	90		5（稻谷）
50	炔螨特	propargite	20%水乳剂	苹果	二斑叶螨	1 000～1 500 倍液（133.3 mg/L～200 mg/L）	喷雾	3	14		5
			40%乳油	柑橘	红蜘蛛	700～1 400 倍液（285 mg/L～570 mg/L）	喷雾	3	21		5
51	丙溴磷	protenofos	40%乳油	水稻	稻纵卷叶螟	90 mL～110 mL	喷雾	3	21		0.02（糙米）
			50%乳油	棉花	棉铃虫	100 mL～125 mL	喷雾	2	21		0.05（棉籽油）
52	吡蚜酮	pymetrozine	25%可湿性粉剂	水稻	稻飞虱	16 g～20 g	喷雾	2	14		
				小麦	灰飞虱、蚜虫	16 g～20 g	喷雾	2	14		0.02
			50%水分散性粒剂	水稻	稻飞虱	12 g～20 g	喷雾	1	14		
53	除虫菊素	pyrethrins	5%乳油	白菜	蚜虫	30 mL～50 mL	喷雾	3	3		
54	哒螨灵	pyridaben	15%乳油	柑橘	红蜘蛛	2 500～3 000 倍液（50 mg/L～60 mg/L）	喷雾	2	14		2
				苹果	红蜘蛛	2 240～3 000 倍液（50 mg/L～67 mg/L）	喷雾	2	14		2
			20%可湿性粉剂	苹果	红蜘蛛	3 000～4 000 倍液（50 mg/L～66.7 mg/L）	喷雾	2	14		2

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
55	三氟甲吡醚	pyridalyl	10％乳油	甘蓝	小菜蛾	50 mL～70 mL	喷雾	1	7		
56	鱼藤酮	rotenone	2.5％乳油	甘蓝	蚜虫	100 mL～150 mL	喷雾	3	7		0.5
57	乙基多杀菌素	spinetoram	6％悬浮剂	茄子	蓟马	10 mL～20 mL	喷雾	3	7		0.1
				甘蓝	甜菜夜蛾、小菜蛾	20 mL～40 mL	喷雾	3	7		0.5
58	螺虫乙酯	spirotetra-mat	24％悬浮剂	柑橘	介壳虫	4 000～5 000 倍液（48 mg/L～60 mg/L）	喷雾	1	45		1
59	硫酰氟	sulfuryl	99％气体制剂	小麦	仓储害虫	10 g/m^3	密闭熏蒸	1	3		
60	虫酰肼	tebufenozide	20％可湿性粉剂	甘蓝	甜菜夜蛾	50 g～100 g	喷雾	2	21		1
61	三氯杀螨砜	tetradifon	10％乳油	苹果	红蜘蛛	500 ～800 倍液（125 mg/L～200 mg/L）	喷雾	1	14		2
62	噻虫啉	thiacloprid	48％悬浮剂	黄瓜	蚜虫	7 mL～14 mL	喷雾	3	3		1
63	噻虫嗪	thiamethoxam	25％水分散粒剂	水稻	稻飞虱	2 g～4 g	喷雾	2	28		0.1（糙米）
				西瓜	蚜 虫	8 g～10 g	喷雾	2	7		0.2
64	唑虫酰胺	tolfenpyrad	15％乳油	白菜	小菜蛾	30 mL～50 mL	喷雾	2	14		0.5（大白菜）
				甘蓝	小菜蛾	30 mL～50 mL	喷雾	2	14		0.5
				茄子	蓟马	50 mL～80 mL	喷雾	3	3		0.5
65	三唑磷	triazophos	10％乳油	水稻	三化螟	120 mL～150 mL	喷雾	3	42		0.05（稻谷）

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
66	敌百虫	trichlorfon	30%乳油	甘蓝	菜青虫	150 mL～200 mL	喷雾	1	7		0.1
				萝卜	菜青虫	150 mL～200 mL	喷雾	1	7		0.5
67	藜芦碱	veratrine	0.5%可溶性液剂	甘蓝	菜青虫	75 mL～100 mL	喷雾	3	7		
				棉花	棉铃虫	75 mL～100 mL	喷雾	3	7		
68	硝虫硫磷	xiaochongliulin	30%乳油	柑橘	矢尖蚧	600～750 倍液（500 mg/L～400 mg/L）	喷雾	2	28		
69	阿维菌素＋啶虫脒	abamectin＋acetamiprid	4%乳油（阿维菌素 1%＋啶虫脒 3%）	黄瓜	蚜虫等虫害	10 mL～20 mL	喷雾	3	3		阿维菌素：0.02；啶虫脒：1
70	阿维菌素＋抑食肼	abamectin＋benzoic acid	20%可湿性粉剂（阿维菌素 0.3%＋抑食肼 19.7%）	甘蓝	菜青虫	40 g～50 g	喷雾	1	7		阿维菌素：0.05
71	阿维菌素＋高效氯氰菊酯	abamectin＋beta-cypermethrin	1.8%乳油（阿维 0.3%＋高氯 1.5%）	甘蓝	菜青虫、小菜蛾	27.78 mL～55.56 mL	喷雾	2	7		阿维菌素：0.05；高效氯氰菊酯：5
			3%乳油（阿维 0.2%＋高氯 2.8%）	甘蓝	菜青虫、小菜蛾	30 mL～60 mL	喷雾	2	7		阿维菌素：0.05；高效氯氰菊酯：5
			5%乳油（阿维 0.3%＋高氯 4.7%）	黄瓜	美洲斑潜蝇	20 mL～40 mL	喷雾	2	3		阿维菌素：0.02；高效氯氰菊酯：0.2

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
72	阿维菌素＋联苯菊酯	abamectin＋bifenthrin	3.3％乳油（联苯菊酯 30 g/L＋阿维菌素 3 g/L）	甘蓝	小菜蛾	50 mL～80 mL	喷雾	1	7		阿维菌素：0.05； 联苯菊酯：0.2
73	阿维菌素＋丁醚脲	abamectin＋diafenthiuron	15.6％乳油（阿维菌素 0.6％＋丁醚脲 15％）	苹果	红蜘蛛	2 000～3 000 倍液（52 mg/L～78 mg/L）	喷雾	2	14		阿维菌素：0.02； 丁醚脲：0.5
74	阿维菌素＋甲氰菊酯	abamectin＋fenpropathrin	5.1％可湿性粉剂（阿维菌素 0.1％＋甲氰菊酯 5％）	甘蓝	小菜蛾	40 g～60 g	喷雾	3	14		阿维菌素：0.05； 甲氰菊酯：0.5
75	阿维菌素＋吡虫啉	abamectin＋imidacloprid	1.7％微乳剂（阿维菌素 0.2％＋吡虫啉 1.5％）	烟草	蚜虫	40 mL～50 mL	喷雾	3	7		
76	阿维菌素＋杀虫单	abamectin＋monosultap	20％微乳剂（阿维菌素 0.2％＋杀虫单 19.8％）	菜豆	美洲斑潜蝇	30 mL～60 mL	喷雾	1	7		阿维菌素：0.1； 杀虫单：2
77	阿维菌素＋辛硫磷	abamectin＋phoxim	15％乳油（阿维菌素 0.3％＋辛硫磷 14.7％）	甘蓝	小菜蛾	50 mL～75 mL	喷雾	3	7		阿维菌素：0.05； 辛硫磷：0.1

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
78	阿维菌素＋炔螨特	abamectin＋propargite	56%微浮剂（阿维菌素 0.3%＋炔螨特 55.7%）	柑橘	红蜘蛛	2 000～4 000 倍液（140 mg/L～280 mg/L）	喷雾	2	14		阿维菌素：0.02；炔螨特：5
79	阿维菌素＋哒螨灵	abamectin＋pyridaben	10%乳油（阿维菌素 0.2%＋哒螨灵 9.8%）	苹果	红蜘蛛	2 000～4 000 倍液（25 mg/L～50 mg/L）	喷雾	2	14		阿维菌素：0.02；哒螨灵：2
80	阿维菌素＋三唑磷	abamectin＋triazophos	20% 乳油（阿维菌素 0.2%＋三唑磷含量 19.8%）	水稻	二化螟	60 mL～80 mL	喷雾	2	28	水稻拔节后施药	阿维菌素 0.02（糙米）；三唑磷：0.05（稻谷）
81	啶虫脒＋毒死蜱	acetamiprid＋chlorpyrifos	30%水乳剂（啶虫脒 1%＋毒死蜱 29%）	柑橘	柑橘蚜虫	1 000～1 500 倍液（200 mg/L～300 mg/L）	喷雾	3	14		啶虫脒：0.5；毒死蜱：1
82	高效氯氰菊酯＋噻嗪酮	beta-cypermethrin＋buprofezin	20%乳油（高效氯氰菊酯 2%＋噻嗪酮 18%）	番茄（大棚）	白粉虱	65 mL～80 mL	喷雾	2	2		高效氯氰菊酯：0.2；噻嗪酮：2
83	高效氯氰菊酯＋毒死蜱	beta-cypermethrin＋chlorprifos	20%乳油（毒死蜱 18%＋高效氯氰菊酯 2%）	甘蓝	甜菜夜蛾	60 mL～100 mL	喷雾	3	7		高效氯氰菊酯：1；毒死蜱：1
				棉花	棉铃虫	40 mL～60 mL	喷雾	3	21		高效氯氰菊酯 0.05（棉籽）；毒死蜱 0.3

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
84	高效氯氰菊酯＋甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	beta-cypermethrin＋emamectin benzoate	2%微乳剂（高效氯氰菊酯1.9%＋甲氨基阿维菌素0.1%）	甘蓝	小菜蛾、斜纹夜蛾	40 mL～60 mL	喷雾	3	7		高效氯氰菊酯：1；甲氨基阿维菌素苯甲酸盐：0.1
			3%微乳剂（高效氯氰菊酯2.7%＋甲氨基阿维菌素0.3%）		甜菜夜蛾、小菜蛾	30 mL～40 mL	喷雾	3	7		高效氯氰菊酯：1；甲氨基阿维菌素苯甲酸盐：0.1
			4%微乳剂（高效氯氰菊酯3.7%＋甲氨基阿维菌素0.3%）		小菜蛾	15 mL～20 mL	喷雾	3	7		高效氯氰菊酯：1；甲氨基阿维菌素苯甲酸盐：0.1
			4.2%乳油（高效氯氰菊酯4%＋甲氨基阿维菌0.2%）		甜菜夜蛾	60 mL～70 mL	喷雾	1	7		高效氯氰菊酯：1；甲氨基阿维菌素苯甲盐：0.1
85	高效氯氰菊酯＋辛硫磷	beta-cypermethrin＋phoxim	22%乳油高效氯氰菊酯1%＋辛硫磷21%）	荔枝	卷叶虫	1 500～2 000倍液（110 mg/L～147 mg/L）	喷雾	2	7		高效氯氰菊酯：0.1；辛硫磷：0.05

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
86	联苯菊酯＋吡虫啉	bifenthrin＋imidacloprid	15%悬浮剂（吡虫啉 10%＋联苯菊酯 5%）	茶叶	茶小绿叶蝉	30 mL～45 mL	喷雾	1	7		联苯菊酯：5；吡虫啉：0.5
87	噻嗪酮＋杀扑磷	buprofezin＋methidathion	20%可湿性粉剂（噻嗪酮 15%＋杀扑磷 5%）	柑橘	矢尖蚧	800～1 000 倍液（200 mg/L～250 mg/L）	喷雾	2	21		噻嗪酮：0.5；杀扑磷：2
88	甲萘威＋四聚乙醛	carbaryl＋metaldehyde	6%颗粒剂（1.5%甲萘威＋4.5%四聚乙醛）	普通白菜	蜗牛	600 g～750 g	撒施	2	7		甲萘威：1；四聚乙醛：3
89	克百威＋萎锈灵＋福美双	carbofuran＋carboxin＋thiram	25%悬浮种衣剂（福美双 11.5%＋克百威 7%＋萎锈灵 6.5%）	玉米	金针虫、蝼蛄、蛴螬、丝黑穗病、小地老虎	1∶40～1∶50（药种比）	拌种	1	—		克百威：0.1；萎锈灵：0.2；福美双：0.1
90	克百威＋马拉硫磷	carbofuran＋malathion	3%颗粒剂（克百威 1%＋马拉硫磷 2%）	水稻	飞虱	2 000 g～2 500 g	撒施	1	—	播种后或移栽前	克百威：0.1（糙米）；马拉硫磷：1（糙米）
91	克百威＋甲拌磷	carbofuran＋phorate	25%悬浮种衣剂（克百威 8%＋甲拌磷 17）	花生	地老虎、金针虫、蝼蛄、蛴螬	药种比：1%（10 g/kg 种子）	种子包衣	1	—	拌种	克百威：0.2；甲拌磷：0.1

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
92	克百威＋福美双	carbofuran＋thiram	30％种子处理剂（克百威 10％＋福美双 20％）	大豆	地下害虫、根腐病	267 g/100 kg～400 g/100 kg 种子（80 g/100 kg～120 g/100 kg 种子）	种子包衣	1	—		克百威：0.2；福美双：0.3
93	丁硫克百威＋毒死蜱	carbosulfan＋chlorpyrifos	5％颗粒剂（丁硫克百威 1％＋毒死蜱 4％）	花生	根结线虫	3 000 g～5 000 g	沟施	1	—		丁硫克百威：0.05；毒死蜱：0.2
94	丁硫克百威＋戊唑醇＋福美双	carbosulfan＋tebuconazole＋thiram	20％悬浮种衣剂（丁硫克百威 6％＋戊唑醇 0.4％＋福美双 13.6％）	玉米	地下害虫、丝黑穗病	16.7 g ～25 g/kg 种子	拌种	1	—		丁硫克百威：0.1；福美双：0.1
95	毒死蜱＋氟啶脲	chlorpyrifos＋chlorfluazuron	10％水乳剂（毒死蜱 9％＋氟啶脲 1％）	甘蓝	菜青虫 小菜蛾	80 mL～100 mL	喷雾	1	14		毒死蜱：1；氟啶脲：2
96	毒死蜱＋灭蝇胺	chlorpyrifos＋cyromazine	25％可湿性粉剂（毒死蜱 20％＋灭蝇胺 5％）	黄瓜	黄瓜美洲斑潜蝇	30 g～50 g	喷雾	2	3		毒死蜱：0.1；灭蝇胺：1
97	毒死蜱＋辛硫磷	chlorpyrifos＋phoxim	5％颗粒剂（毒死蜱 2％＋辛硫磷 3％）	甘蔗	蔗螟	3 kg～4 kg	撒施或沟施	1	—		毒死蜱：0.05；辛硫磷：0.05

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
98	毒死蜱＋丙溴磷	chlorpyrifos＋protenofos	30%乳油（毒死蜱 12%＋丙溴磷 18%）	甘蓝	美洲斑潜蝇、小菜蛾、斜纹夜蛾	80 mL～100 mL	喷雾	1	14		毒死蜱：1；丙溴磷：0.5
99	四螨嗪＋哒螨灵	clofentezine＋pyridaben	10%悬浮剂（四螨嗪 3.5%＋哒螨灵 6.5%）	苹果	红蜘蛛	1 000～2 000 倍液（35 mg/kg～70 mg/kg）	喷雾	1	14		四螨嗪：0.5；哒螨灵：2
100	氯氰菊酯＋马拉硫磷	cypermethrin＋malathion	16%乳油（氯氰菊酯 2%＋马拉硫磷 14%）	荔枝	荔枝蝽蠓	1 500～2 000 倍液（80 mg/L～106.7 mg/L）	喷雾	3	7		氯氰菊酯：0.5；马拉硫磷：0.5
101	氯氰菊酯＋丙溴磷	cypermethrin＋protenofos	44%乳油（氯氰菊酯 4%＋丙溴磷 40%）	柑橘	潜叶蛾	2 000～3 000 倍液（146.7 mg/L～220 mg/L）	喷雾	3	14		氯氰菊酯：1；丙溴磷：0.2
102	敌敌畏＋毒死蜱	dichlorvos＋chlorpyrifos	35%乳油（敌敌畏 25%＋毒死蜱 10%）	水稻	稻纵卷叶螟	80 mL～100 mL	喷雾	2	14		敌敌畏：0.2（糙米）；毒死蜱：0.5（稻谷）
103	敌敌畏＋仲丁威	dichlorvos＋fenobucarb	20%乳油（敌敌畏 12%＋仲丁威 8%）	水稻	飞虱	100 mL～120 mL	喷雾	3	14		敌敌畏：0.2（糙米）；仲丁威：0.5（稻谷）
104	敌敌畏＋氰戊菊酯	dichlorvos＋fenvalerate	20%乳油（敌敌畏 15%＋氰戊菊酯 5%）	桃树	蚜虫	2 000～3 000 倍液（66.67 mg/kg～100 mg/kg）	喷雾	2	14		敌敌畏：0.1；氰戊菊酯：0.2

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
105	乐果＋氰戊菊酯	dimethoate＋fenvalerate	25%乳油（乐果 22.8%＋氰戊菊酯 2.2%）	小麦	蚜虫	48 mL～60 mL	喷雾	3	21		乐果：0.05；氰戊菊酯：2
106	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐＋毒死蜱	emamectin benzoate＋chlorpyrifos	40%水乳剂（甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.4%＋毒死蜱 39.6%）	水稻	二化螟	20 mL～30 mL	喷雾	3	21		甲氨基阿维菌素苯甲酸盐：0.02（糙米）；毒死蜱：0.5（稻谷）
107	杀螟硫磷＋辛硫磷	fenitrothion＋phoxim	46%乳油（杀螟硫磷 30%＋辛硫磷 16%）	棉花	棉铃虫	40 mL～50 mL	喷雾	1	30		杀螟硫磷：0.1（棉籽）
108	仲丁威＋稻丰散	fenobucarb＋phenthoate	40%乳油（稻丰散 18%＋仲丁威 22%）	节瓜	蓟马	75 mL～150 mL	喷雾	3	7		仲丁威：0.05；稻丰散：0.1
109	甲氰菊酯＋马拉硫磷	fenpropathrin＋malathion	40%乳油（甲氰菊酯 5%＋马拉硫磷 35%）	苹果	桃小食心虫	1 000～2 000 倍液（200 mg/L～400 mg/L）	喷雾	3	14		甲氰菊酯：5；马拉硫磷：2
110	甲氰菊酯＋氧乐果	fenpropathrin＋omethoate	20%乳油（甲氰菊酯 15%＋氧乐果 5%）	小麦	麦蚜	50 mL～75 mL	喷雾	1	14		甲氰菊酯：0.1；氧乐果：0.02
			30%乳油（甲氰菊酯 8%＋氧乐果 22%）	大豆	食心虫	60 mL～80 mL	喷雾	2	14		甲氰菊酯：0.1；氧乐果：0.05

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
111	唑螨酯＋炔螨特	fenpyroximate＋propargite	13%水乳剂（唑螨酯 3%＋克螨特 10%）	柑橘	红蜘蛛	1 000～1 500 倍液（86.7 mg/L～130 mg/L）	喷雾	2	14		唑螨酯：0.2；炔螨特：5
112	氰戊菊酯＋杀螟硫磷	fenvalerate＋fenitrothion	20%乳油（杀螟硫磷 14%＋氰戊菊酯 6%）	甘蓝	菜青虫、蚜虫	30 mL～60 mL	喷雾	2	14		氰戊菊酯：0.5；杀螟硫磷：0.2
113	氰戊菊酯＋马拉硫磷	fenvalerate＋malathion	21%乳油（氰戊菊酯 6%＋马拉硫磷 15%）	花生	斜纹夜蛾	20 mL～40 mL	喷雾	3	21		氰戊菊酯：0.1
114	氰戊菊酯＋氧乐果	fenvalerate＋omethoate	30%乳油（氰戊菊酯 3%＋氧乐果 27%）	大豆	蚜虫	30 mL～40 mL	喷雾	2	21		氰戊菊酯：0.1；氧乐果：0.05
115	氟铃脲＋辛硫磷	hexaflumuron＋phoxim	15%乳油（氟铃脲 2%＋辛硫磷 13%）	棉花	棉铃虫	80 mL～100 mL	喷雾	1	21		
116	吡虫啉＋异丙威	imidacloprid＋isoprocarb	35%可湿性粉剂（吡虫啉 3%＋异丙威 32%）	水稻	稻飞虱	20 g～25 g	喷雾	2	14		吡虫啉：0.05（糙米）；异丙威：0.2（大米）
117	吡虫啉＋杀虫单	imidacloprid＋monosultap	70%可湿性粉剂（吡虫啉 2%＋杀虫单 68%）	水稻	稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟	42 g～72 g	喷雾	1	21		吡虫啉：0.05（糙米）；杀虫单：0.5（糙米）

表 1（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最大残留限量（MRL）/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
118	甲基异柳磷＋福美双	isofenphos-methyl＋thiram	15％悬浮种衣剂（甲基异柳磷 5％＋福美双 10％）	玉米	地下害虫、茎基腐病	1∶40～1∶50（药种比）	拌种	1	—		甲基异柳磷：0.02；福美双：0.1
119	马拉硫磷＋辛硫磷	malathion＋phoxim	25％乳油（马拉硫磷 12.5％＋辛硫磷 12.5％）	大蒜	根蛆	750 mL～1 000 mL	灌根	1	21		马拉硫磷：0.5；辛硫磷：0.1
120	马拉硫磷＋敌百虫	malathion＋trichlorfon	60％乳油（敌百虫 40％＋马拉硫磷 20％）	棉花	蚜虫	50 mL～75 mL	喷雾	2	21		敌百虫：0.1（棉籽）
121	苦参碱＋烟碱	matrine＋nicotine	0.5％水剂（烟碱 0.45％＋苦参碱 0.05％）	柑橘	矢尖蚧	500～1 000 倍液（5 mg/L～10 mg/L）	喷雾	3	14		烟碱：0.2
			1.2％乳油（烟碱 0.7％＋苦参碱 0.5％）	甘蓝	菜青虫	40 mL～50 mL	喷雾	3	7		烟碱：0.2
122	甲拌磷＋辛硫磷	phorate＋phoxim	10％粉粒剂（甲拌磷 4％＋辛硫磷 6％）	大豆	地下害虫	600 g～750 g	撒毒土	1	—	播种后拌毒土撒施	甲拌磷：0.05；辛硫磷：0.05
123	辛硫磷＋哒螨灵	phoxim＋pyridaben	29％乳油（辛硫磷 25％＋哒螨灵 4％）	柑橘	红蜘蛛	1 500～2 000 倍液（145 mg/kg～193 mg/kg）	喷雾	2	14		辛硫磷：0.05；哒螨灵：2
124	三唑磷＋敌百虫	triazophos＋trichlorfon	36％乳油（三唑磷 6％＋敌百虫 30％）	水稻	二化螟	150 mL～180 mL	喷雾	2	28		三唑磷：0.05（稻谷）；敌百虫：0.1（糙米）

3.2 杀菌剂/杀线虫剂

杀菌剂/杀线虫剂见表2，最大残留限量按GB 2763执行。

表2 杀菌剂/杀线虫剂

序号	农药			适用作物	防治对象	每667 m^2每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
1	代森铵	amobam	45%水剂	苹果	腐烂病、枝干轮纹病	100～200倍液（2 250 mg/L～4 500 mg/L）	枝干涂抹	1	—		5
2	嘧菌酯	azoxystrobin	25%悬浮剂	黄瓜	霜霉病	32 mL～48 mL	喷雾	3	3		0.5
				荔枝	霜疫霉病	1 250～1 667倍液（150 mg/L～200 mg/L）	喷雾	3	14		0.5
				芒果	炭疽病	1 250～1 667倍液（150 mg/L～200 mg/L）	喷雾	3	14		1
				葡萄	霜霉病	1 000～2 000倍液（125 mg/L～250 mg/L）	喷雾	3	14		5
				西瓜	炭疽病	833～1 667倍液（150 mg/L～300 mg/L）	喷雾	3	14		1
				香蕉	炭疽病	1 000～1 500倍液（166.7 mg/L～250 mg/L）	喷雾	3	42		2
				柑橘	疮痂病、炭疽病	833倍液（300 mg/L）	喷雾	3	14		1

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
3	苯菌灵	benomyl	50%可湿性粉剂	柑橘	疮痂病	500～1 000 倍液（500 mg/L～1 000 mg/L）	喷雾	2	14		5
				梨	黑星病	500～1 000 倍液（500 mg/L～667 mg/L）	喷雾	3	14		3
				香蕉	叶斑病	600～800 倍液（625 mg/L～833 mg/L）	喷雾	3	21		
4	噻霉酮	benziothiazolinone	1.5%水乳剂	黄瓜	霜霉病	116 mL～175 mL	喷雾	3	3		0.1
5	啶酰菌胺	boscalid	50%水分散粒剂	草莓（室内/室外）	灰霉病	30 g～45 g	喷雾	3	3		3
6	溴菌腈	bromothal-onil	25%可湿性粉剂	苹果	炭疽病	500～600 倍液（416.7 mg/L～500 mg/L）	喷雾	3	14		0.2
7	溴硝醇	bronopol	20%可湿性粉剂	水稻	恶苗病	240 倍液（833 mg/L）	浸种	1	—		
8	克菌丹	captan	50%可湿性粉剂	黄瓜	炭疽病	125 g～187.5 g	喷雾	3	3		5
				苹果	轮纹病	400～800 倍液（625 mg/L～1 250 mg/L）	喷雾	3	14		15
				葡萄	霜霉病	400～600 倍液（833 mg/L～1 250 mg/L）	喷雾	3	7		5
			80%水分散粒剂	柑橘	树脂病	600～800 倍液（1 000 mg/L～1 333 mg/L）	喷雾	3	14		5

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m² 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
9	多菌灵	carbendazim	50%可湿性粉剂	小麦	赤霉病	100 g	喷雾	1	35		0.05
				油菜	菌核病	80 g～120 g	喷雾	2	38		0.1(油菜籽)
10	氯溴异氰尿酸	chloroisobromine cyanuric acid	50%可溶性粉剂	烟草	野火病	60 g～80 g	喷雾	3	21		
11	氯化苦	chloropicrin	99%原药	茄子	黄萎病	13.3 L/667 m²～20 L/667 m²（2 mL/注射点～3 mL/注射点）	注射于土壤中	1	—	注射点间距离 30 cm	
			99.5%液剂	草莓	黄枯萎病	13.3 L/667 m²～20 L/667 m²（2 mL/注射点～3 mL/注射点）	注射于土壤中	1	—	注射点间距离 30 cm	
				生姜	姜瘟病	13.3 L/667 m²～20 L/667 m²（2 mL/注射点～3 mL/注射点）	注射于土壤中	1	—	注射点间距离 30 cm	
				甜瓜	枯、黄萎病	13.3 L/667 m²～20 L/667 m²（2 mL/注射点～3 mL/注射点）	注射于土壤中	1	—	注射点间距离 30 cm	
12	百菌清	chlorothalonil	75%可湿性粉剂	西瓜	霜霉病	146.7 g～266.7 g	喷雾	3	14		5
13	丁香菌酯	coumoxystrobin	20%悬浮剂	苹果	腐烂病	133.3～200 倍液（1 000 mg/L～1 500 mg/L）	枝干涂抹	1	—	早春苹果开花前	

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
14	氰霜唑	cyazofamid	10%悬浮剂	黄瓜	霜霉病	53.3 mL～66.67 mL	喷雾	3	3		
				荔枝	霜霉病	2 000～2 500 倍液（40 mg/L～50 mg/L）	喷雾	3	7		
				马铃薯	晚疫病	2 000～2 500 倍液（40 mg/L～50 mg/L）	喷雾	3	7		
				葡萄	霜霉病	2 000～2 500 倍液（40 mg/L～50 mg/L）	喷雾	3	7		
15	苯醚甲环唑	difenoconazole	10%水分散粒剂	西瓜	炭疽病	50 g～75 g	喷雾	3	7		0.1
				茶叶	炭疽病	1 000～1 500 倍液（66.7 mg/L～100 mg/L）	喷雾	2	7		10
				荔枝	炭疽病	444～667 倍液（150 mg/L～225 mg/L）	喷雾	3	7		0.5
			20%微乳剂	西瓜	炭疽病	40 mL～60 mL	喷雾	3	7		0.1
			25%乳油	香蕉	黑星病、叶斑病	2 000～3 000 倍液（83.3 mg/L～125 mg/L）	喷雾	3	35		1
16	烯酰吗啉	dimethomorph	10%水乳剂	黄瓜	霜霉病	150 mL～200 mL	喷雾	3	3		5
			50%可湿性粉剂	葡萄	霜霉病	33 g～73 g	喷雾	3	7		5
				烟草	黑胫病	27 g～40 g	喷雾	3	21		

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
17	烯唑醇	diniconazole	10%乳油	梨	黑星病	2 000～3 000 倍液（33.3 mg/L～50 mg/L）	喷雾	2	21		0.1
			12.5%可湿性粉剂	柑橘	疮痂病	1 500～1 840 倍液（68 mg/L～83 mg/L）	喷雾	3	14		1
				芦笋	茎枯病	30 g～37.3 g	喷雾	3	3		0.5
				苹果	斑点落叶病	1 000 倍液～2 500 倍液（50 mg/L～125 mg/L）	喷雾	3	30		0.2
				葡萄	黑痘病、炭疽病	2 000～1 000 倍液（62.5 mg/L～125 mg/L）	喷雾	2	28		0.2
				香蕉	叶斑病	1 000～2 000 倍液（62.5 mg/L～125 mg/L）	喷雾	3	35		2
				小麦	白粉病	32 g～64 g	喷雾	2	35		0.2
18	二氰蒽醌	dithianon	22.7%悬浮剂	辣椒	炭疽病	83.4 mL	喷雾	3	7		2
19	氟环唑	epoxiconazole	12.5%悬浮剂	香蕉	叶斑病	833 倍液(150 mg/L)	喷雾	3	35		3
				小麦	锈病	48 mL～60 mL	喷雾	1	30		0.05
			7.5%乳油	香蕉	叶斑病	500 倍液(150 mg/L)	喷雾	3	35		3
20	乙嘧酚	ethirimol	25%悬浮剂	黄瓜	白粉病	800 倍液(312.5 mg/L)	喷雾	3	3		1
21	乙蒜素	ethylicin	20%乳油	水稻	稻瘟病	95 mL	喷雾	3	21		
			30%乳油	棉花	枯萎病	78.6 mL	喷雾	3	28		
			41%乳油	黄瓜	枯萎病、霜霉病、斑病	60 mL～75 mL	喷雾	2	3		

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
22	丁子香酚	eugenol	0.3%可溶性液剂	番茄	灰霉病	90 mL～120 mL	喷雾	3	5		
23	敌磺钠	fenaminosulf	50%可湿性粉剂	水稻	立枯病	2.0 mL/m^2～3.0 mL/m^2	喷雾	2	—	苗床使用	
24	腈苯唑	fenbuconazole	24%悬浮剂	水稻	稻曲病	40 mL～60 mL	喷雾	3	21		0.1(糙米)
25	三苯基氢氧化锡	fentin hydroxide	40%悬浮剂	马铃薯	晚疫病	115 mL～160 mL	喷雾	2	40		0.1
26	氟硅唑	flusilazole	40%乳油	葡萄	黑痘病	8 000～10 000 倍液（40 mg/L～50 mg/L）	喷雾	3	28		0.5
			8%微乳剂	黄瓜	白粉病	40 mL～60 mL	喷雾	3	3		1
27	粉唑醇	flutriafol	12.5%悬浮剂	小麦	锈病	30 mL～60 mL	喷雾	2	14		0.5
28	三乙膦酸铝	fosetyl-aluminium	80%可分散粒剂	烟草	黑胫病	375 g～400 g	喷雾	3	14		
29	己唑醇	hexaconazole	5%悬浮剂	葡萄	白粉病	1 500 倍液(33 mg/L)	喷雾	3	21		0.1
				番茄	灰霉病	66.7 mL～200 mL	喷雾	3	7		0.5
30	噁霉灵	hymexazol	70%可溶粉剂	西瓜	枯萎病	1 400～1 842 倍液（380 mg/L～500 mg/L）	灌根	2	14		0.5
31	抑霉唑	imazalil	0.1%涂抹剂	柑橘	绿霉病、青霉病	1 mL/kg 柑橘（有效成分 1 mg/kg 柑橘）	涂果	1	14	采后处理	5

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
32	亚胺唑	imibenconazole	5%可湿性粉剂	苹果	斑点落叶病	600～700 倍液（71.4 mg/L～83.3 mg/L）	喷雾	3	14		1
				葡萄	黑痘病	600～800 倍液（62.5 mg/L～83.3 mg/L）	喷雾	3	14		3
				青梅	黑星病	600～800 倍液（62.5 mg/L～83.3 mg/L）	喷雾	3	21		3
33	双胍三辛烷基苯磺酸盐	iminoctadine tris（albesilate）	40%可湿性粉剂	黄瓜	白粉病	1 000～2 000 倍液（200 mg/L～400 mg/L）	喷雾	3	3		2
				葡萄	灰霉病	30 g～50 g	喷雾	2	7		1
				西瓜	蔓枯病	800～1 000 倍液（400 mg/L～500 mg/L）	喷雾	3	5		0.2
34	异菌脲	iprodione	10%乳油	苹果	斑点落叶病	500～600 倍液（166 mg/L～200 mg/L）	喷雾	3	14		5
			25%悬浮剂	番茄	灰霉病	100 mL～200 mL	喷雾	3	5		5
			50%可湿性粉剂	葡萄	灰霉病	750～1 000 倍液（500 mg/L～666 mg/L）	喷雾	3	14		10
35	稻瘟灵	isoprothiolane	18%微乳剂	水稻	稻瘟病	177.6 mL～259 mL	喷雾	2	35		1(大米)

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
36	醚菌酯	kresoxim-methyl	30%可湿性粉剂	草莓	白粉病	15 g～40 g	喷雾	3	5		2
				黄瓜	白粉病	27.5 g～35 g	喷雾	2	3		0.5
			50%水分散粒剂	草莓	白粉病	5 000～3 000 倍液（100 mg/L～166.7 mg/L）	喷雾	3	5		2
				黄瓜	白粉病	13.3 g～20 g	喷雾	3	3		0.5
				苹果	黑星病	3 000 倍液(166.7 mg/L)	喷雾	3	14		0.2
37	代森锰锌	mancozeb	75%干悬浮剂	苹果	轮纹病	600～1 000 倍液（750 mg/L～1250 mg/L）	喷雾	3	14		5
			80%可湿性粉剂	大枣	锈病	600～800 倍液（1 000 mg/L～1 333 mg/L）	喷雾	3	21		2
				柑橘	炭疽病	400～600 倍液（1 333 mg/L～2 000 mg/L）	喷雾	3	21		3
38	苦参碱	matrine	0.3%乳油	黄瓜	霜霉病	120 mL～180 mL	喷雾	3	3		
39	代森联	polyram	70%干悬浮剂	苹果	斑点落叶病、轮纹病、炭疽病	300 倍液（2 333 mg/L）	喷雾	3	28		5
40	盐酸吗啉胍	moroxydine hydrochloride	20%可湿性粉剂	番茄	病毒病	234.3 g～468.7 g	喷雾	3	5		

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
41	腈菌唑	myclobutanil	12.5%乳油	梨	黑星病	2 000～3 000 倍液（42 mg/L～62.5 mg/L）	喷雾	3	14		0.5
			25%乳油	香蕉	叶斑病	800～1 000 倍液（250 mg/L～312.5 mg/L）	喷雾	3	21		2
				小麦	白粉病	8 mL～16 mL	喷雾	2	21		0.1
			40%可湿性粉剂	黄瓜	白粉病	7.5 g～10 g	喷雾	3	3		1
				葡萄	炭疽病	4 000～6 000 倍液（66.7 mg/L～100 mg/L）	喷雾	3	21		1
42	宁南霉素	ningnanmycin	2%水剂	水稻	条纹叶枯病	333.3 mL～500 mL	喷雾	3	45		
			8%水剂	烟草	病毒病	62.5 mL～93.75 mL	喷雾	3	21		
43	喹啉铜	oxine-copper	33.5%悬浮剂	黄瓜	霜霉病	60 mL～80 mL	喷雾	3	3		2
			50%可湿性粉剂	苹果	轮纹病	3 000～4 000 倍液（125 mg/L～166.7 mg/L）	喷雾	3	14		2
44	多抗霉素	polyoxin	3%水剂	苹果	斑点落叶病	400 倍液(75 mg/L)	喷雾	3	7		
				烟草	赤星病	100 mL～300 mL	喷雾	3	21		

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
45	咪鲜胺	prochloraz	25%乳油	大蒜	叶枯病	60 mL～120 mL	喷雾	3	45		0.1
				荔枝	炭疽病	1 000～1 200 倍液（208.3 mg/L～250 mg/L）	喷雾	3	14		2
				苹果	炭疽病	750～1 000 倍液（250 mg/L～333.3 mg/L）	喷雾	3	14		2
				小麦	白粉病、赤霉病	30 mL～60 mL	喷雾	2	45		0.5
				柑橘	蒂腐病、绿霉病、青霉病、炭疽病	500～1 000 倍液（250 mg/L～500 mg/L）	浸果	1	14	采后处理	5
				香蕉	炭疽病	500～1 000 倍液（250 mg/L～500 mg/L）	浸果	1	14	采后处理	5
			45%微乳剂	柑橘	蒂腐病、黑腐病、绿霉病、青霉病	1 000～2 000 倍液（225 mg/L～450 mg/L）	浸果	1	14	采后处理	5
			45%水乳剂	柑橘	蒂腐病、绿霉病、青霉病、炭疽病	1 000～2 000 倍液（225 mg/L～450 mg/L）	浸果	1	14	采后处理	5

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
46	咪鲜胺锰盐	prochloraz-manganese chloride complex	50%可湿性粉剂	大蒜	叶枯病	30 g～60 g	喷雾	3	45		0.1
				蘑菇	褐腐病	0.8 g/(m^2 · 次)～1.2g/(m^2 · 次)	拌土	1	21		2
				葡萄	炭疽病	1 500～3 000 倍液（333.3 mg/L～166.7 mg/L）	喷雾	2	7		2
				辣椒	灰霉病	75 g～150 g	喷雾	3	7		2
				烟草	赤星病	35.1 g～46.7 g	喷雾	3	14		
47	腐霉利	procymi-done	50%可湿性粉剂	番茄	灰霉病	50 g	喷雾	2	5		2
48	丙环唑	propicon-azol	20%微乳剂	香蕉	叶斑病	400～800 倍液（250 mg/L～500 mg/L）	喷雾	2	60		1
			40%微乳剂	香蕉	叶斑病	1 000～1 500 倍液（266.7 mg/L～400 mg/L）	喷雾	2	60		1
			25%乳油	水稻	纹枯病	30 mL～60 mL	喷雾	2	42		0.1(糙米)
49	丙森锌	propineb	70%可湿性粉剂	大白菜	霜霉病	150 g～214 g	喷雾	3	21		5
				柑橘	炭疽病	600～800 倍液（875 mg/L～1 167 mg/L）	喷雾	3	21		
				苹果	斑点落叶病	600～700 倍液（1 000 mg/L～1 166.7 mg/L）	喷雾	3	14		5
				葡萄	霜霉病	400～600 倍液（1167 mg/L～1750 mg/L）	喷雾	3	14		5

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
50	吡唑醚菌酯	pyraclostrobin	25%乳油	黄瓜	白粉病、霜霉病	20 mL～40 mL	喷雾	3	3		0.5
				大白菜	炭疽病	30 mL～50 mL	喷雾	3	7		5
				西瓜	炭疽病	15 mL～30 mL	喷雾	3	7		0.5
51	嘧霉胺	pyrimethanil	40%悬浮剂	葡萄	灰霉病	1 000～1 500 倍液（233 mg/L～400 mg/L）	喷雾	2	7		4
			70%水分散粒剂	番茄	灰霉病	45 g～55 g	喷雾	3	5		1
52	戊唑醇	tebuconazole	25%乳油	苹果	斑点落叶病	3 000 倍液(83.3 mg/L)	喷雾	3	21		2
			25%水乳剂	花生	叶斑病	1 500～2 000 倍液（125 mg/L～166.7 mg/L）	喷雾	3	21		0.1
				小麦	锈病	25 mL～33.3 mL	喷雾	2	28		0.05
			43%悬浮剂	苹果	斑点落叶病	5 000～7 000 倍液（61.4 mg/L～86 mg/L）	喷雾	3	21		2
				水稻	稻曲病、纹枯病	9 mL～15 mL	喷雾	3	21		0.5(糙米)
			80%可湿性粉剂	小麦	锈病、白粉病	5 g～8 g	喷雾	2	28		0.05
53	四氟醚唑	tetraconazole	4%水乳剂	草莓	白粉病	50 mL～83.3 mL	喷雾	3	7		

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
54	噻菌灵	thiabenda-zole	40%可湿性粉剂	蘑菇	褐腐病	667 g	土床喷雾	1	14		5(鲜)
			50%悬浮剂	蘑菇	褐腐病	400～667 倍液（900 mg/L～1 250 mg/L）	拌料	1	21	菌丝生长期喷施于段木剖面上(施药间隔 30 d)	5(鲜)
55	噻菌铜	thiodiazole-copper	20%悬浮剂	烟草	野火病	500 倍液(400 mg/L)	喷雾	3	21		
56	甲基硫菌灵	thiophanate-methyl	70%可湿性粉剂	西瓜	炭疽病	50 g～80 g	喷雾	3	14		2
57	三唑醇	triadimenol	15%可湿性粉剂	水稻	稻曲病	466 g～933 g	喷雾	3	35		0.05(糙米)
				小麦	白粉病	50 g～60 g	喷雾	2	21		0.2
58	三氯异氰尿酸	trichloroiso cyanuric acid	36%可湿性粉剂	棉花	黄萎病、枯萎病	80 g～100 g	喷雾	3	14		
				水稻	白叶枯病、细菌性条斑病	60 g～90 g	喷雾	3	14		
59	代森锌	zineb	65%可湿性粉剂	芦笋	茎枯病	120 g～150 g	喷雾	3	7		2
				马铃薯	早疫病、晚疫病	98.5 g～123.1 g	喷雾	2	21		0.5

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
60	福美锌	ziram	72%可湿性粉剂	苹果	炭疽病	400～600 倍液（1 200 mg/L～1 800 mg/L）	喷雾	3	14		5
61	申嗪霉素	无	1%悬浮剂	辣椒	疫病	50 mL～120 mL	喷雾	3	7		
				水稻	纹枯病	50 mL～70 mL	喷雾	2	14		
62	辛菌胺醋酸盐	无	1.8%水剂	苹果	腐烂病	1 000 mg/L～2 000 mg/L	喷雾	3	14		
63	烯肟菌胺	xiwojunan	5%乳油	小麦	白粉病	54 mL～106 mL	喷雾	2	30		0.1
64	啶酰菌胺＋醚菌酯	boscalid＋kresoxim-methyl	30%悬浮剂（啶酰菌胺 20%＋醚菌酯 10%）	黄瓜	白粉病	45 mL～60 mL	喷雾	3	3		啶酰菌胺：5；醚菌酯：0.5
				苹果	白粉病	2 000～4 000 倍液（75 mg/L～150 mg/L）	喷雾	3	14		啶酰菌胺：2；醚菌酯：0.2
65	多菌灵＋毒死蜱＋福美双	carbendazim＋chlorprifos＋thiram	25%悬浮种衣剂（多菌灵 6%＋毒死蜱 7%＋福美双 12%）	花生	地下害虫、根腐病	17 g/kg～20 g/kg 种子	种子包衣	1	—		多菌灵：0.1；毒死蜱：0.2；
			38%悬浮种衣剂（多菌灵 10%＋毒死蜱 8%＋福美双 20%）	大豆	地下害虫、根腐病	16.7 g/kg～25 g/kg 种子	种子包衣	1	—		多菌灵：0.2；毒死蜱：0.1；福美双：3

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
66	多菌灵＋乙霉威	carbendazim＋diethofen-carb	50％可湿性粉剂（多菌灵 25％＋乙霉威 25％）	番茄	灰霉病	150 g	喷雾	3	7		多菌灵：3；乙霉威：1
67	多菌灵＋烯肟菌酯	carbendazim＋enstrobnin	28％可湿性粉剂（多菌灵 21％＋烯肟菌酯 7％）	小麦	赤霉病	47.6 g～95.2 g	喷雾	2	21		多菌灵：0.05；烯肟菌酯：0.1
68	多菌灵＋氟硅唑	carbendazim＋flusilazole	21％悬浮剂（氟硅唑 5％＋多菌灵 16％）	梨	黑星病	2 000～3 000 倍液（105 mg/L～70 mg/L）	喷雾	2	21		多菌灵：3；氟硅唑：0.2
69	多菌灵＋井冈霉素 A	carbendazim＋jingangmycin A	28％悬浮剂（多菌灵 24％＋井冈霉素 A4％）	小麦	纹枯病	42 mL～56 mL	喷雾	3	21		多菌灵：0.05
70	多菌灵＋咪鲜胺	carbendazim＋prochloraz	25％可湿性粉剂（多菌灵 12.5％＋咪鲜胺 12.5％）	芒果	炭疽病	600 倍液（416.7 mg/L）	喷雾	3	14		多菌灵：0.5；咪鲜胺：2
				西瓜	炭疽病	75 g～100 g	喷雾	3	14		多菌灵：0.5；咪鲜胺：0.1
71	多菌灵＋丙环唑	carbendazim＋propiconazol	25％悬浮剂（丙环唑 11.4％＋多菌灵 13.6％）	香蕉	叶斑病	800～1 200 倍液（208.33 mg/L～312.5 mg/L）	喷雾	2	60		多菌灵：0.1；丙环唑：1

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
72	多菌灵＋甲基立枯磷	carbendazim＋tolclofos-methyl	40％可湿性粉剂（多菌灵 25％＋甲基立枯磷 15％）	水稻	立枯病、苗期叶稻瘟病	150 g～300 g	喷雾	2	60		多菌灵：2（大米）；甲基立枯磷：0.05（糙米）
73	克百威＋福美双	carbofuran＋thiram	15％悬浮种衣剂（克百威 7％＋福美双 8％）	花生	立枯病、蛴螬	133 g/kg～167 g/kg 种子	拌种	1	—		克百威：0.2
74	百菌清＋双炔酰菌胺	chlorothalonil＋mandipropamid	44％悬浮剂（百菌清（40％＋双炔酰菌胺 4％）	黄瓜	霜霉病	110 mL～150 mL	喷雾	2	3		百菌清：5
75	王铜＋春雷霉素	copper oxychloride＋kasugamycin	47％可湿性粉剂（春雷霉素 2％＋王铜 45％）	荔枝	霜疫霉病	600～800 倍液（587.5mg/L～783.3 mg/L）	喷雾	3	7		春雷霉素：0.05
76	霜脲氰＋代森锰锌	cymoxanil＋mancozeb	72％可湿性粉剂（霜脲氰 8％＋代森锰锌 64％）	马铃薯	晚疫病	107 g～150 g	喷雾	3	14		霜脲氰：0.5；代森锰锌：0.5
77	乙霉威＋甲基硫菌灵	diethofencarb＋thiophanate-methyl	65％可湿性粉剂（乙霉威 12.5％＋甲基硫菌灵 52.5％）	番茄	灰霉病	46.6 g～70 g	喷雾	3	7		乙霉威：1；甲基硫菌灵：3

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
78	苯醚甲环唑＋丙环唑	difenoconazole＋propiconazol	30%乳油（苯醚甲环唑 15%＋丙环唑 15%）	水稻	纹枯病	北方：20 mL； 南方：15 mL	喷雾	2	40		苯醚甲环唑：0.5（糙米）；丙环唑：0.1（糙米）
79	烯酰吗啉＋代森锰锌	dimethomorph＋mancozeb	69%可湿性粉剂（烯酰吗啉 9%＋代森锰锌 60%）	葡萄	霜霉病	139.4 g～166.7 g	喷雾	3	14		烯酰吗啉：5；代森锰锌：5
80	烯酰吗啉＋吡唑醚菌酯	dimethomorph＋pyraclostrobin	18.7%水分散粒剂（烯酰吗啉 12%＋吡唑醚菌酯 6.7%）	马铃薯	晚疫病	75 g～125 g	喷雾	3	14		烯酰吗啉：0.05；吡唑醚菌酯：0.02
				甘蓝	霜霉病	75 g～125 g	喷雾	2	14		烯酰吗啉：2；吡唑醚菌酯：0.5
				黄瓜	霜霉病	75 g～125 g	喷雾	3	3		烯酰吗啉：5；吡唑醚菌酯：0.5
				甜瓜	霜霉病	75 g～125 g	喷雾	3	5		烯酰吗啉：0.5；吡唑醚菌酯：0.5
81	二氰蒽醌＋代森锰锌	dithianon＋mancozeb	65%可湿性粉剂（二氰蒽醌 5%＋代森锰锌 60%）	梨	黑星病	500～750 倍液（867 mg/L～1 300 mg/L）	喷雾	3	21		二氰蒽醌：2；代森锰锌：5

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
82	烯肟菌酯＋氟环唑	enstrobnin＋epoxiconazole	18%悬浮剂（烯肟菌酯 12%＋氟环唑 6%）	苹果	斑点落叶病	450～900 倍液（100 mg/L～200 mg/L）	喷雾	3	21		氟环唑：0.5
83	噁唑菌酮＋氟硅唑	famoxadone＋flusilazole	20.67% 乳油（氟硅唑 10%＋噁唑菌酮 10.67%）	苹果	轮纹病	2 000～3 000 倍液（68.7 mg/L～103.3 mg/L）	喷雾	2	21		噁唑菌酮：0.2；氟硅唑：0.2
				香蕉	叶斑病	1 000～1 500 倍液（138 mg/L～207 mg/L）	喷雾	2	42		噁唑菌酮：0.5；氟硅唑：1
84	噁唑菌酮＋代森锰锌	famoxadone＋mancozeb	68.75% 水分散粒剂（噁唑菌酮 6.25%＋代森锰锌 62.5%）	柑橘	疮痂病	1 000～1 500 倍液（458.3 mg/L～687.5 mg/L）	喷雾	3	21		噁唑菌酮：1；代森锰锌：3
				葡萄	霜霉病	800～1 200 倍液（572.9 mg/L～859.3mg/L）	喷雾	3	14		代森锰锌：5
				西瓜	炭疽病、霜霉病	44.9 g～56.3 g	喷雾	3	14		代森锰锌：1
85	噁霉灵＋稻瘟灵	hymexazol＋isoprothiolane	20%乳油（噁霉灵 10%＋稻瘟灵 10%）	烟草	立枯病	1 000～1 500 倍液（133 mg/L～200 mg/L）	喷雾	2	—	播种前喷洒苗床，移栽后再喷雾一次	
86	噁霉灵＋甲霜灵	hymexazol＋metalaxyl	3%水剂（噁霉灵 2.5%＋甲霜灵 0.5%）	黄瓜	枯萎病	500～700 倍液（42.8 mg/L～60 mg/L）	灌根	3	7		噁霉灵：0.5；甲霜灵：0.5

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
87	噁霉灵＋甲基硫菌灵	hymexazol＋thiophanate-methyl	56％可湿性粉剂（噁霉灵 16％＋甲基硫菌灵 40％）	西瓜	枯萎病	600～800 倍液（700 mg/L～933 mg/L）	灌根	2	21		噁霉灵：0.5；甲基硫菌灵：2
88	噁霉灵＋福美双	hymexazol＋thiram	68％可湿性粉剂（噁霉灵 8％＋福美双 60％）	黄瓜	枯萎病	800～1 000 倍液（680 mg/L～850 mg/L）	灌根	3	7		噁霉灵：0.5；福美双：5
89	异稻瘟净＋三环唑	iprobenfos＋tricyclazole	30％可湿性粉剂（异稻瘟净 22％＋三环唑 8％）	水稻	稻瘟病	80 g～120 g	喷雾	3	21		异稻瘟净：0.5（糙米）；三环唑：2（稻谷）
90	井冈霉素＋杀虫单	jingangmycin＋monosultap	32％可湿性粉剂（井冈霉素 10％＋杀虫单 22％）	水稻	稻纵卷叶螟、二化螟、纹枯病	150 g～200 g	喷雾	2	14		杀虫单：0.5（糙米）
91	代森锰锌＋甲霜灵	mancozeb＋metalaxyl	58％可湿性粉剂（甲霜灵 10％＋代森锰锌 48％）	荔枝	霜疫霉病	400 倍液（1 450 mg/L）	喷雾	3	14		代森锰锌：5；甲霜灵：0.5

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
92	代森锰锌＋精甲霜灵	mancozeb＋metalaxyl-M	68%水分散粒剂（精甲霜灵 4%＋代森锰锌 64%）	番茄	晚疫病	100 g～120 g	喷雾	3	7		代森锰锌：5；精甲霜灵：0.5
				烟草	黑胫病	100 g～120 g	喷雾	3	21		
				荔枝	霜霉病	600～800 倍液（850 mg/L～1 130 mg/L）	喷雾	3	7		代森锰锌：5；精甲霜灵：0.5
				马铃薯	晚疫病	100 g～120 g	喷雾	3	7		代森锰锌：0.5；精甲霜灵：0.05
				西瓜	疫病	100 g～120 g	喷雾	3	7		代森锰锌：1；精甲霜灵：0.2
				葡萄	霜霉病	100 g～120 g	喷雾	3	14		代森锰锌：5；精甲霜灵：1
93	甲霜灵＋福美双	metalaxyl＋thiram	3.3%粉剂（甲霜灵 0.9%＋福美双 2.4%）	水稻	立枯病	33 g/m^2	药土法	1	—	苗期用药	甲霜灵：0.1（糙米）
			58%可湿性粉剂（甲霜灵 8%＋福美双 50%）	荔枝	霜疫霉病	600～800 倍液（725 mg/L～966.7 mg/L）	喷雾	3	7		甲霜灵：0.5

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
94	代森联＋吡唑醚菌酯	metriam＋pyraclostrobin	60%水分散粒剂（代森联55%＋吡唑醚菌酯5%）	辣椒	疫病	60 g	喷雾	3	5		代森联：1；吡唑醚菌酯：0.5
				马铃薯	晚疫病、早疫病	40 g～60 g	喷雾	3	14		代森联：0.5；吡唑醚菌酯：0.02
				苹果	斑点落叶病、轮纹病、炭疽病	1 000～2 000 倍液（300 mg/L～600 mg/L）	喷雾	3	14		代森联：5；吡唑醚菌酯：0.5
				甜瓜	霜霉病	60 g	喷雾	3	7		代森联：0.5；吡唑醚菌酯：0.5
				西瓜	疫病	60 g～90 g	喷雾	3	14		代森联：1；吡唑醚菌酯：0.5
				大白菜	炭疽病	60 g	喷雾	3	14		代森联：0.5；吡唑醚菌酯：5
				柑橘	疮痂病	1 000～2 000 倍液（300 mg/L～600 mg/L）	喷雾	3	21		代森联：3
95	咪鲜胺＋丙环唑	prochloraz＋propiconazol	49%乳油（咪鲜胺40%＋丙环唑9%）	水稻	纹枯病	30 mL～40 mL	喷雾	3	28		咪鲜胺：0.5（稻谷）；丙环唑：0.1（糙米）

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
96	咪鲜胺＋戊唑醇	prochloraz＋tebuconazole	40%水乳剂（咪鲜胺 26.7%＋戊唑醇 13.3%）	小麦	赤霉病	20 mL～25 mL	喷雾	2	28		咪鲜胺：0.5；戊唑醇：0.05
97	咪鲜胺锰盐＋三环唑	prochloraz-manganese chloride complex＋tricyclazole	28%可湿性粉剂（咪鲜胺锰盐 14% ＋ 三环唑 14%）	菜苔	炭疽病	62.57 g～125.14 g	喷雾	3	14		咪鲜胺锰盐：2；三环唑：2
98	嘧霉胺＋福美双	pyrimethanil＋thiram	30%悬浮剂（嘧霉胺 6%＋福美双 24%）	番茄	灰霉病	107.1 mL～150 mL	喷雾	3	7		嘧霉胺：1；福美双：5
99	硫磺＋三环唑	sulfur＋tricyclazole	40%悬浮剂（三环唑 20%＋硫磺 20%）	水稻	稻瘟病	150 mL～200 mL	喷雾	3	21		三环唑：2（稻谷）
100	戊唑醇＋烯肟菌胺	tebuconazole＋xiwojunan	20%悬浮剂（戊唑醇 10%＋烯肟菌胺 10%）	小麦	锈病	13.3 mL～20 mL	喷雾	2	21		戊唑醇：0.05；烯肟菌胺：0.1

表 2（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
101	甲基硫菌灵＋福美双＋硫磺	thiophanate-methyl＋thiram＋sulfur	45%悬浮剂（福美双 9%＋甲基硫菌灵 16%＋硫磺 20%）	苹果	轮纹病	600～700 倍液（750 mg/L～642 mg/L）	喷雾	3	21		甲基硫菌灵：3；福美双：5
102	福美双＋五氯硝基苯	thiram＋quintozene	20%粉剂（福美双 10%＋五氯硝基苯 10%）	西瓜	枯萎病	2.25 g/kg～3 g/kg 种子	拌种	1	—		五氯硝基苯：0.02
			40%粉剂（福美双 20%＋五氯硝基苯 20%）	棉花	红腐病、苗期立枯病、炭疽病	5 g/kg～10 g/kg 种子	拌种	1	—		五氯硝基苯：0.01（棉籽油）
103	福美双＋啶菌噁唑	thiram＋无	40%悬乳剂（福美双 32%＋啶菌噁唑 8%）	番茄	灰霉病	67 g～100 g	喷雾	3	7		福美双：5

3.3 除草剂/植物生长调节剂

除草剂/植物生长调节剂见表 3，最大残留限量按 GB 2763 执行。

表 3　除草剂/植物生长调节剂

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
1	萘乙酸	1-naphthyl-acetic acid	0.6%水剂	棉花	调节生长	2 000～2 500 倍液（2.4 mg/L～3 mg/L）	喷雾	2	—	盛花期施用	0.05(棉籽)
			1%水剂	小麦	调节生长	3 000～5 000 倍液（2 mg/L～3.3 mg/L）	喷雾	2	—	拔节期施用	0.05
			20%粉剂	苹果	调节生长	8 000～10 000 倍液（20 mg/L～25 mg/L）	喷雾	2	30		0.1
2	2,4-滴二甲胺盐	2,4-D dimethyl-amine salt	55%水剂	小麦	一年生阔叶杂草	120 mL～150 mL	喷雾	1	—	四叶前到分蘖末期施用	
3	乙草胺	acetochlor	40%可湿性粉剂	水稻	一年生杂草	15 g～20 g	毒土法	1	—	移栽后 5 d～7 d 施用，可拌尿素	0.05(糙米)
			90%乳油	玉米	一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草	100 mL～155 mL	喷雾	1	—	播后苗前施用	0.05
4	莠灭净	ametryn	80%可湿性粉剂	菠萝	一年生禾本科杂草	120 g～150 g	喷雾	1	—	定向喷雾	0.2
5	酰嘧磺隆	amidosulfu-ron	50%水分散粒剂	小麦	阔叶杂草	3 g～4 g	喷雾	1	—	杂草 2～4 叶期施用	0.01
6	莎稗磷	anilofos	30%乳油	水稻	稗草、莎草	南方：50 mL～60 mL；北方：60 mL～70 mL	毒土法	1	—	移栽后 7 d～10 d 施用	

表 3（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
7	莠去津	atrazine	90%水分散粒剂	玉米	马唐、稗草、狗尾草	110 g～130 g	喷雾	1	—	播后苗前施用	0.05
8	四唑嘧磺隆	azimsulfuron	50%水分散粒剂	水稻	稗草	1.33 g～2.67 g	毒土法	1	—	移栽后 5 d～7 d 施用	
9	草除灵	benazolin-ethyl	15%乳油	甘蓝型油菜	一年生杂草	100 mL～140 mL	喷雾	1	—	油菜移栽活棵后施用	0.2(油菜籽)
10	苄嘧磺隆	bensulfuron-methyl	32%可湿性粉剂	小麦	阔叶杂草	10 g～12 g	喷雾	1	—	小麦生长期(3～6 叶期)施药	0.02
				水稻	阔叶杂草及莎草	10 g～15 g	喷雾	1	—	移栽后 5 d～7 d 施用	0.05(糙米)
			32%水分散粒剂	水稻	一年生及部分多年生莎草、阔叶杂草	10 g～15 g	毒土法	1	—	移栽后 5 d～7 d 施用	0.05(糙米)
11	双草醚	bispyribac-sodium	20%可湿性粉剂	水稻	杂草	南方：10 mL～15 mL	喷雾	1	—		
12	辛酰溴苯腈	bromoxynil octanoate	25%乳油	玉米	一年生阔叶杂草	夏玉米：70 mL～100 mL；春玉米：100 mL～140 mL	茎叶喷雾	1	—	玉米 3～4 叶期施用	

表 3（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
13	矮壮素	chlormequat	80%可溶性粉剂	小麦	调节生长	400～533 倍液（1 500 mg/L～2 000 mg/L）	喷雾	1	—	小麦拔节期全株施药	5
				棉花	调节生长	12 000～15 000 倍液（53.3 mg/L～66.7 mg/L）	喷雾	3	30	于棉花初花期、盛花期、结铃期施用	0.5(棉籽)
14	异噁草松	clomazone	48%乳油	大豆	一年生杂草	73 mL～80 mL	喷雾	1	—	大豆 2～3 片复叶期施用	0.05
15	二氯吡啶酸	clopyralid	30%水剂	油菜	一年生、多年生阔叶杂草	30 mL～40 mL	喷雾	1	—	杂草 3～6 叶期施用	2(油菜籽)
				春小麦	一年生、多年生阔叶杂草	30 mL～40 mL	喷雾	1	—	杂草茎叶处理	2
16	单氰胺	cyanamide	50%水剂	葡萄	调节生长	10～20 倍液（25 000 mg/L～50 000 mg/L）	喷雾和涂抹	1	—	于休眠蔓枝自然发芽前 40 d～ 45 d 喷施	0.05
17	胺鲜酯	diethyl aminoethyl hexanoate	1.6%水剂	小白菜	调节生长	200～400 倍液（40 mg/L～80 mg/L）	喷雾	2	7	在小白菜 3～4 叶期第一次喷雾	
			8%可溶粉剂	白菜	调节生长	1 333～2 000 倍液（40 mg/L～60 mg/L）	喷雾	3	7	茎叶施药	

表 3（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
18	敌草快	diquat	20%水剂	水稻	调节生长	150 mL～200 mL	喷雾	1	5～7	水稻成熟后期	
19	苯磺隆	ethametsul-furon	10%可湿性粉剂	小麦	阔叶杂草	春小麦：12 g～18 g；冬小麦：6.7 g～15 g	喷雾	1	—	小麦 2～4 叶期至拔节前喷施	0.05
20	精噁唑禾草灵	fenoxaprop-P-ethyl	6.9%水乳剂	花生	一年生禾本科杂草	43 mL～60 mL	喷雾	1	—		0.1
				花椰菜	一年生禾本科杂草	50 mL～60 mL	喷雾	1	—		0.1
				棉花	一年生禾本科杂草	50 mL～60 mL	喷雾	1	—		0.02(棉籽)
			8.05%乳油	花生	一年生禾本科杂草	35 mL～50 mL	喷雾	1	—		0.1
21	四唑草胺	fentrazamide	50%可湿性粉剂	水稻	禾本科、莎草科和阔叶杂草	抛秧：13.3 g～16 g；移栽：16 g～20 g	喷雾	1	—	稗草 1.5 叶期以前用药	
22	氟唑磺隆	flucarbazone-sodium	70%水分散粒剂	春小麦	一年生本科杂草及部分阔叶杂草	1.9 g～2.9 g	喷雾	1	—	春小麦 4 叶至 2 分蘖期施药	
23	丙炔氟草胺	flumioxazin	50%可湿性粉剂	柑橘	阔叶杂草	53 g～80 g	喷雾	1	—		0.05

表 3（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
24	乙羧氟草醚	fluoroglycofen-ethyl	10%乳油	大豆	一年生阔叶杂草	夏：40 mL～60 mL；春：60 mL～70 mL	喷雾	1	—	苗后 1～3 片复叶期施用	0.05
25	氟磺胺草醚	fomesafen	20%乳油	大豆	一年生阔叶杂草	70 mL～90 mL	喷雾	1	—		0.1
26	氯吡脲	forchlorfenuron	0.1%可溶性液剂	甜瓜	调节生长	50～100 倍液（10 mg/L～20 mg/L）	浸瓜胎	1	14		0.1
			0.5%可溶性水剂	西瓜	调节生长	500～667 倍液（7.5 mg/L～10 mg/L）	喷雾	1	—	喷瓜胎	0.1
27	草铵膦	glufosinate-ammonium	20%可溶液剂	番木瓜	一年生杂草	200 mL～300 mL	喷雾	1	14	定向喷雾	0.2
				茶叶		200 mL～300 mL	喷雾	1	10	定向喷雾	0.5
28	草甘膦	glyphosate	50%可溶性粉剂	苹果	一年生、多年生杂草	164 g～328 g	喷雾	1	—		0.5
29	草甘膦铵盐	glyphosate ammonium	77.7%可溶性粒剂	柑橘	一年生、多年生杂草	100 g～200 g	喷雾	1	—	杂草生长旺盛期施用	0.5
30	高效氟吡甲禾灵	haloxyfop-R-methyl	10.8%乳油	马铃薯	禾本科杂草	35 mL～50 mL	喷雾	1	—		
				大豆	芦苇等禾本科杂草	25 mL～50 mL	喷雾	1	—		0.1
				甘蓝	一年生禾本科杂草	30 mL～40 mL	喷雾	1	—	甘蓝移苗后施药	0.2
				棉花	一年生禾本科杂草	30 mL～40 mL	喷雾	1	—		0.2（棉籽）
				西瓜	一年生禾本科杂草	35 mL～50 mL	喷雾	1	—		

表 3（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
31	甲咪唑烟酸	imazapic	24%水剂	花生	一年生禾本科杂草、阔叶杂草及莎草	20 mL～30 mL	喷雾	1	—	于花生 1.5 复叶期施药，茎叶施药	0.1
32	咪唑喹啉酸	imazaquin	5%水剂	大豆	一年生阔叶杂草	150 mL～200 mL	喷雾	1	—		0.05
33	咪唑乙烟酸	imazethapyr	5%微乳剂	大豆	一年生杂草	100 mL～140 mL	喷雾	1	—	大豆苗前土壤喷雾。后茬避免种植对咪唑乙烟酸敏感作物（如甜菜、蔬菜、水稻等）	0.1
34	异丙隆	isoproturon	50%可湿性粉剂	小麦	杂草	125 g～200 g	喷雾	1	—		0.05
35	苯噻酰草胺	mefenacet	50%可湿性粉剂	水稻	一年生杂草	东北：65 g～80 g；其他：50 g～65 g	喷雾	1	—		0.05（糙米）
36	甲基二磺隆	mesosulfuron-methyl	3%油悬浮剂	小麦	一年生杂草	20 mL～35 mL	喷雾	1	—		0.02
37	硝磺草酮	mesotrione	10%悬浮剂	玉米	一年生阔叶杂草和部分禾本科杂草	100 mL～130 mL	喷雾	1	—		0.01

表 3（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
38	甲硫嘧磺隆	methiopyrsulfuron	10%可湿性粉剂	小麦	禾本科及阔叶杂草	15 g～20 g	喷雾	1	—	于小麦 4～5 叶期施药	
39	异丙甲草胺	metolachlor	72%乳油	烟草	一年生杂草	100 mL～150 mL	喷雾	1	—		
40	嗪草酮	metribuzin	70%可湿性粉剂	大豆	一年生阔叶杂草	60 g～70 g	喷雾	1	—	施后避免灌水和避开雨天	0.05
41	甲磺隆	metsulfuron-methyl	10%可湿性粉剂	小麦	一年生单、双子叶杂草	南方：5 g～8 g	喷雾	1	—	于播后苗前土壤喷雾，适用于南方稻麦轮作区	0.05
42	单嘧磺隆	monosulfuron	10%可湿性粉剂	小麦	一年生阔叶杂草	30 g～40 g	喷雾	1	—		
43	噁嗪草酮	oxaziclomefone	1%悬浮剂	水稻	一年杂草	267 mL～333 mL	兑水瓶甩或喷雾	1	—	于移栽田插秧后稗草 2 叶期前施药，保水层	0.05（糙米）
44	乙氧氟草醚	oxyfluorfen	24%乳油	大蒜	一年生杂草	40 mL～50 mL	喷雾	1	—		0.05

表 3（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
45	多效唑	paclobutrazol	15%可湿性粉剂	油菜	调节生长	750～1 500 倍液（100 mg/L～200 mg/L）	喷雾	2	—	苗期和抽苔期施药	0.2（油菜籽）
			10%可湿性粉剂	水稻	调节生长	100 g～200 g	喷雾	1	—	秧田期使用	0.5（稻谷）
				荔枝	调节生长	250～500 倍液（200 mg/L～400 mg/L）	喷雾	2	—	控梢使用	0.5
46	百草枯	paraquat	20%水剂	香蕉	一年生杂草	200 mL～250 mL	喷雾	1	—	定向喷雾	0.02
				苹果		200 g～250 g	喷雾	2	—	定向喷雾	0.05
47	二甲戊灵	pendimethalin	33%乳油	甘蓝	一年生阔叶及禾本科杂草	125 mL～150 mL	喷雾	1	30	移栽前土壤喷雾喷后耙匀	0.2
				大蒜	一年生杂草	125 mL～150 mL	喷雾	1	—	播后苗前土壤喷雾	0.1
48	复硝酚钾	potassium nitrophenolate	2%水剂	大白菜	调节生长	2 000～3 000 倍液（6.7 mg/L～10 mg/L）	喷雾	2	7		
49	丙酰芸苔素内酯	propionyl brassinolide	0.003%水剂	黄瓜	调节生长	3 000～5 000 倍液（0.006 mg/L～0.01 mg/L）	喷雾	2	3		
				葡萄	调节生长		喷雾	1	—	幼果期施药	
50	异丙草胺	propisochlor	50%乳油	甘薯	禾本科杂草和部分阔叶杂草	200 mL～250 mL	喷雾	1	—	土壤喷雾	0.05

表 3（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
51	吡草醚	pyraflufen-ethyl	2%悬浮剂	小麦	猪殃殃等阔叶杂草	30 mL～40 mL	喷雾	1	—		0.03
52	二氯喹啉酸	quinclorac	25%悬浮剂	水稻	稗草	50 mL～100 mL	喷雾	1	—		1(糙米)
			50%可湿性粉剂	水稻	稗草	35 g～40 g	喷雾	1	—	移栽后 10 d 施药	1(糙米)
			45%可溶性粉剂	水稻	稗草	30 g～50 g	喷雾	1	—		1(糙米)
53	精喹禾灵	quizalofop-P-ethyl	5%乳油	芝麻	一年生禾本科杂草	50 mL～60 mL	喷雾	1	—		
			8.8%乳油	大豆	一年生禾本科杂草	40 mL～50 mL	喷雾	1	—	杂草 3～6 叶期喷施	0.1
54	喹禾糠酯	quizalofop-P-tefuryl	4%乳油	大豆	一年生和多年生禾本科杂草	60 mL～80 mL	喷雾	1	—	大豆 1～2 片复叶期，茎叶喷雾	
55	西草净	simetryn	13%乳油	水稻	水绵	120 mL～130 mL	毒土法	1	—	施后保水 1 周	0.05(糙米)

表 3（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
56	精异丙甲草胺	s-metolachlor	96%乳油	甜菜	一年生禾本科杂草	60 mL～90 mL	喷雾	1	—	播后苗前土壤喷雾	0.1
				油菜	一年生禾本科、莎草科及阔叶杂草	45 mL～60 mL	喷雾	1	—	移栽前土壤喷雾	0.1(油菜籽)
				大豆	一年生禾本科及阔叶杂草	春:65 mL～85 mL；夏:50 mL～85 mL	喷雾	1	—	播后芽前土壤处理	0.5
				芝麻		50 mL～65 mL	喷雾	1	—		0.1
				棉花	一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草	57.6 mL～96.05 mL	喷雾	1	—		
				玉米		50 mL～85 mL	喷雾	1	—		0.1
				烟草		40 mL～75 mL	喷雾	1	—	移栽前施用	
57	2,4-D钠盐	sodium 2,4-dichlorophenoxyacetate	85%可溶粉剂	春小麦	阔叶杂草	85 g～125 g	喷雾	1	—		2
				番茄	调节生长	42 500～85 000 倍液（10 mg/L～20 mg/L）	涂花、点花	1	5	花期施药	0.5
58	复硝酚钠	sodium nitrophenolate	1.4%可溶粉剂	番茄	调节生长	4 000～5 000 倍液（3.5 mg/L～2.8 mg/L）	喷雾	3	1		
59	噻苯隆	thidiazuron	0.1%可溶液剂	葡萄	调节生长	150～250 倍液（4 mg/L～6.7 mg/L）	喷雾	1	30	盛花期后 7 d～15 d 施用	0.05
				甜瓜	调节生长	300～400 倍液（2.5 mg/L～3.3 mg/L）	喷雾	1	35		0.05

表 3（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
60	噻吩磺隆	thifensulfuron-methyl	75%干悬浮剂	大豆	一年生阔叶杂草	2 g～3 g	喷雾	1	—	播后苗前施药	0.05
61	2,4-D 丁酯＋莠去津	2,4-D butylate＋atrazine	45%悬乳剂（2,4-D 丁酯 12%＋莠去津 33%）	玉米	莎草科杂草、禾本科和阔叶杂草	220 mL～330 mL	喷雾	1	—	播后苗前	2,4-D 丁酯：0.05；莠去津：0.05
62	2,4-D 丁酯＋辛酰溴苯腈＋烟嘧磺隆	2,4-D butylate＋bromoxynil octanoate＋nicosulfuron	30%可分散油悬浮剂（2,4-D 丁酯 10%＋辛酰溴苯腈 16%＋烟嘧磺隆 4%）	玉米	一年生杂草	47 mL～93 mL	茎叶喷雾	1	—	玉米 3～4 叶期施用	2,4-D 丁酯：0.05；烟嘧磺隆：0.1
63	2,4-D 丁酯＋丁草胺＋莠去津	2,4-D butylate＋butachlor＋atrazine	48%悬乳剂（2,4-D 丁酯 5%＋丁草胺 24%＋莠去津 19%）	玉米	禾本科、某些莎草科及部分阔叶杂草	150 mL～200 mL	播种后苗前对土壤封闭喷雾	1	—		2,4-D 丁酯：0.05；丁草胺：0.5；莠去津：0.05
64	2,4-D＋草甘膦	2,4-D＋glyphosate	10.8%水剂（2,4-D0.8%＋草甘膦 10%）	柑橘	一年生或多年生杂草	750 mL～1 500 mL	喷雾	1	—	定向喷雾	草甘膦：0.5
65	2,4-D＋氨氯吡啶酸	2,4-D＋picloram	26%水剂（2,4-D20.6%＋氨氯吡啶酸 5.4%）	春小麦	一年生阔叶杂草	80 mL～100 mL	喷雾	1	—	小麦 2 叶后至拔节前施用	2,4-D ：2

表 3（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
66	2,4-D 异辛酯＋双氟磺草胺	2,4-D-ethylhexyl＋florasulam	45.9％悬浮剂（2,4-D 异辛酯 45.3％＋双氟磺草胺 0.6％）	小麦	阔叶杂草	30 mL～40 mL	喷雾	1	—	苗期施药	
67	乙草胺＋甲草胺＋莠去津	acetochlor＋alachlor＋atrazine	42％悬乳剂（乙草胺 25％＋甲草胺 2％＋莠去津 15％）	玉米	一年生禾科杂草及部分阔叶杂草	150 mL～200 mL	喷雾	1	—	播后芽前	乙草胺：0.05；甲草胺：0.2；莠去津：0.05
68	乙草胺＋醚磺隆	acetochlor＋cinosulfuron	25％可湿性粉剂（乙草胺 21％＋醚磺隆 4％）	水稻	一年生及部分多年生杂草	20 g～30 g	毒土法	1	—	移栽后 5 d～7 d 施药	乙草胺：0.05（糙米）；醚磺隆：0.1（糙米）
69	乙草胺＋噁草酮	acetochlor＋oxadiazon	37.5％乳油（乙草胺 24.5％＋噁草酮 12.5％）	大蒜	一年生杂草	120 mL～150 mL	喷雾	1	—	露地播后苗前或地膜覆膜前施药	噁草酮：0.1
70	三氟羧草醚＋喹禾灵	acifluorfen＋quizalofop-ethyl	7.5％乳油（三氟羧草醚 2.5％＋喹禾灵 5.0％）	花生	一年生杂草	100 mL～120 mL	喷雾	1	—	2～5 叶期施用	喹禾灵：0.1

表 3（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
71	三氟羧草醚＋精喹禾灵	acifluorfen＋quizalofop-P-ethyl	5%乳油（三氟羧草醚 3.5%＋精喹禾灵 1.5%）	夏大豆	一年生杂草	120 mL～160 mL	喷雾	1	—	大豆 1～3 片复叶时施用	三氟羧草醚：0.1；精喹禾灵：0.1
				春大豆	一年生杂草	120 mL～180 mL	喷雾	1	—	大豆 1～3 片复叶时施用	三氟羧草醚：0.1；精喹禾灵：0.1
			7.5%乳油（三氟羧草醚 2.5%＋精喹禾灵 5%）	花生	一年生杂草	80 mL～100 mL	喷雾	1	—	2～5 叶期施用	精喹禾灵：0.1
72	甲草胺＋苯噻酰草胺＋吡嘧磺隆	alachlor＋mefenacet＋pyrazosulfuron-ethyl	31%泡腾粒剂（甲草胺 7%＋苯噻酰草胺 20%＋吡嘧磺隆 4%）	水稻	杂草	南方地区：30 g～40 g；北方地区：50 g～70 g	撒施	1	—	稻田平整，保水施药	甲草胺：0.05（糙米）；苯噻酰草胺：0.05（糙米）；吡嘧磺隆：0.1（糙米）
73	酰嘧磺隆＋甲基碘磺隆钠盐	amidosulfuron＋benzoate sodium salt	6.25%水分散粒剂（酰嘧磺隆 5%＋甲基碘磺隆钠盐 1.25%）	小麦	一年生阔叶杂草	10 g～20 g	喷雾	1	—	茎叶处理	酰嘧磺隆：0.01；甲基碘磺隆钠盐：0.02

表 3（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
74	莠去津＋2甲4氯	atrazine＋MCPA	45%悬浮剂（莠去津 25%＋2甲4氯 20%）	玉米	一年生阔叶杂草	200 mL～250 mL	喷雾	1	—	玉米 4～6 叶期施药	莠去津 0.05；2甲4氯：0.05
75	莠去津＋异丙草胺	atrazine＋propisochlor	40%悬乳剂（莠去津 20%＋异丙草胺 20%）	玉米	一年生杂草	夏：200 mL～250 mL；春：350 mL～400 mL	喷雾	1	—	播后苗前土壤处理	莠去津 0.05；异丙草胺 0.1
76	草除灵＋烯草酮	benazolin-ethyl＋clethodim	12%乳油（草除灵 9.5%＋烯草酮 2.5%）	油菜	一年生杂草	200 mL～250 mL	喷雾	1	—	油菜移栽后 6～8 叶期	草除灵 0.2（油菜籽）；烯草酮 0.5（油菜籽）
77	苄嘧磺隆＋丁草胺	bensulfuron methyl＋butachlor	35%可湿性粉剂（苄嘧磺隆 1.6%＋丁草胺 33.4%）	水稻	一年生杂草	120 g～150 g	毒土法	1	—	插秧前 2 d～3 d 或者插秧后 4 d～6 d 撒施	苄嘧磺隆：0.05（糙米）；丁草胺：0.5（大米）
78	苄嘧磺隆＋唑草酮	bensulfuron-methyl＋carfentrazone-ethyl	38%可湿性粉剂（苄嘧磺隆 30%＋唑草酮 8%）	水稻	阔叶杂草及莎草科杂草	10 g～13.8 g	喷雾	1	—	移栽 15 d 后施用	苄嘧磺隆：0.05（糙米）；唑草酮：0.1（糙米）
79	苄嘧磺隆＋苯噻酰草胺	bensulfuron-methyl＋mefenacet	53%水分散粒剂（苄嘧磺隆 3%＋苯噻酰草胺 50%）	水稻	一年生杂草	东北：70 g～80 g；其他：50 g～60 g	毒土法	1	—	于水稻抛秧后 5 d～7 d，毒土法撒施	苄嘧磺隆：0.05（糙米）；苯噻酰草胺 0.05（糙米）

表 3（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
80	苄嘧磺隆＋甲磺隆	bensulfuron-methyl＋metsulfuron-methyl	10％可湿性粉剂（苄嘧磺隆 8.25％＋甲磺隆 1.75％）	水稻	阔叶杂草及一年生莎草等	南方：4 g～7 g	喷雾	1	—	移栽后 7 d～10 d 喷施，只适用于南方稻区	苄嘧磺隆：0.05（糙米）；甲磺隆：0.05（糙米）
81	苄嘧磺隆＋禾草敌	bensulfuron-methyl＋molinate	45％细粒剂（苄嘧磺隆 0.5％＋禾草敌 44.5％）	水稻	稗草等一年生及部分多年生杂草	150 g～200 g	毒土法撒施	1	—	田间保水层施药	苄嘧磺隆：0.05（糙米）；禾草敌：0.1（糙米）
82	苄嘧磺隆＋丙草胺	bensulfuron-methyl＋pretilachlor	40％可湿性粉剂（苄嘧磺隆 4％＋丙草胺 36％）	水稻	一年生杂草	60 g～80 g	喷雾或毒土	1	—		苄嘧磺隆：0.05（糙米）；丙草胺：0.1（大米）
83	灭草松＋2甲4氯	bentazone＋MCPA	46％可溶性液剂（灭草松 40％＋2甲4氯 6％）	水稻	莎草科及阔叶杂草	133 mL～167 mL	喷雾	1	—	水稻分蘖期施用	灭草松：0.1（稻谷）；2甲4氯：0.05（糙米）
84	灭草松＋精喹禾灵＋氟磺胺草醚	bentazone＋quizalofop-P-ethyl＋fomesafen	21％微乳剂（灭草松 14.5％＋精喹禾灵 1.5％＋氟磺胺草醚 5％）	大豆	一年生杂草	春：200 mL～220 mL；夏：186 mL ～200 mL	喷雾	1	—	大豆苗后 2～3 复叶期施药	灭草松：0.05；精喹禾灵：0.1；氟磺胺草醚：0.1

表 3（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
85	甲基碘磺隆钠盐＋甲基二磺隆	benzoate sodium salt＋mesosulfuron-methyl	3.6％水分散粒剂（甲基碘磺隆钠盐 0.6％＋甲基二磺隆 3％）	冬小麦	一年生杂草	15 mL～25 mL	喷雾	1	—		甲基碘磺隆：0.02；甲基二磺隆：0.02
86	唑酮草酯＋苯磺隆	carfentrazone-ethyl＋tribenuron-methyl	36％可湿性粉剂（唑酮草酯 22％＋苯磺隆 14％）	小麦	阔叶杂草	4 g～5 g	喷雾	1	—	小麦返青后拔节前茎叶喷雾	苯磺隆：0.05
87	氰氟草酯＋精噁唑禾草灵	cyhalofop-butyl＋fenoxaprop-P-ethyl	10％乳油（氰氟草酯 5％＋精噁唑禾草灵 5％）	水稻	禾本科杂草	40 mL～60 mL	喷雾	1	—	水稻 5 叶期后施用	精噁唑禾草灵：0.1（糙米）；氰氟草酯：0.1（糙米）
88	氰氟草酯＋五氟磺草胺	cyhalofop-butyl＋penoxsulam	6％油悬剂（氰氟草酯 5％＋五氟磺草胺 1％）	水稻	禾本科杂草	100 mL～133 mL	喷雾	1	—	茎叶处理	氰氟草酯：0.1（糙米）
89	胺鲜酯＋乙烯利	diethyl aminoethyl hexanoate＋ethephon	30％水剂（胺鲜酯 3％＋乙烯利 27％）	玉米	调节生长	20 mL～25 mL	喷雾	1	—	—	乙烯利：0.5

表 3（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
90	敌草快＋百草枯	diquat＋paraquat	20%水剂（敌草快 8%＋百草枯 12%）	甘蔗	杂草	150 mL～200 mL	喷雾	1	—	杂草生长旺盛期定向喷雾，避免喷雾至甘蔗上	敌草快：0.05
91	敌草隆＋噻苯隆	diuron＋thidiazuron	54%悬浮剂（敌草隆 18%＋噻苯隆 36%）	棉花	调节生长	9 mL～12 mL	喷雾	1	7	于棉桃进入停滞发育期施药	噻苯隆：1（棉籽）
92	精噁唑禾草灵＋噻酚磺隆＋苯磺隆	fenoxaprop-P-ethyl＋thifensulfuron-methyl＋tribenuron-methyl	55%可湿性粉剂（精噁唑禾草灵 45%＋噻酚磺隆 2%＋苯磺隆 8%）	小麦	一年生禾本科及阔叶杂草	10 g～12 g	喷雾	1	—		精噁唑禾草灵：0.1；噻酚磺隆：0.05；苯磺隆：0.05
93	双氟磺草胺＋唑嘧磺草胺	florasulam＋flumetsulam	17.5%悬浮剂（双氟磺草胺 7.5%＋唑嘧磺草胺 10%）	小麦	阔叶杂草	3 mL～4.5 mL	喷雾	1	—	苗期施药	双氟磺草胺：0.01
94	氯氟吡氧乙酸＋2甲4氯钠盐	fluroxypyr＋MCPA-Na	30%可湿性粉剂（氯氟吡氧乙酸 5%＋2甲4氯钠盐 25%）	水稻	一年生阔叶杂草及莎草	100 g～150 g	喷雾	1	—	水稻分蘖末期茎叶喷雾	氯氟吡氧乙酸：0.2（稻谷）；2甲4氯：0.05（糙米）

表 3（续）

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）/d	实施要点说明	最高残留限量（MRL）参考值/（mg/kg）
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
95	氯氟吡氧乙酸＋苯磺隆	fluroxypyr＋tribenuron-methyl	20％可湿性粉剂（苯磺隆 2.7％＋氯氟吡氧乙酸 17.3％）	小麦	阔叶杂草	30 g～40 g	喷雾	1	—	冬小麦苗期施药	氯氟吡氧乙酸：0.2；苯磺隆：0.05
96	异丙隆＋苯磺隆	isoproturon＋pretilachlor	60％可湿性粉剂（异丙隆 59％＋苯磺隆 1％）	小麦	一年生杂草	90 g～120 g	喷雾	1	—		异丙隆：0.05；苯磺隆：0.05
97	萘乙酸钠＋复硝酚钠	sodium l-naphthal acitic acid＋sodium nitrophenolate	2.85％水剂（2，4-二硝基苯酚钠 0.15％＋对硝基苯酚钠 0.9％＋邻苯基苯酚钠 0.6％＋萘乙酸钠 1.2％）	大豆	调节生长	4 000～6 000 倍液（4.8 mg/L ～7.1 mg/L）	喷雾	2	14		
98	苯磺隆＋噻吩磺隆	thiameturon-methyl＋thifensulfuron-methyl	10％可湿性粉剂（苯磺隆 7％＋噻吩磺隆 3％）	冬小麦	一年生阔叶杂草	10g～15 g	喷雾	1	—		苯磺隆：0.05；噻吩磺隆：0.05