ICS 65.100
B 17

中华人民共和国国家标准

GB/T 8321.4—2006
代替 GB 8321.4—1993

农药合理使用准则(四)

Guideline for safety application of pesticides(Ⅳ)

2006-06-02 发布　　2006-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　言

为指导使用者合理、安全使用农药，有效防治农作物病、虫、草害，确保农产品中农药残留量不超过规定的限量标准，保护环境，保障人体健康而制定本标准。

GB/T 8321《农药合理使用准则》分为以下几部分：

——GB/T 8321.1　农药合理使用准则(一)；

——GB/T 8321.2　农药合理使用准则(二)；

——GB/T 8321.3　农药合理使用准则(三)；

——GB/T 8321.4　农药合理使用准则(四)；

——GB/T 8321.5　农药合理使用准则(五)；

——GB/T 8321.6　农药合理使用准则(六)；

——GB/T 8321.7　农药合理使用准则(七)；

……

本部分为 GB/T 8321 的第 4 部分。

本部分代替 GB 8321.4—1993《农药合理使用准则(四)》。

本部分以 GB 8321.4—1993 为基础，依照 GB 4839—1998《农药通用名称》，按照 2003 年《农药登记公告》中的施药量、施药方法等修订，其编制格式按照 GB/T 8321.7—2002 修订。

本部分由中华人民共和国农业部提出并归口。

本部分由农业部农药检定所起草。

本部分委托农业部农药检定所负责解释。

本部分主要起草人：刘光学、秦冬梅、龚勇、何艺兵、陶传江、朱光艳、李友顺、宋稳成。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 8321.4—1993。

农药合理使用准则(四)

1 范围

本部分规定了50种农药在17种农作物上的合理使用准则。

本部分适用于农作物病、虫、草害的防治。

2 项目和技术指标

项目和技术指标见表1、表2和表3。

表1 杀虫剂、杀螨剂

农药			适用作物	防治对象	每667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参考值/(mg/kg)
通用名	商品名[a]	剂型及含量								
联苯菊酯 biphenthrin	天王星 Talstar	10%乳油	苹果	桃小食心虫、叶螨等	3 000倍液～5 000倍液(20 mg/L～33 mg/L)	喷雾	3	10	—	全果1
克百威 carbofuran	呋喃丹 Furadan	3%颗粒剂	花生	根结线虫、花生蚜	4 000 g～5 000 g	沟施或条施	1	—	播种时沟施或条施	花生仁0.1
	大扶农 Diafuran		甘蔗	蔗螟、金针虫、绵蚜、蓟马、线虫等	3 000 g～5 000 g	沟施		—	甘蔗苗期沟施	甘蔗0.1
	呋喃丹 Furadan	35%种子处理剂	棉花	蚜虫	28 g/kg种子	种子处理		—	用硫酸将棉籽脱绒后包衣	棉籽0.1
氟定脲 chlorfluazuron	抑太保 Atabron	5%乳油	棉花	棉铃虫、红铃虫	60 mL～140mL	喷雾	3	21	—	棉籽0.1
			甘蓝	菜青虫、小菜蛾	40 mL～80 mL			7	—	0.5
氯氟氰菊酯 cyhalothrin	功夫 Kung Fu	2.5%乳油	棉花	棉蚜	10 mL～20 mL	喷雾	3	21	—	棉籽0.1
				棉铃虫、红铃虫	20 mL～60 mL		2			
溴氰菊酯 deltamethrin	敌杀死 Decis	2.5%乳油	小麦	粘虫、蚜虫	10 mL～15 mL	喷雾	3	15	—	籽粒1
			大豆	食心虫	15 mL～25 mL		2	7	—	籽粒0.1

表 1（续）

农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参考值/(mg/kg)
通用名	商品名[a]	剂型及含量								
S-氰戊菊酯 esfenvalerate	来福灵 Sumi-alpha	5%乳油	大豆	大豆蚜、大豆食心虫	10 mL～20 mL	喷雾	2	10	—	籽粒 0.1
醚菊酯 ethofenprox	多来宝 Trebon	5%可湿性粉剂	水稻	稻飞虱、稻纵卷叶螟	80 g～120 g	喷雾	3	14	—	糙米 0.5
		10%悬浮剂	水稻	稻象甲	40 mL～60 mL					
			甘蓝	菜青虫	30 mL～40 mL			7	—	2
甲氰菊酯 fenpropathrin	灭扫利 Meothrin	20%乳油	柑橘	红蜘蛛	2 000 倍液～3 000 倍液（67 mg/L～100 mg/L）	喷雾	3	30	不能与碱性物质混用	全果 5
				潜叶蛾	8 000 倍液～10 000 倍液（20 mg/L～25 mg/L）					
			茶叶	茶尺蠖、茶毛虫、茶小绿叶蝉	8 000 倍液～10 000 倍液（20 mg/L～25 mg/L）	喷雾	1	7		成茶 5
氰戊菊酯 fenvalerate	速灭杀丁 Sumicidin	20%乳油	大豆	蚜虫	10 mL～20 mL	喷雾	1	10	—	籽粒 0.1
				食心虫	20 mL～30 mL					
				豆荚螟	20 mL～40 mL					
地虫硫磷 fonofos	大风雷 Dyfonate	5%颗粒剂	甘蔗	蔗龟	4 000 g～6 000 g	沟施	—	—	甘蔗苗期沟施	0.1
噻螨酮 hexythiazox	尼索朗 Nissorun	5%可湿性粉剂	柑橘	红蜘蛛	2 000 倍液（25mg/L）	喷雾	2	30	—	全果 0.5
		5%乳油	柑橘							全果 0.5
			苹果		1 500 倍液～2 000 倍液（25 mg/L～33mg/L）					0.5

表 1（续）

农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参考值/(mg/kg)
通用名	商品名[a]	剂型及含量								
杀扑磷 methidathion	速扑杀 Supracide	40%乳油	柑橘	褐园介、红蜡介	670 倍液～1 000 倍液（400 mg/L～600 mg/L）	喷雾	1	30	不能与碱性农药混用，预防中毒	全果 2
灭多威 methomyl	万灵 Lannate	24%水溶性液剂	烟草	烟青虫	50 mL～75 mL	喷雾	2	5	吸入毒性高，预防中毒	干烟 3
			甘蓝	菜青虫	80 mL～100 mL			7		2
久效磷 monocrotophos	纽瓦克 Nuvacron	36.7%水剂	棉花	棉蚜、红蜘蛛、红铃虫、棉铃虫	50 mL～110 mL	喷雾	4	21	防棉蚜、红蜘蛛时用低剂量	棉籽 0.1
抗蚜威 pirimicarb	辟蚜雾 Pirimor	50%可湿性粉剂	小麦	蚜虫	10 g～20 g	喷雾	2	14	—	籽粒 0.05
			油菜		12 g～20 g					油菜籽 0.2
氟苯脲 teflubenzuron	农梦特 Nomolt	5%乳油	柑橘	潜叶蛾	1 000 倍液～2 000 倍液（25 mg/L～50 mg/L）	喷雾	3	30	避免污染水栖生物生栖地	全果 0.5
			叶菜	菜青虫、小菜蛾	45 mL～60 mL		2	10		甘蓝 0.5
水胺硫磷 isocarbophos	水胺硫磷	40%乳油	柑橘	螨、锈壁虱、潜叶蛾	1 000 倍液～1 300 倍液（308 mg/L～400mg/L）	喷雾	3	14	不可与碱性农药混用	全果 0.3
多噻烷 polythialan	—	30%乳油	水稻	稻螟、稻纵卷叶螟、稻苞虫等	120 mL～170 mL	喷雾	3	14	—	糙米 0.1
甲基异柳磷 isofenphos-methyl	—	40%乳油	花生	蛴螬等地下害虫	250 mL	沟施	1	—	播种时沟施	花生 0.05

[a] 联苯菊酯等的商品名是适合的市售产品的多个实例。给出这一信息是为了方便本标准的使用者，并不表示对这些商品的认可。

表 2　杀菌剂、杀线虫剂

农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参考值/(mg/kg)
通用名	商品名[a]	剂型及含量								
烯唑醇 diniconazole	速保利 Sumi-eight	2%可湿性粉剂	小麦	黑穗病	2 g/kg 种子～2.5 g/kg 种子	拌种	1	—	播种前拌种	籽粒 0.05
		12.5%可湿性粉剂	玉米	丝黑穗病	5 g/kg 种子～7 g/kg 种子					
			梨	梨黑星病	3 000 倍液～4 000 倍液（31 mg/L～42 mg/L）	喷雾	3	21	—	全果 0.1
氯苯嘧啶醇 fenarimol	乐必耕 Rubigan	6%可湿性粉剂	苹果	黑星病、炭疽病、白粉病	1 000 倍液～1 500 倍液（40 mg/L～60 mg/L）	喷雾	3	14	—	全果 0.1
			梨	黑星病						
异菌脲 iprodione	扑海因 Rovral	25% 悬浮剂	香蕉	贮藏病害	167 倍液（1 500 mg/L）	浸果	1	4	浸蕉 2 min 后捞出凉干贮存	全果 10
			油菜	菌核病	140 mL～200 mL	喷雾	2	50	—	油菜籽 0.2
多氧霉素 polyoxin B	宝丽安 Poloxin	10%可湿性粉剂	苹果	轮斑病、斑点落叶病	1 000 倍液～1 500 倍液（67 mg/L～100 mg/L）	喷雾	3	7	不能与酸性农药混用	—
腐霉利 procymidone	速克灵 Sumilex	50%可湿性粉剂	黄瓜	灰霉病、菌核病	40 g～50 g	喷雾	3	1	—	2
硫线磷 sebufos	克线丹 Rugby	10%颗粒剂	甘蔗	线虫	2 000 g～4 000 g	沟施	1	—	苗期施毒土	0.1
噻菌灵 thiabendazole	特克多 Tecto	45% 悬乳剂	香蕉	贮存病害	600 倍液～900 倍液（500 mg/L～750 mg/L）	浸果	1	10	浸蕉 1 min 后捞出凉干贮存	果肉 0.4
甲基硫菌灵 thiophanate-methyl	甲基托布津 Topsin-M	50%悬乳剂	水稻	稻瘟病、纹枯病	100 mL～150 mL	喷雾	3	30	不能与铜制剂混用	糙米 0.1
			小麦	赤霉病			1			籽粒 0.1
氟菌唑 triflunizole	特富灵 Trifmine	30%可湿性粉剂	黄瓜	白粉病	15 g～20 g	喷雾	2	2	—	2

表 2（续）

农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参考值/(mg/kg)
通用名	商品名[a]	剂型及含量								
丁、戊、己二酸铜 ① copper guccinate＋ ② copper glutarte＋ ③ copper adioate	琥胶肥酸铜（二元酸铜）	30%悬浮剂（有效铜）	水稻	稻曲病	100 mL～150 mL	喷雾	2	—	稻穗破口前喷施	糙米中铜含量 20
① 春雷霉素 kasugamycin ＋ ② 氧氯化铜 copper oxychloride	加瑞农 Kasumin-Bordeaux	50%可湿性粉剂 ① 5% ② 45%	柑橘	溃疡病	500 倍液～800 倍液（625 mg/L～1 000 mg/L）	喷雾	5	21	—	全果 0.5

[a] 烯唑醇等的商品名是适合的市售产品的多个实例。给出这一信息是为了方便本标准的使用者，并不表示对这些商品的认可。

表 3　除草剂、植物生长调节剂

农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参考值/(mg/kg)
通用名	商品名[a]	剂型及含量								
三氟酸草醚 acifluorfen-sodium	达克尔 Tackle	24%水剂	大豆	阔叶杂草	60 mL～100 mL	喷雾	1	—	大豆播后，杂草 1 叶～4 叶期喷施	籽粒 0.1
双酰草胺 carbetamide	雷克拉 Leggurame	70%可湿性粉剂	油菜	一年生禾本科杂草及阔叶杂草	200 g～270 g	喷雾	1	—	开春油菜转青初期至开盘前施	油菜籽 0.05
苄嘧磺隆 bensulfuron-methyl	农得时 Londax	10%可湿性粉剂	水稻	阔叶杂草及莎草	13 g～25 g	毒土或喷雾	1	—	插秧后 5 天～7 天施，保水一周	糙米 0.02
禾草丹 benthiocarb	高杀草丹 Saturn 104	90%乳油	水稻	稗草等一年生杂草	150 mL～220 mL	喷雾或毒土	1	—	施后保水一周	糙米 0.2

表 3（续）

农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参考值/(mg/kg)
通用名	商品名[a]	剂型及含量								
溴苯腈 bromoxynil	伴地农 Pardner	22.5%乳油	小麦	阔叶杂草	100 mL～170 mL	喷雾	1	—	小麦 3 叶～5 叶期杂草 4 叶前喷施	籽粒 0.1
			玉米	阔叶杂草	80 mL～135 mL			—	玉米 3 叶～8 叶期杂草 4 叶期喷施	
烯草酮 clethodim	赛乐特 Select	24%乳油	大豆	一年生禾本科杂草	25 mL～50 mL	喷雾	1	—	大豆 2 片～4 片复叶时喷施	籽粒 10
麦草畏 dicamba	百草敌 Baanvel	48%水剂	玉米	阔叶杂草	25 mL～40 mL	喷雾	1	—	玉米 4 叶～6 叶期喷施	籽粒 0.5
精吡氟禾草灵 fluazifop-*p*-butyl	精稳杀得 Onecide-p	15%乳油	油菜	一年生禾本科杂草	40 mL～66 mL	喷雾	1	—	油菜苗期杂草 1 叶～4 叶期喷施	油菜籽 0.1
氟节胺 flumetralin	抑芽敏 Prime	25%乳油	烟草	抑制烟芽	60 mL～70 mL 或 0.04 mL/株	喷雾或杯淋	1	—	烟草打顶后随即施药，不可与其他农药混用	干烟 20
氟草烟 fluroxypyr	使它隆 Starane	20%乳油	小麦	阔叶杂草	50 mL～70 mL	喷雾	1	—	冬小麦返青期，春小麦 2 叶～4 叶期施	籽粒 0.2
异丙甲草胺 metolachlor	都尔 Dual	72%乳油	花生	一年生禾本科及部分阔叶杂草	100 mL～150 mL	土壤处理	1	—	播前或播后苗前土壤喷雾	花生仁 0.5
禾草特 molinte	杀克尔 Sakkimol	70%乳油	水稻	稗草、牦草等	130 mL～260 mL	喷雾或毒土	1	—	播前或插秧后3天~5天喷雾或撒毒土，保水一周	糙米 0.1
萘氧丙草胺 napropamide	大惠利 Devrinol	50%可湿性粉剂	烟草	一年生禾本科及部分阔叶杂草	100 mL～266 mL	土壤处理	1	—	烟草移栽后，杂草出土前喷施	干烟 0.1

表 3（续）

农药			适用作物	防治对象	每 667 m^2 每次制剂施用量或稀释倍数（有效成分浓度）	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数（安全间隔期）	实施要点说明	最高残留限量(MRL)参考值/(mg/kg)
通用名	商品名[a]	剂型及含量								
二甲戊乐灵 pendimethalin	施田补 Stomp	33%乳油	玉米	一年生阔叶及禾本科杂草	150 mL～303 mL	土壤处理	1	—	播后或苗前5天土壤喷雾	籽粒 0.1
			叶菜		100 mL～150 mL				移栽前土壤喷雾喷后耙匀	叶菜 0.2
甜菜宁 phenmedipham	凯米丰 Kemifam	16%乳油	甜菜	阔叶杂草	400 mL～600 mL	喷雾	1	—	杂草 2 叶～4 叶期甜菜苗期喷施	0.1
酚硫杀 phenothiol	芳米大 Herbit	20%乳油	小麦	阔叶杂草	130 mL～200 mL	喷雾	1	—	小麦分蘖末期喷施	籽粒 0.01
丙草胺 pretilachlor	扫弗特 Sofit	30%乳油	水稻	一年生杂草	100 mL～115 mL	喷雾或毒土	1	—	水直播或秧田播后 1 天～4 天喷雾或毒土	糙米：丙草胺 0.1 安全剂 0.05
烯禾啶 sethoxydim	拿扑净 Nabu	20%乳油	棉花	一年生禾本科杂草	100 mL～120 mL	喷雾	1	—	杂草 3 叶～5 叶期作物苗期喷施	棉籽 5
			花生		70 mL～100 mL					籽粒 2
			油菜		65 mL～120 mL					油菜籽 1
			亚麻							1
① 禾草丹 benthiocarb＋② 西草净 simetryn	杀草丹 Saturn-s	57.5%乳油 ① 50% ② 7.5%	水稻	稗草眼子菜等杂草	200 mL～270 mL	喷雾或毒土	1	—	施后保水一周，防眼子菜用高剂量	糙米：① 0.2 ② 0.02
复硝酚钠 sodium nitrophenolate ① sodium orthonitrophenolate＋② sodium paranitrophenolate＋③ sodium 5-nitroguaiacolate	爱多收 Atonic	1.8%水剂 ① 0.6% ② 0.9% ③ 0.3%	番茄	调节生长	6 000 倍液～8 000 倍液（2.3 mg/L～3.0 mg/L）	喷雾	2	7	—	① 0.1 ② 0.05 ③ 0.02

[a] 三氟酸草醚等的商品名是适合的市售产品的多个实例。给出这一信息是为了方便本标准的使用者，并不表示对这些商品的认可。