近期小麦“倒春寒”灾害防范技术指导意见

日期：2020-02-13 17:07 作者： 来源：农业农村部小麦专家指导组 全国农业技术推广服务中心 【字号：大 中 小】 打印本页

据气象部门预报，受强冷空气影响，2月13—16日，我国中东部大部地区将降温8—10℃，并伴有大范围雨雪天气过程。当前，西南地区小麦进入拔节中后期，长江中下游地区小麦陆续起身拔节，黄淮海南部小麦开始返青起身。由于今年主产区越冬期气温偏高，小麦缺少抗寒锻炼，加之生育进程提前，特别是小麦拔节后对0℃以下低温抵御能力较弱，寒潮降温可能对小麦正常生长发育带来不利影响。各地要密切关注天气变化，坚持“以水调温”，做好冻害防御；坚持“以肥促长”，做好灾后补救，切实减轻灾害损失。

一是提高认识，提早准备。“立春”至“谷雨”，冬小麦主产区气温波动较大，“倒春寒”发生几率较大。目前，冬小麦由南向北开始返青、起身、拔节，进入了营养生长向生殖生长的转变期，春季田间管理全面展开，是决定小麦穗数、奠定穗粒数基础的关键期，要提前做好“倒春寒”防控准备。

二是以水调温，保墒防冻。对缺墒的麦田，寒潮到来前提前灌水，改善土壤墒情，调节近地层小气候，缓冲降温影响，预防冻害发生。对土壤墒情较好、尚未拔节的麦田和土壤暄松的麦田进行镇压，弥补土壤缝隙，防止透风跑墒，同时控制旺长。

三是以肥促长，分类补救。寒潮过后2—3天，及时调查幼穗受冻情况，分类施肥补救，促进恢复生长，争取小蘖赶大蘖、大蘖多成穗。对仅叶片受冻或主茎幼穗冻死率10%以内的麦田，不必施肥；对冻死率10%—30%的麦田，亩施尿素5公斤左右；对冻死率30%—50%的麦田，亩施尿素7—10公斤；对冻死率50%以上的麦田，亩施尿素12—15公斤。拔节孕穗肥还需正常施用。

主办单位：中华人民共和国农业农村部 承办单位：农业农村部信息中心

网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2 京公网安备 11010502037559号

网站保留所有权，未经允许不得复制镜像