泾阳：警惕小麦药害 科学安全用药护航夏粮

时间： 2026-04-17 09:20 | 来源： 泾阳县植保植检站





当前，小麦已进入孕穗关键生长期，这是小麦营养生长与生殖生长并进阶段，也是决定穗数、穗粒数敏感，用药稍有不慎极易引发药害。近日，泾干镇吉元村一农户就因田间用药不当，导致自家小麦出现后，认为是用药不当引发的药害，为广大种植户小麦田间科学安全用药敲响警钟。

该农户小麦田里，小麦长势萎靡，整体生长受到明显抑制，植株低矮，新生叶片卷曲畸形、皱缩，发育迟缓，抽出的麦穗细弱瘦小，颜色淡黄，籽粒灌浆发育受阻。植保人员详细询问农户施药过程后发穗敏感生育期，盲目加大药剂用量，超出小麦植株耐受限度，最终破坏小麦正常生长代谢，影响小麦生

一旦田间出现此类药害症状，务必抓住72小时黄金补救期，及时采取以下措施缓解危害，降低产量损

一是清水喷淋降残留：立即用清水全田均匀喷施小麦植株2-3次，冲洗叶片、茎秆表面残留药剂，减用。

二是喷施调节剂促生长：选用芸苔素内酯等植物生长调节剂，按照说明书配比浓度全田喷施，间隔5细胞，解除生长抑制，促进植株恢复长势。

三是叶面补肥提长势：搭配喷施磷酸二氢钾+尿素混合液，快速补充小麦所需养分，增强叶片光合作助力幼穗正常发育。

四是加强田间管理：适量追施速效磷钾肥，加快小麦生长恢复，减少药害对灌浆结实的影响。

在此，提醒广大种植户一定要规范施药，科学安全用药：

一是严禁违规用药，规避敏感药剂，严格对照防治对象对症选药，杜绝盲目用药。二是严控药剂剂量签标注的使用浓度、用量施药，坚决杜绝随意加大药量、提高浓度；配药必须采用二次稀释法，保证药液范施药方法。选择无风、阴天或晴天早晚施药，避开中午高温、强光、大风天气，防止药剂蒸发过快、漂移；施药时保证喷雾均匀，不重喷、不漏喷，控制好行走速度，确保药剂精准覆盖，减少植株局部药剂残

扫一扫在手机打开当前页

返回顶部　　关闭页面

中央人民政府门户网站　农业农村部网站　陕西省人民政府网站　全国省级农业网站

关于我们　网站地图

主办单位：陕西省农业农村厅　运维单位：陕西省农业宣传信息中心　保留所有权利

技术支持：029-87333287　地址：西安市习武园27号

网站标识码：6100000015　陕ICP备19010650号-1　陕公网安备 61010402000416号