望都县农业农村局 肥害、药害和缺素从5个方面教你快速区分

发布时间：2026-01-21 来源：农业农村局

随着肥料的不断投入，农药的不断喷施，越来越多的作物症状让人分不清楚，**同样都是卷叶、畸形、黄化、该如何判断呢？**

肥害

常见症状有：烧苗、枝叶徒长、倒伏、病虫害加重、萎蔫，重者整个植株死亡。**肥害过程中可能出现一种症状，也可能出现几种症状。**

药害

常见症状有：作物体内生理变化异常、生长停滞、植株变异甚至死亡等**一系列症状**，比如斑点、黄化、枯萎、生长停滞、不孕、脱落、劣果等。

以下是比较容易混淆药害、肥害、缺素的几种症状：

一、斑点型

药害斑点：在植株上分布往往无规律，主要表现在叶上，有黄斑、褐斑、枯斑等；
肥害斑点：通常发生普遍，植株出现症状的部位较一致，比如黄瓜氮过剩产生的肥害，初期叶小有斑点，叶片镜时叶片焦枯；
缺素斑点：植物缺素症状因元素种类不同而有所差异。比如缺磷，叶片暗绿带紫红色，老叶出现紫斑或条纹，根花延迟，果实甜度低。

二、黄化型

药害：药害引起的黄化往往**由黄叶发展成枯叶**，阳光充足的天气多，黄化产生快，比如玉米除草剂浓度过大产生发黄、干枯；
肥害：肥害也会产生同样的症状，尤其是大棚或夏季或高温季节追施化肥时，或底肥产生的氨气等都会造成肥害量沟施、覆土，避开中午时间施肥，傍晚追肥及时浇水通风；
缺素：比如缺镁锌铁铜硼等，**黄化产生慢，在全田黄苗表现一致**。

三、畸形型

药害畸形：在**各个器官都可能发生**，常见的有卷叶、丛生、根肿、畸形穗、畸形果等；
肥害畸形：还**会伴随叶片颜色的改变**，比如草莓氮过量不仅新叶扭曲，还会叶色贪青浓绿；
缺素畸形：叶片多表现于缺硼缺钙，新叶卷曲、皱缩。

四、枯萎型

药害：引起的枯萎无发病中心，且大多发生过程迟缓，**先黄化、后死株，根茎疏导组织无褐变**；

肥害：引起的枯萎多是**烧根、烧叶**；

缺素：引起**叶片黄化**，严重的出现落叶、枯萎等症状。

五、缓长、发僵型

药害：引起的缓长，**往往伴有药斑或其他药害症状**，生长抑制剂、除草剂施用不当易出现此类药害；

肥害：发僵表现为**根系生长差**从而影响长势；

缺素：发僵则表现为**叶色发黄或暗绿**等。

六、如何缓解

作物出现症状，要**结合前后施肥、打药情况，进行准确判断**。

肥害：应及时**大量灌水稀释土壤中肥料浓度**，促使根系大量吸水，缓解肥害；增施有机肥料，提高土壤对养分的使之浓度不至于快速升高，减轻肥害发生。

药害：可用**清水立即冲洗**，以冲刷掉残留在叶片表面的药剂，此项措施越早越及时效果越好；还可以通过喷施**药剂**，**缓解药害，促进植株恢复生长**。

缺素：则要**及时补充喷施相应的中微量元素叶面肥**，快速补充养分，平时要合理施肥，平衡大中微量元素。

望都县人民政府办公室主办

望都县人民政府版权所有 违法和不良信息举报电话：0312-7827004 邮箱：wdzfxxk@163.com

冀ICP备18020140号-2 冀公网安备 13063102000040号 政府网站标识码1306310010

政府网站找错

党政机关