

Sprawozdanie z badań

Lp.	Badana cecha	Dokument odniesienia	Wynik	Jednostka	Wymagania wg		
					Rozporządzenia MRIRW z dnia 3 października 2003 r. (Dz.U. Nr 181, poz. 1773 z późn. zm.)	Normy PN-88/A-77626 „Miód pszczeli”	Informacji zawartych w oznakowaniu opakowań jednostkowych
1.	Zawartość fruktozy ^A	Rozporządzenie MRIRW z dnia 14 stycznia 2009 r. Załącznik do rozporządzenia pkt III (Dz.U. z 2009 r. Nr 17, poz. 94)	40,4	g/100g	-	-	-
2.	Zawartość glukozy ^A	Rozporządzenie MRIRW z dnia 14 stycznia 2009 r. Załącznik do rozporządzenia pkt III (Dz.U. z 2009 r. Nr 17, poz. 94)	35,2	g/100g	-	-	-
3.	Suma fruktozy i glukozy (z obliczeń) ^A	Rozporządzenie MRIRW z dnia 14 stycznia 2009 r. Załącznik do rozporządzenia pkt III (Dz.U. z 2009 r. Nr 17, poz. 94)	75,6	g/100g	nie mniej niż 60g/100g	-	-
4.	Zawartość sacharozy ^A	Rozporządzenie MRIRW z dnia 14 stycznia 2009 r. Załącznik do rozporządzenia pkt III (Dz.U. z 2009 r. Nr 17, poz. 94)	0,4	g/100g	nie więcej niż 5g/100g	-	-
5.	Liczba diastazowa ^A	Rozporządzenie MRIRW z dnia 14 stycznia 2009 r. Załącznik do rozporządzenia pkt IX (Dz.U. z 2009 r. Nr 17, poz. 94 ze zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1173)	10,0	w skali Schade	nie mniej niż 8	-	-
6.	Zawartość 5-hydroksymetylo-furfuralu (HMF) ^A	Rozporządzenie MRIRW z dnia 14 stycznia 2009 r. Załącznik do rozporządzenia pkt IV (Dz.U. z 2009 r. Nr 17, poz. 94)	7,1	mg/kg	nie więcej niż 40mg/kg	-	-
7.	Obecność dekstryn skrobiowych ^A	Rozporządzenie MRIRW z dnia 14 stycznia 2009 r. Załącznik do rozporządzenia pkt XII 4.1 (Dz.U. z 2009 r. Nr 17, poz. 94 ze zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1173)	nie stwierdzono	-	niedopuszczalna	-	-
8.	Zawartość proliny ^A	Rozporządzenie MRIRW z dnia 14 stycznia 2009 r. Załącznik do rozporządzenia pkt V (Dz.U. z 2009 r. Nr 17 poz. 94)	25,6	mg/100g	-	nie mniej niż 25 mg/100g	-
9.	Udział pyłków ^A	Rozporządzenie MRIRW z dnia 14 stycznia 2009 r. Załącznik do rozporządzenia pkt VI (Dz.U. z 2009 r. Nr 17, poz. 94)	Typ pyłku roślin nektarujących: Brassicaceae (kapustowate): 47 Fagopyrum (gryka): 32 Helianthus typ (typ słonecznika): 10 Citrullus (arbuz): 1 Lamiaceae (wargowate): 1 Inne: 9	%	Miód nektarowy wielokwiatowy – pochodzący z wielu roślin	-	Miód nektarowy wielokwiatowy

10.	Badania organoleptyczne			
Badana cecha	Dokument odniesienia	Wynik	Wymagania wg Rozporządzenia MRiRW z dnia 3 października 2003 r. (Dz.U. Nr 181, poz. 1773 z późn. zm.)	Wymagania wg Informacji zawartych w oznakowaniu opakowań jednostkowych
Barwa ^N	Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 stycznia 2009 r. Załącznik do rozporządzenia pkt X (Dz.U. z 2009 r. Nr 17, poz.94)	dla opakowań od x ₁ do x ₃ : jasnożółta	barwa - od prawie bezbarwnej do ciemnobrązowej konsystencja - płynna, lepka, częściowo lub całkowicie skrzystalizowana smak - zmienny, w zależności od odmiany zapach - zmienny, w zależności od odmiany	Miód nektarowy wielokwiatowy
Konsystencja ^N		płynna, lepka, zbyt lejąca		
Smak ^N		bardzo słodki, nietypowy dla miodu pszczelego nektarowego wielokwiatowego, przypominający smak szczyпки cukrowej		
Zapach ^N		słabo wyczuwalny, nietypowy dla miodu pszczelego nektarowego wielokwiatowego		

Wskazać należy, że badania organoleptyczne mają charakter poglądowy i nie mają wartości ilościowej, gdyż mają one znaczenie dla ważności lub zastosowania wyników badań.