

Merkblatt: Astroviren Stand: März 2023

Was sind Astroviren?

Astroviren sind weltweit verbreitet und verursachen Magen-Darm- Erkrankungen (sogenannte Gastroenteritis), vor allem bei Kindern. Astroviren können vereinzelt auftreten, sind aber auch gelegentlich die Ursache von akuten Gastroenteritis-Ausbrüchen in Gemeinschaftseinrichtungen, wie Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen.

Wie werden Astroviren übertragen?

Die größte Rolle spielt die direkte Übertragung von Mensch zu Mensch. Die Viren werden mit dem Stuhl ausgeschieden. Sie können dann über die Hände auf andere Menschen direkt und indirekt über Gegenstände oder Oberflächen übertragen werden (fäkal-orale Übertragung, sog. Schmierinfektion).

Wie lange ist ein Erkrankter ansteckungsfähig?

Die einzige Infektionsquelle ist der Mensch. Die Inkubationszeit (Zeit zwischen Infektion und Auftreten der Krankheitszeichen) beträgt etwa 3 - 4 Tage. Die Ansteckungsgefahr besteht für die Dauer der Erkrankung und auch noch nach dem Abklingen der Symptome. Die Anzahl der Viren nimmt dabei jedoch stetig ab.

Wie äußert sich die Erkrankung?

Astroviren verursachen starke Magen-Darm-Erkrankungen mit starken, wässrigen Durchfällen und Erbrechen. Dadurch kann es zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust kommen. Weiter Symptome sind Bauchschmerzen und Austrocknung durch den Flüssigkeitsverlust. Eine spezifische Therapie gegen das Virus steht nicht zur Verfügung, sodass nur die Symptome der Krankheit behandelt werden können.

Wie kann ich mich und andere vor Ansteckung schützen?

Zur Vermeidung einer Übertragung durch Schmierinfektion sollten folgende Hygienemaßnahmen eingehalten werden:

- ♣ Verzichten Sie möglichst auf den Kontakt zu den Erkrankten.
- ♣ Waschen Sie sich gründlich die Hände nach jedem Toilettengang, wenn Sie Kontakt zu einem Erkrankten hatten und vor der Zubereitung von Speisen.
- ♣ Zum Trocknen der Hände sollten für jede Person im Haushalt separate Handtücher zur Verfügung stehen.
- ♣ Nach dem Ablegen der Einmalhandschuhe und nach Kontakt zu Erbrochenem, Stuhl oder anderen Ausscheidungen des Erkrankten, kann eine Händedesinfektion mit einem viruswirksamen Händedesinfektionsmittel durchgeführt werden.
- ♣ Bett- und Leibwäsche von Erkrankten sowie Handtücher sollten bei mindestens 60°C gewaschen werden.
- ♣ Wenn die Möglichkeit im häuslichen Bereich besteht, sollte erkrankten Personen eine eigene Toilette zur Verfügung gestellt werden. Personen, die eventuell Kontakt

mit Stuhl oder Erbrochenem eines Erkrankten hatten, sollten für die Dauer der Inkubationszeit und die folgenden 2 Wochen eine besonders gründliche Händehygiene betreiben. - 2 –

Nach § 34 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz dürfen Kinder unter 6 Jahren, die an einer ansteckenden Magen-Darm-Infektion erkrankt oder dessen verdächtig sind, Gemeinschaftseinrichtungen nicht besuchen. **Nach dem Abklingen der klinischen Symptome sowie zusätzlich 48 Stunden ohne Krankheitszeichen kann die Einrichtung wieder besucht werden.**

Darüber hinaus sollen die Einrichtungsleiter über die Erkrankung sowie positive Befunde unterrichtet werden. Alle Beteiligten sind über die notwendigen Hygieneregeln zu informieren und die Beachtung der Hygieneregeln muss über mindestens zwei weitere Wochen sichergestellt sein.

Bilgi Notu: Astrovirüsler – Tarih: Mart 2023

Astrovirüsler nedir?

Astrovirüsler dünya çapında yaygındır ve özellikle çocuklarda mide-bağırsak hastalıklarına (gastroenterit) yol açar. Astrovirüsler tek tek ortaya çıkabilir, ancak okul, anaokulu ve kreş gibi toplu yaşam alanlarında akut gastroenterit salgınlarının da zaman zaman nedeni olabilir.

Astrovirüsler nasıl bulaşır?

En önemli bulaşma yolu insandan insana doğrudan temastır. Virüsler dışkı ile atılır. Daha sonra eller aracılığıyla doğrudan ya da nesneler ve yüzeyler üzerinden (fekal-oral yani bulaştırıcı enfeksiyon) başka insanlara geçebilir.

Bir hasta ne kadar süreyle bulaşıcıdır?

Tek bulaşma kaynağı insandır. Inkübasyon süresi (virüsün alındığı andan hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına kadar geçen süre) yaklaşık 3-4 gündür. Bulaşma riski hastalığın tüm süresi boyunca ve semptomların azaldıktan sonra da devam eder; fakat virüs miktarı zamanla sürekli azalır.

Hastalık nasıl seyreder?

Astrovirüsler şiddetli su gibi ishal ve kusmaya yol açan ciddi mide-bağırsak hastalıkları oluşturur. Bu durum, önemli miktarda sıvı kaybına neden olabilir. Diğer belirtiler arasında karın ağrısı ve sıvı kaybından kaynaklanan dehidratasyon bulunur. Virüse karşı spesifik bir tedavi mevcut değildir; yalnızca hastalığın belirtileri destekleyici tedaviyle yönetilir.

Kendimi ve başkalarını nasıl koruyabilirim?

Bulaştırıcı enfeksiyon (schmierinfektion) riskini azaltmak için aşağıdaki hijyen önlemlerine uyulmalıdır:

- Mümkün olduğunca hasta kişilerle teması sınırlayın.
- Tuvalet kullandıktan sonra, hasta ile temasta bulunduktan sonra ve yemek hazırlamadan önce ellerinizi iyice yıkayın.
- Ellerin kurutulması için evdeki her bireye ayrı bir havlu bulundurun.
- Tek kullanımlık eldivenleri çıkardıktan sonra ve hastanın kusmuğu, dışkısı ya da diğer vücut atıklarıyla temas ettikten sonra, virüse etkili bir el dezenfektanı ile el dezenfeksiyonu yapın.

- Hasta kişilerin yatak ve iç çamaşırları ile havluları en az 60 °C'de yıkanmalıdır.
- Mümkünse, hasta kişiye ev içinde ayrı bir tuvalet tahsis edin.
- Hasta dışkısı veya kusmuğu ile temas eden kişiler, inkübasyon süresi ve ardından gelen 2 hafta boyunca ekstra titiz el hijyenine özen göstermelidir.

> 34. madde, 1. paragraf (Enfeksiyon Koruma Yasası) uyarınca, bulaşıcı bir mide-bağırsak enfeksiyonu geçiren ya da şüpheli olan 6 yaşın altındaki çocuklar, toplu yaşam kurumlarına (okul, kreş vb.) kabul edilmez.

Klinik bulgular hafifledikten ve en az 48 saat hastalık belirtisi gösterilmeden sonra kurum tekrar ziyaret edilebilir.

Ayrıca, kurum yöneticileri hastalık ve pozitif laboratuvar sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir. Tüm ilgili kişiler gerekli hijyen kuralları konusunda uyarılmalı ve bu kurallar en az iki hafta daha titizlikle uygulanmalıdır.

Information Sheet: Astroviruses – Date: March 2023

What are astroviruses?

Astroviruses are found worldwide and cause gastrointestinal illnesses (so-called gastroenteritis), especially in children. They may occur sporadically, but they are also occasionally the cause of acute gastroenteritis outbreaks in communal settings such as schools, kindergartens and daycare centres.

How are astroviruses transmitted?

The most important route is direct human-to-human transmission. The viruses are shed with the stool and can then be transferred to other people via the hands, either directly or indirectly through objects or surfaces (fecal-oral transmission, i.e. “smear infection”).

How long is an infected person contagious?

Humans are the only source of infection. The incubation period (time between infection and appearance of symptoms) is about 3–4 days. The risk of transmission exists for the whole duration of the illness and even after the symptoms have subsided, although the amount of virus steadily declines.

How does the disease present?

Astroviruses cause severe gastrointestinal disease with profuse watery diarrhoea and vomiting, which can lead to a considerable loss of body fluids. Additional symptoms include abdominal pain and dehydration resulting from the fluid loss. No specific antiviral therapy exists, so only the symptoms can be treated supportively.

How can I protect myself and others from infection?

To prevent transmission by smear infection, the following hygiene measures should be observed:

- Avoid contact with ill persons as far as possible.
- Wash your hands thoroughly after every toilet visit, after any contact with a sick person, and before preparing food.
- Provide a separate hand towel for each household member for hand-drying.

- After removing disposable gloves and after contact with vomit, stool or any other excretions of the patient, perform hand disinfection with a virus-effective hand-rub.
- Bed linen, underclothing and towels used by the patient should be washed at a minimum temperature of 60 °C.
- If feasible at home, assign a dedicated toilet to the infected person.
- Anyone who may have been in contact with the patient's stool or vomit should practice especially thorough hand hygiene for the entire incubation period and for the following two weeks.

> According to § 34 Abs. 1 of the German Infection Protection Act, children under 6 years of age who are suffering from or are suspected of having a contagious gastrointestinal infection must not attend communal facilities.

After the clinical symptoms have resolved and after an additional 48 hours without any signs of disease, the facility may be visited again.

Furthermore, the facility managers should be informed about the illness and any positive test results. All parties involved must be instructed about the required hygiene rules, and strict adherence to these rules must be ensured for at least another two weeks.

ما هي الفيروسات النجمية؟

،الفيروسات النجمية منتشرة في جميع أنحاء العالم وتسبب أمراض الجهاز الهضمي (ما يُعرف بالتهاب المعدة والأمعاء) لا سيما لدى الأطفال. قد تظهر بشكل فردي، لكنها أحياناً تكون السبب في تفشي التهاب المعدة والأمعاء الحاد في الأماكن الجماعية مثل المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.

كيف تُنقل الفيروسات النجمية؟

أهم طريق للانتشار هو الانتقال المباشر من إنسان إلى آخر. تُفرز الفيروسات مع البراز، ثم يمكن نقلها إلى أشخاص (آخرين عبر اليدين، إما مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأشياء أو الأسطح) انتقال براز-فم، أي “عدوى لُطس

إلى متى يكون المصاب معدياً؟

الإنسان هو المصدر الوحيد للعدوى. فترة الحضانة (المدة بين التعرض للفيروس وظهور الأعراض) تبلغ حوالي 3-4 أيام. يستمر خطر العدوى طوال مدة المرض وحتى بعد اختفاء الأعراض، مع تراجع مستمر في عدد الفيروسات.

كيف تظهر أعراض المرض؟

تُسبب الفيروسات النجمية أمراضاً شديدة في الجهاز الهضمي مع إسهال مائي وفقدان للسوائل عن طريق القيء. قد يؤدي ذلك إلى فقدان كبير للسوائل. تشمل الأعراض الأخرى ألماً في البطن وجفافاً نتيجة فقدان السوائل. لا توجد علاج مضاد للفيروس متاح، لذا يُعالج فقط أعراض المرض دعماً

كيف يمكنني حماية نفسي والآخرين من العدوى؟

:للحد من الانتقال عن طريق العدوى اللطسية، يجب الالتزام بإجراءات النظافة التالية

- تجنب الاتصال بالمصابين قدر الإمكان -
- اغسل يديك جيداً بعد كل مرة تستخدم فيها المرحاض، وبعد أي اتصال مع شخص مريض، وقبل تحضير الطعام -
- وفر منشفة يدوية منفصلة لكل فرد في الأسرة لتجفيف اليدين -
- بعد خلع القفازات ذات الاستخدام الواحد وبعد الاتصال بالقيء أو البراز أو أي إفرازات للمريض، قم بتطهير اليدين - باستخدام مطهر يد فعال ضد الفيروسات
- يجب غسل ملائآت السرير والملابس الداخلية والمناشف الخاصة بالمريض على درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة - مئوية

إذا أمكن في المنزل، خصص مرحاضًا منفصلاً للمصاب -

يجب على أي شخص قد يكون قد تلامس مع براز أو قيء المريض أن يطبق نظافة يديوة دقيقة طوال فترة الحضانة -
وعلى مدى الأسبوعين التاليين

وفقًا للفقرة 1 من المادة 34 من قانون الوقاية من العدوى الألمانى، لا يجوز للأطفال دون 6 سنوات الذين يعانون من >
عدوى معدية في الجهاز الهضمي أو يُشتبه في إصابتهم بها حضور المرافق الجماعية

بعد زوال الأعراض السريرية ومرور 48 ساعة إضافية دون أي علامات للمرض، يمكن العودة إلى المرافق مرة
أخرى.

علاوة على ذلك، يجب إبلاغ مديري المرافق عن المرض وأي نتائج مختبرية إيجابية. يجب إطلاع جميع الأطراف
المعنية على قواعد النظافة اللازمة، ويجب ضمان الالتزام بهذه القواعد لمدة لا تقل عن أسبوعين إضافيين