

Vademecum della cassetta di primo soccorso

Per lo staff: cosa contiene la cassetta e come usare correttamente i presidi in uscita e al campo

Bozza da validare. Prima di usarlo come riferimento, fatelo rileggere a un medico o a un infermiere dello staff, del Gruppo o della Sezione. Non sostituisce un corso di primo soccorso.

Il primo soccorso è la prima assistenza a una persona infortunata, in attesa dei soccorsi qualificati. Funziona solo se sappiamo usare bene i presidi che abbiamo. **Nei casi gravi o nel dubbio si chiama subito il 112.**

Il referente del primo soccorso porta la cassetta, ne conosce il contenuto e lo controlla prima di ogni attività. Il primo soccorso però resta compito di tutto lo staff: tutti devono sapere dov'è la cassetta.

1. Prima di ogni uscita: il controllo

- Il contenuto è completo? Reintegrate quello che è stato usato l'ultima volta.
- Scadenze: farmaci, disinfettante, soluzione fisiologica, garze sterili.
- Le liberatorie per la somministrazione dei farmaci sono con voi, insieme alle schede sanitarie?
- Il foglio con i numeri utili è aggiornato con il luogo dell'attività?

2. Contenuto minimo — presidi e medicazioni (uso libero)

Guanti monouso (non in lattice) NUOVO	Da indossare sempre prima di toccare ferite o sangue. Diverse paia, in più taglie.
Flaconi o fiale di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)	Per pulire le ferite, togliere corpi estranei dagli occhi, diluire sostanze corrosive nelle ustioni chimiche. Una volta aperto, il flacone va eliminato.
Disinfettante senza alcool (es. Amuchina Med; il Betadine tinge la pelle)	Per ferite lievi, abrasioni, escoriazioni, punture d'insetto. Prima pulire con fisiologica o acqua potabile, poi applicare dal centro verso l'esterno con garza sterile. Usare entro 10 giorni dall'apertura.
Garze sterili 10×10 in buste singole	Pulizia, disinfezione e protezione delle ferite. Mantenere la sterilità; una garza aperta non si riusa.
Garze sterili 18×40 in buste singole	Come sopra, per ferite più estese.
Pinzetta per zecche	Per togliere le zecche in modo sicuro, senza schiacciarle. Segnate data e punto del morso e avvisate la famiglia.
Rete elastica (misura media)	Per fissare le medicazioni, sopra la garza (mai a contatto diretto con la ferita). Non stringere troppo.
Cerotti pronti di varie misure	Per piccole ferite e abrasioni, su pelle pulita, asciutta e disinfettata.
Steri-strip	Per avvicinare i bordi di piccole ferite nette che sanguinano poco. Su pelle pulita e asciutta. Ferite profonde o che non si chiudono: pronto soccorso.
Rotolo di cerotto (2,5 cm)	Per fermare garze e bende; mai direttamente sulla ferita né a giro completo attorno all'arto.
Forbici tagliabiti	Per tagliare cerotti, bende, confezioni e, se serve, i vestiti.

Ghiaccio istantaneo	Per contusioni, distorsioni, punture. Mettere sempre un panno o una garza tra busta e pelle.
Termometro	Per misurare la temperatura; pulirlo dopo ogni uso.
Benda orlata (10 cm)	Per bendaggi, compressione in caso di emorragia, immobilizzazioni di fortuna.
Benda coesiva	Fasciatura elastica autoaderente per fissare medicazioni e per immobilizzazioni leggere.
Cerotti per vesciche	Su pelle pulita e asciutta. Utili anche per prevenire, al primo fastidio.
Telo isotermico (coperta d'emergenza) NUOVO	Per proteggere dal freddo una persona infortunata o bagnata, in attesa dei soccorsi.
Mascherina tascabile per la rianimazione NUOVO	Per le ventilazioni durante la rianimazione cardiopolmonare, solo per chi è formato.
Sacchetto per i rifiuti sanitari NUOVO	Per garze, guanti e materiale sporco di sangue: non lasciarli in giro.
Assorbenti	In varie misure, sempre in dotazione.
Foglio con i numeri utili NUOVO	Vedi in fondo: da compilare prima di ogni uscita.

3. Farmaci — solo con la liberatoria dei genitori

La regola. Un farmaco si dà solo se la liberatoria per la somministrazione, firmata dai genitori, lo prevede per **quel** ragazzo o ragazza. Si seguono le indicazioni della liberatoria, della prescrizione medica se c'è, e del foglietto illustrativo. Annotate sempre cosa avete dato, a chi, quando e quanto, e avvisate la famiglia. Nel dubbio non si dà nulla e si chiama il 112 o la guardia medica.

Lupetti e Lupette (8-11 anni). Molti farmaci hanno dosi e limiti diversi per i bambini o non sono indicati: controllate sempre il foglietto per l'età e il peso. L'antidiarroico (es. Imodium) **non va dato sotto i 12 anni**.

Antipiretico (paracetamolo: es. Tachipirina, Efferalgan)	Per febbre e dolori lievi o medi. Rispettare gli intervalli (di solito 6-8 ore) e le dosi del foglietto, in base a età e peso.
Antinfiammatorio FANS (es. ibuprofene)	Per dolore e gonfiore da traumi, mal di denti, dolori muscolari o mestruali. A stomaco pieno.
Pomata per scottature (es. Connettivina, Foille, Biafin)	Su ustioni lievi, eritemi solari, abrasioni superficiali, su pelle pulita e asciutta.
Pomata antistaminica (es. Fenistil gel)	Per prurito e gonfiore da punture d'insetto o piccole reazioni della pelle. Evitare il sole sulla zona trattata.
Pomata cortisonica (es. idrocortisone)	Per reazioni della pelle più intense. Poca quantità e per pochi giorni.
Pomata antibiotica	Per piccole ferite infette. Se la ferita peggiora: medico.
Antidiarroico occasionale (es. Imodium)	Per la diarrea acuta occasionale. Non sotto i 12 anni. Insieme ai sali reidratanti.
Antistaminico per bocca (es. cetirizina)	Per reazioni allergiche diffuse. Una reazione con gonfiore di viso o gola, o difficoltà a respirare, è un'emergenza: 112.
Antinausea (es. Xamamina)	Per il mal d'auto o di pullman nei trasferimenti.

Antiacido (es. Maalox)	Per mal di stomaco e bruciore occasionale.
Pastiglie o spray per la gola	Per il mal di gola.

Farmaci personali (terapie, allergie, asma...): li consegna la famiglia, in confezione integra e con il nome, insieme alla liberatoria. Li tiene il referente del primo soccorso, separati dal resto della cassetta.

4. Prodotti da banco utili (non farmaci)

Sali minerali / integratori	Contro la disidratazione da caldo e fatica prolungata.
Sali reidratanti orali (ORS)	In caso di vomito o diarrea: reidratarsi conta più che bloccare i sintomi.
Spray nasale di soluzione fisiologica	Per il naso chiuso o irritato.
Collirio monodose per lavaggio oculare	Per corpi estranei o lievi irritazioni dell'occhio.
Repellente per zanzare e zecche	Secondo le indicazioni del prodotto e l'età, soprattutto nei boschi e nell'erba alta.
Crema solare alta protezione (SPF 30/50)	Per tutte le attività all'aperto.
Gel doposole / aloe	Per lenire la pelle dopo il sole.

5. Numeri utili — da compilare prima di ogni uscita

Emergenze	112
Guardia medica del luogo	
Pronto soccorso più vicino (indirizzo)	
Farmacia più vicina	
Referente del luogo (casa, base, proprietario)	
Capo Unità	
Referente del primo soccorso	

Adattato da un vademecum di un campo tecnico CNGEI. Versione di lavoro, ottobre 2026: le indicazioni su farmaci e dosi vanno verificate da personale sanitario.