



Vademecum della cassetta di primo soccorso

Per lo staff: cosa contiene la cassetta e come usare correttamente i presidi in uscita e al campo

Il primo soccorso è la prima assistenza a una persona infortunata, in attesa dei soccorsi qualificati. Funziona solo se sappiamo usare bene i presidi che abbiamo. **Nei casi gravi o nel dubbio si chiama subito il 112.**

Il referente del primo soccorso porta la cassetta, ne conosce il contenuto e lo controlla prima di ogni attività. Il primo soccorso però resta compito di tutto lo staff: tutti devono sapere dov'è la cassetta.

1. Prima di ogni uscita: il controllo

- Il contenuto è completo? Reintegrate quello che è stato usato l'ultima volta.
- Scadenze: farmaci, disinfettante, soluzione fisiologica, garze sterili.
- Le liberatorie per la somministrazione dei farmaci sono con voi, insieme alle schede sanitarie?
- Il foglio con i numeri utili è aggiornato con il luogo dell'attività?

2. Somministrazione farmaci

La regola. Un farmaco si dà solo se la liberatoria per la somministrazione, firmata dai genitori, lo prevede per **quel** ragazzo o ragazza. Si seguono le indicazioni della liberatoria e della prescrizione medica (in corso di validità).

3. Contenuto minimo — presidi e medicazioni (uso libero)

Guanti monouso (non in lattice)	Da indossare sempre prima di toccare ferite o sangue. Diverse paia, in più taglie.
Flaconi o fiale di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)	Per pulire le ferite, togliere corpi estranei dagli occhi, diluire sostanze corrosive nelle ustioni chimiche. Una volta aperto, il flacone va eliminato.
Disinfettante senza alcool (es. Amuchina Med; il Betadine tinge la pelle)	Per ferite lievi, abrasioni, escoriazioni, punture d'insetto. Prima pulire con fisiologica o acqua potabile, poi applicare dal centro verso l'esterno con garza sterile. Usare entro 10 giorni dall'apertura.
Garze sterili 10×10 in buste singole	Pulizia, disinfezione e protezione delle ferite. Mantenere la sterilità; una garza aperta non si riusa.
Garze sterili 18×40 in buste singole	Come sopra, per ferite più estese.
Pinzetta per zecche	Per togliere le zecche in modo sicuro, senza schiacciarle. Segnate data e punto del morso e avvisate la famiglia.
Rete elastica (misura media)	Per fissare le medicazioni, sopra la garza (mai a contatto diretto con la ferita). Non stringere troppo.
Cerotti pronti di varie misure	Per piccole ferite e abrasioni, su pelle pulita, asciutta e disinfettata.
Steri-strip	Per avvicinare i bordi di piccole ferite nette che sanguinano poco. Su pelle pulita e asciutta. Ferite profonde o che non si chiudono: pronto soccorso.
Rotolo di cerotto (2,5 cm)	Per fermare garze e bende; mai direttamente sulla ferita né a giro completo attorno all'arto.
Forbici tagliabiti	Per tagliare cerotti, bende, confezioni e, se serve, i vestiti.
Ghiaccio istantaneo	Per contusioni, distorsioni, punture. Mettere sempre un panno o una garza tra busta e pelle.

Termometro	Per misurare la temperatura; pulirlo dopo ogni uso.
Benda orlata (10 cm)	Per bendaggi, compressione in caso di emorragia, immobilizzazioni di fortuna.
Benda coesiva	Fasciatura elastica autoaderente per fissare medicazioni e per immobilizzazioni leggere.
Cerotti per vesciche	Su pelle pulita e asciutta. Utili anche per prevenire, al primo fastidio.
Telo isotermico (coperta d'emergenza)	Per proteggere dal freddo una persona infortunata o bagnata, in attesa dei soccorsi.
Mascherina tascabile per la rianimazione	Per le ventilazioni durante la rianimazione cardiopolmonare, solo per chi è formato.
Sacchetto per i rifiuti sanitari	Per garze, guanti e materiale sporco di sangue: non lasciarli in giro.
Assorbenti	In varie misure, sempre in dotazione.
Foglio con i numeri utili	Vedi in fondo: da compilare prima di ogni uscita.

4. Prodotti da banco utili (non farmaci)

Sali minerali / integratori	Contro la disidratazione da caldo e fatica prolungata.
Sali reidratanti orali (ORS)	In caso di vomito o diarrea: reidratarsi conta più che bloccare i sintomi.
Fermenti lattici (integratori)	In caso di diarrea, insieme ai sali reidratanti. Controllate l'etichetta per chi è intollerante al lattosio o allergico al latte.
Spray nasale di soluzione fisiologica	Per il naso chiuso o irritato.
Collirio monodose per lavaggio oculare	Per corpi estranei o lievi irritazioni dell'occhio.
Repellente per zanzare e zecche	Secondo le indicazioni del prodotto e l'età, soprattutto nei boschi e nell'erba alta.
Crema solare alta protezione (SPF 30/50)	Per tutte le attività all'aperto.
Gel doposole / aloe	Per lenire la pelle dopo il sole.

5. Farmaci da tenere nella cassetta

Tutti i farmaci elencati si comprano in farmacia **senza ricetta** (farmaci da banco, SOP/OTC), nella confezione indicata. Restano però farmaci.

Prima di somministrarli bisogna sempre avvisare i genitori e ricevere il loro **consenso scritto e tracciabile**: per esempio una mail che documenti lo scambio. Il consenso tutela i ragazzi e le ragazze, che potrebbero essere allergici a qualcosa che non sappiamo, e tutela lo staff, perché dimostra che ha agito d'accordo con la famiglia. Controllate sempre sul foglietto età, peso e dosi.

Farmaco	A cosa serve	Senza ricetta / età
Antipiretico: paracetamolo (es. Tachipirina 500 mg)	Febbre e dolori lievi o medi. Intervalli e dosi del foglietto, in base a età e peso.	Sì, nelle confezioni da 500 mg. Tachipirina 1000 mg richiede la ricetta.
Antinfiammatorio: ibuprofene 200 mg (es. Moment)	Dolore e gonfiore da traumi, mal di denti, dolori muscolari o mestruali. A stomaco pieno.	Sì. Compresse dai 12 anni ; per i più piccoli esistono formulazioni pediatriche.

Pomata per scottature (es. Foille; Connettivina, Biafin)	Ustioni lievi, eritemi solari, abrasioni superficiali, su pelle pulita e asciutta.	Sì (alcune sono dispositivi medici).
Gel antistaminico (es. Fenistil gel)	Prurito e gonfiore da punture d'insetto o piccole reazioni della pelle. Evitare il sole sulla zona trattata.	Sì.
Crema al cortisone leggera: idrocortisone 0,5% (es. Lenirit)	Reazioni della pelle più intense. Poca quantità; se dopo 7 giorni non migliora, medico.	Sì. Non sotto i 2 anni.
Pomata antibiotica (es. Cicatrene crema)	Piccole ferite infette. Se la ferita peggiora: medico.	Sì.
Antidiarroico: loperamide 2 mg (es. Imodium)	Diarrea acuta occasionale. Prima si punta su sali reidratanti e, se si vuole, fermenti lattici (vedi capitolo 4); l'antidiarroico solo se serve davvero, al massimo 2 giorni.	Sì. Non sotto i 12 anni senza il medico (sotto i 6 mai).
Antistaminico per bocca: cetirizina 10 mg	Reazioni allergiche diffuse. Gonfiore di viso o gola, o difficoltà a respirare: emergenza, 112.	Sì. Dai 6 anni (6-12 anni mezza compressa).
Antinausea: dimenidrinato (es. Xamamina)	Mal d'auto o di pullman nei trasferimenti, mezz'ora prima di partire.	Sì. Da 50 mg per gli adulti; per i bambini c'è Xamamina Bambini 25 mg.
Antiacido (es. Maalox)	Mal di stomaco e bruciore occasionale.	Sì.
Pastiglie o spray per la gola (es. Golasan, Neoborocillina)	Mal di gola.	Sì. Controllare l'età sul foglietto.

Lupetti e Lupette (8-11 anni). Diversi farmaci della tabella hanno formulazioni o dosi diverse per i bambini, o non sono indicati: per la Branca L tenete in cassetta le versioni pediatriche e controllate sempre età e peso.

Farmaci personali (terapie, allergie, asma...): li consegna la famiglia, in confezione integra e con il nome, insieme alla liberatoria. Li tiene il referente del primo soccorso, separati dal resto della cassetta.

6. Numeri utili — da compilare prima di ogni uscita

Emergenze	112
Guardia medica del luogo	
Pronto soccorso più vicino (indirizzo)	
Farmacia più vicina	
Referente del luogo (casa, base, proprietario)	
Capo Unità	
Referente del primo soccorso	

Adattato da un vademecum di un campo tecnico CNGEI. Ottobre 2026.