

1 Całkowanie numeryczne

Kwadratura jest rzędu r jeśli jest dokładna dla wszystkich wielomianów stopnie $r - 1$ oraz istnieje wielomian stopnia r dla której nie jest dokładna

1.1 Trapezy $\xi \in (a, b)$ $E(f) = I(f) - S(f)$

$$E(f) = - \sum_{k=1}^N \frac{H^3 f''(\xi_k)}{12} = - \frac{(b-a)^3}{12N^2} f''(\xi)$$

1.2 Prostokąty $\xi \in (a, b)$ $E(f) = I(f) - S(f)$

$$E(f) = \frac{(b-a)^3}{24N^2} f''(\xi) = \frac{H^2}{24} (b-a) f''(\xi)$$

1.3 Simpson $\xi \in (a, b)$ $E(f) = I(f) - S(f)$

$$E(f) = - \sum_{k=1}^N \frac{H^5 f^{(4)}(\xi_k)}{90 \cdot 2^5} = - \frac{(b-a)^5}{2880N^4} f^{(4)}(\xi)$$

1.4 Złożona S_1 na $[a, b]$ S_2 na $[c, d]$

$$\begin{aligned} \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy &\approx S_2(S_1(f)) = \\ &= \sum_{j=0}^m B_j \left(\sum_{i=0}^n (A_i f(x_i, y_j)) \right) \end{aligned}$$

$$\max_{y \in [c, d]} \left| S_1(f)(y) - \int_a^b f(x, y) dx \right| \leq e_1$$

$$\max_{x \in [a, b]} \left| S_2(f)(x) - \int_c^d f(x, y) dy \right| \leq e_2$$

$$\left| S(f) - \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy \right| \leq (d-c)e_1 + (b-a)e_2$$

1.5 Na trójkącie P pole

formuła rzędu 2:

$$P \cdot f(p_{012}) \text{ gdzie } p_{012} = \frac{1}{3}(p_0 + p_1 + p_2)$$

formuła rzędu 3:

$$\frac{P}{3} \cdot [f(p_{01}) + f(p_{12}) + f(p_{02})] \text{ gdzie } p_{ij} = \frac{1}{2}(p_i + p_j)$$

formuła rzędu 4:

$$\frac{P}{60} [27f(p_{012}) + 3(f(p_0) + f(p_1) + f(p_2)) + 8(f(p_{01}) + f(p_{12}) + f(p_{02}))]$$

1.6 Gaussa-Legendre'a

Rząd kwadratury równy jest ilości parametrów które ustalamy (dla Gaussa przy liczeniu węzłów od 0 mamy $2n + 2$)

Błąd kw. złożonej Gaussa-Legendre'a:

$$(b-a)^5 \frac{1}{4320N^4} f^{(4)}(\xi)$$

2 Aproksymacja

Tw. Element $f^* \in U$ jest elementem optymalnym dla $f \in V$ ($U \subset V$) względem przestrzeni $U \iff$ dla dowolnego $g \in U$ $\langle f^* - f, g \rangle = 0$ (a więc $f^* - f$ jest ortogonalny do U)

$$\text{ciągła } \langle f, g \rangle = \int_a^b w(x) f(x) g(x) dx$$

$$\text{dyskretna } \langle f, g \rangle = \sum_{i=0}^N w_i f(x_i) g(x_i)$$

Konstruujemy macierz $G = [\langle g_i, g_j \rangle]_{i,j=0}^n$ (w wierszu nie zmienia się to co na pierwsze w iloczynie) wektor $d = [\langle g_i, f_i \rangle]_{i=0}^n$ i szukamy rozwiązania $Ax = d$
Dla dyskretnej można $M = [f_j(x_i)]_{i,j=0}^n$ (w wierszu te same x_i) $G = M^T M$ $d = M^T F$ gdzie F to wektor dany z wartościami przybliżanej funkcji

3 Splajny

$S'(a) = f'(a)$, $S'(b) = f'(b)$ - warunki Hermite'a
 $S'(a) = S'(b)$, $S''(a) = S''(b)$ - warunki cykliczne
 $S''(a) = S''(b) = 0$ naturalna funkcja splejana

$$\text{nota-knot: } \begin{cases} S(\frac{x_0+x_1}{2}) = \frac{f(x_0)+f(x_1)}{2}, \\ S(\frac{x_{n-1}+x_n}{2}) = \frac{f(x_{n-1})+f(x_n)}{2}, \end{cases}$$

Funkcja splejana n -tego stopnia to jest, że jest klasy C^{n-1}

Δ_n - siatka, podział przedziału $[a, b]$ tż.

$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.

$S_m(\Delta_n, k)$ - przestrzeń funkcji splejanych, tż.: 1) są klasy $C^k([a, b])$, 2) ich obcięcie do każdego z podprzedziałów $[x_i, x_{i+1}]$ $i = 0, 1, \dots, n-1$ jest wielomianem stopnia co najwyżej m .

3.1 $S_1(\Delta_n, 0)$

$$\varphi_0(x) = \frac{x_1-x}{x_1-x_0}, x \in [x_0, x_1]$$

$$\varphi_n(x) = \frac{x-x_{n-1}}{x_n-x_{n-1}}, x \in [x_{n-1}, x_n]$$

$$\varphi_i(x) = \begin{cases} \frac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}}, x \in [x_{i-1}, x_i] \\ \frac{x_{i+1}-x}{x_{i+1}-x_i}, x \in [x_i, x_{i+1}] \end{cases}$$

W pozostałych punktach wszystkie funkcje mają wartość 0.

3.2 $S_3(\Delta_n, 2)$

Węzły równo odległe, $x_i = a + ih$, $h = \frac{b-a}{n}$, $i = 0, \dots, n$.

$$\frac{1}{h^3} \begin{cases} (x-x_{i-2})^3 \\ h^3 + 3h^2(x-x_{i-1}) + 3h(x-x_{i-1})^2 - 3(x-x_{i-1})^3 \\ h^3 + 3h^2(x_{i+1}-x) + 3h(x_{i+1}-x)^2 - 3(x_{i+1}-x)^3 \\ (x_{i+2}-x)^3 \\ 0 \end{cases}$$

Funkcja splejana: $S(x) = \sum_{k=-1}^{n+1} \alpha_k B_k(x)$,

4 Metoda iteracji prostej

Tw. D zbiór domknięty w \mathbb{R} oraz niech $g : D \rightarrow D$ i jest odwzorowaniem zwracającym wtedy metoda iteracji

prostej g jest zbieżna na D do dokładnie jednego rozwiązania.

Jeśli g jest ciągła i D jest domknięty to mamy

$$g(x_1) - g(x_0) = g'(\xi)(x_1 - x_0)$$

g' to macierz Jakobiego

ponadto:

$$||g(x_1) - g(x_0)|| = ||g'(\xi)(x_1 - x_0)|| \leq ||g'(\xi)|| ||x_1 - x_0||$$

jeśli $||g'(\xi)|| < 1$ to mamy odwzorowanie zwężające.

Ograniczając z góry każdy wyraz z macierzy g' otrzymamy macierz A i zachodzi $||g'(\xi)|| < ||A||$ (jeśli ograniczaliśmy \leq analogicznie)