

## Rappels (non exhaustifs) du cours pour le TD4

\* L'état d'un système quantique est représenté par un vecteur (ket)  $|\phi\rangle$  d'un espace de Hilbert.

\* A chaque physique  $A$ , on associe un opérateur  $\hat{A}$  qui agit sur les kets. Cet opérateur est auto-adjoint :

$$\hat{A}^\dagger = \hat{A}$$

Il existe toujours (au moins) une base orthonormée de vecteurs propres de  $\hat{A}$ . Les valeurs propres de  $\hat{A}$  sont réelles.

Notons  $\lambda \in \mathbb{R}$  les valeurs propres de  $\hat{A}$  et  $g_\lambda$  le degré de dégénérescence de la valeur propre  $\lambda$ .

On peut alors noter  $|\lambda^i\rangle$  une base orthonormée de vecteurs propres de  $\hat{A}$  (ou  $i$  varie entre 1 et  $g_\lambda$ ).

N'importe quel ket  $|\psi\rangle$  peut se décomposer sur cette base :

$$|\psi\rangle = \sum_{\lambda} \sum_{i=1}^{g_\lambda} c_{\lambda}^i |\lambda^i\rangle \quad \text{avec } c_{\lambda}^i \in \mathbb{C}$$

\* Si on fait une mesure de la grandeur  $A$ , on peut mesurer uniquement une valeur propre  $\lambda$ .

La probabilité de mesurer  $\lambda$  est:

$$P(\lambda) = \sum_{i=1}^{g_\lambda} |c_\lambda^i|^2 = \sum_{i=1}^{g_\lambda} |\langle \lambda^i | \psi \rangle|^2$$

Immédiatement après la mesure, le système est projeté sur le sous-espace vectoriel des vecteurs propres associés à la valeur propre  $\lambda$  qui a été mesurée:

$$|\psi\rangle_{\text{après}} = \sum_{i=1}^{\lambda} c_\lambda^i |\lambda^i\rangle = \underbrace{\sum_{i=1}^{\lambda} |\lambda^i\rangle \langle \lambda^i|}_{\text{Projecteur sur le sous-espace vectoriel des vecteurs propres associés à } \lambda} |\psi\rangle$$

(Bien sûr, il faut normaliser l'état  $|\psi\rangle_{\text{après}}$ )

Projecteur sur le sous-espace vectoriel des vecteurs propres associés à  $\lambda$ .

\* Entre deux mesures, le système évolue suivant l'équation de Schrödinger:

$$i\hbar \frac{d|\psi\rangle}{dt} = \hat{H}|\psi\rangle$$

\* Si le Hamiltonien ne dépend pas du temps, une

méthode pour résoudre l'équation de Schrödinger est de chercher les états propres  $|E\rangle$  du Hamiltonien. (i.e. de diagonaliser le Hamiltonien).

Ces états sont dits stationnaires et leur évolution est triviale.

$$\text{Si } |\psi(t=0)\rangle = |E\rangle, \text{ alors } |\psi(t)\rangle = e^{\frac{-iEt}{\hbar}} |E\rangle$$

En général, on peut toujours écrire:

$$|\psi(t=0)\rangle = \sum_E c_E |E\rangle \quad \text{avec } c_E \in \mathbb{C}$$

$$\text{Et alors } |\psi(t)\rangle = \sum_E c_E e^{\frac{-iEt}{\hbar}} |E\rangle$$

Cette méthode pour résoudre l'équation de Schrödinger est appelée "équation de Schrödinger indépendante du temps".

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (|0^1\rangle + i|0^2\rangle + |1\rangle)$$

Si je mesure  $\begin{matrix} 1 \\ \hline 0 \end{matrix}$

$$|\psi_{\text{après}}\rangle = |1\rangle$$

$$|\psi_{\text{après}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0^1\rangle + i|0^2\rangle)$$