1 SchemeAAIBME

1.1 Setup$(n, d) \rightarrow (\boldsymbol{mpk}, \boldsymbol{msk})$

$g \leftarrow 1_{\mathbb{G}_1}$
generate $\alpha, \beta, t_1, t_2, t_3, t_4 \in \mathbb{Z}_r$ randomly
generate $g_2, g_3 \in \mathbb{G}_1$ randomly
generate $\boldsymbol{T} \leftarrow (\boldsymbol{T}_0, \boldsymbol{T}_1, \cdots, \boldsymbol{T}_n) \in \mathbb{G}_1^{n+1}$ randomly
generate $\boldsymbol{T}' \leftarrow (\boldsymbol{T}'_0, \boldsymbol{T}'_1, \cdots, \boldsymbol{T}'_n) \in \mathbb{G}_1^{n+1}$ randomly
generate $\boldsymbol{u} \leftarrow (\boldsymbol{u}_0, \boldsymbol{u}_1, \cdots, \boldsymbol{u}_n) \in \mathbb{G}_{\nVdash}{}^{n+1}$ randomly
generate $\boldsymbol{u}' \leftarrow (\boldsymbol{u}'_0, \boldsymbol{u}'_1, \cdots, \boldsymbol{u}'_n) \in \mathbb{G}_1^{n+1}$ randomly
$H_1 : \{0,1\}^* \rightarrow \mathbb{G}_1$
$g_1 \leftarrow g^{\alpha}$
$g'_1 \leftarrow g^{\beta}$
$Y_1 \leftarrow e(g_1, g_2)^{t_1 t_2}$
$Y_2 \leftarrow e(g_3, g)^{\beta}$
$v_1 \leftarrow g^{t_1}$
$v_2 \leftarrow g^{t_2}$
$v_3 \leftarrow g^{t_3}$
$v_4 \leftarrow g^{t_4}$
$mpk \leftarrow (g_1, g'_1, g_2, g_3, Y_1, Y_2, v_1, v_2, v_3, v_4, \boldsymbol{u}, \boldsymbol{T}, \boldsymbol{u}', \boldsymbol{T}', H_1)$
$msk \leftarrow (g_2^{\alpha}, \beta, t_1, t_2, t_3, t_4)$
return (mpk, msk)

1.2 EKGen$(\boldsymbol{ID}_A) \rightarrow \boldsymbol{ek_{ID_A}}$

$g \leftarrow 1_{\mathbb{G}_1}$
$H : \boldsymbol{u} \leftarrow (\boldsymbol{u}_0, \boldsymbol{u}_1, \cdots, \boldsymbol{u}_n), ID \leftarrow (ID_1, ID_2, \cdots, ID_n) \rightarrow \boldsymbol{u}_0 \prod_{j \in [1,n]} \boldsymbol{u}_j^{ID_j}$
generate $\vec{r} = (r_1, r_2, \cdots, r_n) \in \mathbb{Z}_r^n$ randomly
generate a $(d-1)$ degree polynominal $q(x)$ s.t. $q(0) = \beta$ randomly
$ek_{ID_{A_i}} \leftarrow (g_3^{q(i)}[H(\boldsymbol{u}', ID_A)T'_i]^{r_i}, g^{r_i}), \forall i \in \{1, 2, \cdots, n\}$
generate $ek_{ID_A}(S) \subset ek_{ID_A}$ s.t. $\|ek_{ID_A}(S)\| = d$ randomly
return $ek_{ID_A}(S)$

1.3 DKGen$(\boldsymbol{id}_B) \rightarrow \boldsymbol{dk_{ID_B}}$

$g \leftarrow 1_{\mathbb{G}_1}$
$H : \boldsymbol{u} \leftarrow (\boldsymbol{u}_0, \boldsymbol{u}_1, \cdots, \boldsymbol{u}_n), ID \leftarrow (ID_1, ID_2, \cdots, ID_n) \rightarrow \boldsymbol{u}_0 \prod_{j \in [1,n]} \boldsymbol{u}_j^{ID_j}$
generate $\vec{k}_1 = (k_{1,1}, k_{1,2}, \cdots, k_{1,n}) \in \mathbb{Z}_r^n$ randomly
generate $\vec{k}_2 = (k_{2,1}, k_{2,2}, \cdots, k_{2,n}) \in \mathbb{Z}_r^n$ randomly
$dk_{ID_{B_i}} \leftarrow (g^{k_{1,i}t_1t_2 + k_{2,i}t_3t_4} g_2^{-\alpha t_2} [H(\boldsymbol{u}, ID_B)T_i]^{k_{1,i}t_2} g_2^{-\alpha t_1} [H(\boldsymbol{u}, ID_B)T_i]^{k_{1,i}t_1} [H(\boldsymbol{u}, ID_B)T_i]^{k_{2,i}t_4} [H(\boldsymbol{u}, ID_B)T_i]^{k}$
$\{1, 2, \cdots, n\}$
generate $dk_{ID_B}(S') \subset dk_{ID_B}$ s.t. $\|dk_{ID_B}(S')\| = d$ randomly
return $dk_{ID_B}(S')$

1.4 $\mathbf{Enc}(\boldsymbol{ek_{ID_A}}, M) \rightarrow \boldsymbol{CT}$

$g \leftarrow 1_{\mathbb{G}_1}$
$\Delta : i, S, x \rightarrow \prod_{j \in S, j \neq i} \frac{x-j}{i-j}$
$N \leftarrow (1, 2, \cdots, n+1)$
$T : x \rightarrow g_2^{x^n} \prod_{i=1}^{n+1} t_i^{\Delta(i,N,x)}$
$H : x \rightarrow g_3^{x^n} \prod_{i=1}^{n+1} l_i^{\Delta(i,N,x)}$
generate $s, s_1, s_2, \tau \in \mathbb{Z}_r$ randomly
$K_s \leftarrow Y_1^s$
$K_l \leftarrow Y_2^s \cdot \hat{e}(g_3, g^{-\tau})$
$C_0 \leftarrow M \cdot K_s \cdot K_l$
$C_1 \leftarrow \eta_1^{s-s_1}$
$C_2 \leftarrow \eta_2^{s_1}$
$C_3 \leftarrow \eta_3^{s-s_2}$
$C_4 \leftarrow \eta_4^{s_2}$
$C_{1,i} \leftarrow T(b_i)^s, \forall b_i \in P_B$
$C_{2,i} \leftarrow H(a_i)^s, \forall a_i \in ID_A$
generate a $(d-1)$ degree polynominal $l(x)$ s.t. $l(0) = \tau$ randomly
generate $\vec{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n) \in \mathbb{Z}_r^n$ randomly
generate $\vec{\chi} = (\chi_1, \chi_2, \cdots, \chi_n) \in \mathbb{Z}_r^n$ randomly
$C_{3,i} \leftarrow e_i \cdot g^{\xi_i}, \forall i \in \{1, 2, \cdots, n\}$
$C_{4,i} \leftarrow g^{\chi_i}, \forall i \in \{1, 2, \cdots, n\}$
$C_{5,i} \leftarrow E_i^s \cdot g_3^{l(a_i)} H(a_i)^{s \cdot \xi_i} \cdot H_1(C_0||C_1||C_2||C_3||C_4||C_{1,i}||C_{2,i}||C_{3,i}||C_{4,i})^{\chi_i}$
$CT \leftarrow (C_0, C_1, C_2, C_3, C_4, \vec{C}_1, \vec{C}_2, \vec{C}_3, \vec{C}_4, \vec{C}_5)$
return CT

1.5 $\mathbf{Dec}(\boldsymbol{dk}_{S_B,P_A}, S_B, P_A, \boldsymbol{CT}) \rightarrow M$

$W'_A \leftarrow ID_A \cap P_A$
$W'_B \leftarrow S_B \cap P_B$
if $|W'_A| \leqslant d \wedge |W'_B| \leqslant d$ **then**
  generate $W_A \subset W'_A$ s.t. $|W_A| = d$ randomly
  generate $W_B \subset W'_B$ s.t. $|W_B| = d$ randomly
  $g \leftarrow 1_{\mathbb{G}_1}$
  $\Delta : i, S, x \rightarrow \prod_{j \in S, j \neq i} \frac{x-j}{i-j}$
  $K'_s \leftarrow \prod_{b_i \in W_B} (\hat{e}(C_{1,i}, dk_{S_{B_{0,i}}})\hat{e}(C_1, dk_{S_{B_{1,i}}})\hat{e}(C_2, dk_{S_{B_{2,i}}})\hat{e}(C_3, dk_{S_{B_{3,i}}})\hat{e}(C_4, dk_{S_{B_{4,i}}}))^{\Delta(b_i, W_B, 0)}$
  $CT_i \leftarrow C_0||C_1||C_2||C_3||C_4||C_{1,i}||C_{2,i}||C_{3,i}||C_{4,i}, \forall i \in \{1, 2, \cdots, n\}$
  $K'_l \leftarrow \prod_{a_i \in W_A} \left(\frac{\hat{e}(C_{1,i}, dk_{P_{A_{0,i}}})\hat{e}(C_1, dk_{P_{A_{1,i}}})\hat{e}(C_2, dk_{P_{A_{i,2}}})}{\hat{e}(H_1(CT_i), C_{4,i}) \cdot \hat{e}(C_{3,i}, C_{2,i})} \cdot \hat{e}(C_3, dk_{P_{A_{i,3}}})\hat{e}(C_4, dk_{P_{A_{i,4}}})\hat{e}(C_{5,i}, g) \right)^{\Delta(a_i, W_A, 0)}$
  $M \leftarrow C_0 \cdot K'_s \cdot K'_l$
else
  $M \leftarrow \perp$
end if
return M