



## 5 极值、条件极值、最小二乘法

### 5.1 复习计划



## 5.2 知识结构



### 5.3 重要知识

### 5.4 习题分类与解题思路

#### 1. 极值问题的求解思路:

第一步 令函数的偏导数等于0, 求出驻点;

第二步 利用极值的充分条件判断驻点是否是极值, 是最大值还是最小值;

【如习题11.3中的1.(1)/(2)/(3), 2., 3.】

第三步 若用充分条件无法判断, 则尝试其他办法求解.

#### 2. 条件极值问题. 用Lagrange乘子法求解, 须根据具体问题分析是否是极值. 主要有以下几种类型:

(a) 求解约束条件下的最值;

【如习题11.4中的1., 2., 3., 6.】

(b) 利用条件极值证明不等式.

【如习题11.4中的4., 5.】

【这部分分析最值的方法大家可以做一个积累.】

#### 3. 有界闭区域上的最值问题. 只需求出驻点, 比较大小, 即可得到最大值和最小值. 不需利用极值的充分条件判断.

【如习题11.4中的3.】

### 5.5 习题11.3解答

#### 1. 求下列函数的极值, 并判断是极大值还是极小值:

(1)  $z = x^3 + y^3 - 3xy$ ;

(2)  $z = 2xy - 3x^3 - 2y^2 + 10$ ;

(3)  $z = xy + \frac{a}{x} + \frac{a}{y}$ .

解: (1)  $\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 - 3y$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = 3y^2 - 3x$ ,

令  $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$  得驻点  $(0, 0)$  和  $(1, 1)$ ,

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x$ ,  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -3$ ,  $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 6y$ .

i) 对于点  $(0, 0)$ ,  $A = \frac{\partial^2 z(0,0)}{\partial x^2} = 0$ ,  $B = \frac{\partial^2 z(0,0)}{\partial x \partial y} = -3$ ,  $C = \frac{\partial^2 z(0,0)}{\partial y^2} = 0$ ,  $AC - B^2 = -9 < 0$ , 故  $(0, 0)$  不是极值点;

ii) 对于点(1, 1),  $A = \frac{\partial^2 z(1,1)}{\partial x^2} = 6$ ,  $B = \frac{\partial^2 z(1,1)}{\partial x \partial y} = -3$ ,  $C = \frac{\partial^2 z(1,1)}{\partial y^2} = 6$ ,  $AC - B^2 = 27 > 0$ ,  $A > 0$ , 故(1, 1)是极小值点, 极小值为 $z(1, 1) = -1$ .

$$(2) \frac{\partial z}{\partial x} = 2y - 9x^2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2x - 4y,$$

令 $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 得驻点(0, 0)和 $(\frac{1}{9}, \frac{1}{18})$ ,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -18x, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -4.$$

i) 对于点(0, 0),  $A = \frac{\partial^2 z(0,0)}{\partial x^2} = 0$ ,  $B = \frac{\partial^2 z(0,0)}{\partial x \partial y} = 2$ ,  $C = \frac{\partial^2 z(0,0)}{\partial y^2} = -4$ ,  $AC - B^2 = -4 < 0$ , 故(0, 0)不是极值点;

ii) 对于点 $(\frac{1}{9}, \frac{1}{18})$ ,  $A = \frac{\partial^2 z(\frac{1}{9}, \frac{1}{18})}{\partial x^2} = -2$ ,  $B = \frac{\partial^2 z(\frac{1}{9}, \frac{1}{18})}{\partial x \partial y} = 2$ ,  $C = \frac{\partial^2 z(\frac{1}{9}, \frac{1}{18})}{\partial y^2} = -4$ ,  $AC - B^2 = 4 > 0$ ,  $A < 0$ , 故 $(\frac{1}{9}, \frac{1}{18})$ 是极大值点, 极大值为 $z(\frac{1}{9}, \frac{1}{18}) = 10\frac{1}{486}$ .

(3)

(a) 当 $a \neq 0$ 时,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y + \frac{-a}{x^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x + \frac{-a}{y^2},$$

令 $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 得驻点 $(\sqrt[3]{a}, \sqrt[3]{a})$ ,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{2a}{x^3}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 1, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{2a}{y^3}.$$

对于点 $(\sqrt[3]{a}, \sqrt[3]{a})$ ,  $A = \frac{\partial^2 z(\sqrt[3]{a}, \sqrt[3]{a})}{\partial x^2} = 2$ ,  $B = \frac{\partial^2 z(\sqrt[3]{a}, \sqrt[3]{a})}{\partial x \partial y} = 1$ ,  $C = \frac{\partial^2 z(\sqrt[3]{a}, \sqrt[3]{a})}{\partial y^2} = 2$ ,  $AC - B^2 = 3 > 0$ ,  $A > 0$ , 故点 $(\sqrt[3]{a}, \sqrt[3]{a})$ 是极小值点, 极小值 $z(\sqrt[3]{a}, \sqrt[3]{a}) = 3\sqrt[3]{a^2}$ .

(b) 当 $a = 0$ 时 $z(x, y) = xy$ ,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x,$$

令 $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 得驻点(0, 0),

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 1, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

对于点(0, 0),  $A = \frac{\partial^2 z(0,0)}{\partial x^2} = 0$ ,  $B = \frac{\partial^2 z(0,0)}{\partial x \partial y} = 1$ ,  $C = \frac{\partial^2 z(0,0)}{\partial y^2} = 0$ ,  $AC - B^2 = -1 < 0$ , 故点(0, 0)不是极值点.

2. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $4x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 4xy - 2yz - 8 = 0$ 确定, 求 $z = z(x, y)$ 的极值点.

解: 方程 $4x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 4xy - 2yz - 8 = 0$ 两边分别对 $x, y$ 求偏导:

$$8x + 6z \frac{\partial z}{\partial x} - 4y - 2y \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad (1a)$$

$$4y + 6z \frac{\partial z}{\partial y} - 4x - 2z - 2y \frac{\partial z}{\partial y} = 0. \quad (1b)$$

在以上两式中令 $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 得 $\begin{cases} 8x - 4y = 0, \\ 4y - 4x - 2z = 0, \end{cases}$  与 $4x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 4xy - 2yz - 8 = 0$

0联立, 得驻点(1, 2)和(-1, -2), 且 $z(1, 2) = 2$ ,  $z(-1, -2) = -2$ ,

方程 (1a) 两边分别对  $x, y$  求偏导:

$$8 + 6\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + 6z\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2y\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0, \quad (2a)$$

$$6\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial z}{\partial x} + 6z\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x} - 4 - 2\frac{\partial z}{\partial x} - 2y\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x} = 0, \quad (2b)$$

方程 (1b) 两边分别对  $y$  求偏导:

$$4 + 6\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 6z\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - 2\frac{\partial z}{\partial y} - 2\frac{\partial z}{\partial y} - 2y\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0. \quad (3)$$

i) 将  $x = 1, y = 2, z = 2, \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \frac{\partial z}{\partial y} = 0$  代入方程 (2a)、(2b) 和 (3), 令  $A = \frac{\partial^2 z(1,2)}{\partial x^2}, B = \frac{\partial^2 z(1,2)}{\partial x\partial y}, C = \frac{\partial^2 z(1,2)}{\partial y^2}$  得

$$8 + 12A - 4A = 0,$$

$$12B - 4 - 4B = 0,$$

$$4 + 12C - 4C = 0,$$

解得  $A = -1, B = \frac{1}{2}, C = -\frac{1}{2}, AC - B^2 = \frac{1}{2} > 0, A = -1 < 0$ , 故  $(1, 2)$  是函数  $z = z(x, y)$  的极大值点.

ii) 将  $x = -1, y = -2, z = -2, \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \frac{\partial z}{\partial y} = 0$  代入方程 (2a)、(2b) 和 (3), 令  $A = \frac{\partial^2 z(-1,-2)}{\partial x^2}, B = \frac{\partial^2 z(-1,-2)}{\partial x\partial y}, C = \frac{\partial^2 z(-1,-2)}{\partial y^2}$  得

$$8 - 12A + 4A = 0,$$

$$-12B - 4 + 4B = 0,$$

$$4 - 12C + 4C = 0,$$

解得  $A = 1, B = -\frac{1}{2}, C = \frac{1}{2}, AC - B^2 = \frac{1}{2} > 0, A = 1 > 0$ , 故  $(-1, -2)$  是函数  $z = z(x, y)$  的极小值点.

3. 试证函数  $z = (1 + e^y) \cos x - ye^y$  有无穷多个极大值而无极小值.

证明:  $\frac{\partial z}{\partial x} = -(1 + e^y) \sin x, \frac{\partial z}{\partial y} = (\cos x - 1 - y)e^y,$

令  $\frac{\partial z}{\partial x} = 0, \frac{\partial z}{\partial y} = 0$  得驻点  $(k\pi, (-1)^k - 1), k \in \mathbb{Z},$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -(1 + e^y) \cos x, \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} = -e^y \sin x, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (\cos x - 1 - y - 1)e^y = (\cos x - y - 2)e^y.$

在驻点  $(k\pi, (-1)^k - 1), k \in \mathbb{Z}$  处,

$$A = \frac{\partial^2 z(k\pi, (-1)^k - 1)}{\partial x^2} = -[1 + e^{(-1)^k - 1}] \cos k\pi = -[1 + e^{(-1)^k - 1}](-1)^k,$$

$$B = \frac{\partial^2 z(k\pi, (-1)^k - 1)}{\partial x\partial y} = -e^{(-1)^k - 1} \sin k\pi = 0,$$

$$C = \frac{\partial^2 z(k\pi, (-1)^k - 1)}{\partial y^2} = [\cos k\pi - (-1)^k + 1 - 2]e^{(-1)^k - 1} = -e^{(-1)^k - 1},$$

$$AC - B^2 = e^{(-1)^k-1}[1 + e^{(-1)^k-1}](-1)^k = \begin{cases} -e^{-2}(1 + e^{-2}) < 0, & k = 2n - 1, \\ 2 > 0, & k = 2n, \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z},$$

故当 $k$ 为奇数时 $(k\pi, (-1)^k - 1)$ 不是极值点；当 $k$ 为偶数时， $A = -2 < 0$ ，故 $(k\pi, (-1)^k - 1)$ 是极大值点。

因此函数 $z = (1 + e^y) \cos x - ye^y$ 有无穷多个极大值而无极小值。

## 5.6 习题11.4解答

1. 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上求一点，使其到点 $(2, 8)$ 的距离最短。

解：抛物线 $y^2 = 4x$ 的点与点 $(2, 8)$ 的距离的平方

$$d^2 = (x - 2)^2 + (y - 8)^2 = \left(\frac{1}{4}y^2 - 2\right)^2 + (y - 8)^2,$$

$\therefore$

$$\frac{dd^2}{dy} = 2\left(\frac{1}{4}y^2 - 2\right)\frac{1}{2}y + 2(y - 8) = \frac{1}{4}y^3 - 2y + 2y - 16 = \frac{1}{4}y^3 - 16,$$

令 $\frac{dd^2}{dy} = 0$ 得 $y = 4$ ，此时 $x = 4$ ，则抛物线 $y^2 = 4x$ 上到点 $(2, 8)$ 的距离最短的点为 $(4, 4)$ 。

【关于最值的分析：】在抛物线 $y^2 = 4x$ 上当 $y = 8$ 时 $x = 4 > 2$ ，故点 $(2, 8)$ 在抛物线开口外部，则以点 $(2, 8)$ 为圆心作圆与抛物线相切，这样的圆只有一个，其半径为抛物线上的到点 $(2, 8)$ 距离的最小值。该最小值也是极小值，满足导数为零的条件，现在满足导数为零条件的点只有一个，则该点就是最小值点。

2. 在椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 内嵌入一长方体，使其体积最大，并求此最大值。

解：设该长方体在第一象限内的顶点为 $(x, y, z)$ ， $x > 0, y > 0, z > 0$ ，问题转化为条件

$$\text{极值问题} \begin{cases} \max\{8xyz\}, \\ \text{s.t. } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1. \end{cases}$$

$$\text{令 } L(x, y, z, \lambda) = 8xyz + \lambda\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1\right),$$

$$\text{由} \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 8yz - 2\lambda\frac{x}{a^2} = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 8xz - 2\lambda\frac{y}{b^2} = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial z} = 8xy - 2\lambda\frac{z}{c^2} = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0, \end{cases} \quad \text{得 } (x, y, z) = \left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}}\right),$$

故当该长方体在第一卦限内的顶点为 $(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}})$ 时，体积最大，最大值为 $V_{\max} = \frac{8}{3\sqrt{3}}abc$ 。

【关于最值的分析：】在第一象限内椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, x > 0, y > 0, z > 0$ 的边界上，长方体的体积为0，在第一象限的椭球面内部， $0 < V = 8xyz < 8abc$ ， $V$ 有上界，故有上确界，易知此时的上确界是 $V = 8xyz$ 的最大值。最大值也是极值，满足极值存

在的必要条件, 现在根据极值存在的必要条件只求出了一个点, 故该点是唯一的最值点, 故是最大值点.

3. 求  $f(x, y) = x^2 + y^2 - x - y$  在  $B = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$  上的最大值与最小值.

解: 由 
$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x - 1 = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 2y - 1 = 0, \end{cases} \quad \text{得 } (x, y) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}),$$

令  $L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - x - y + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$ , 由 
$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - 1 + 2\lambda x = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y - 1 + 2\lambda y = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 - 1 = 0, \end{cases}$$

得  $(x, y) = (\pm\frac{\sqrt{2}}{2}, \pm\frac{\sqrt{2}}{2})$ ,

$\therefore f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = -\frac{1}{2}, f(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}) = 1 - \sqrt{2}, f(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}) = 1 + \sqrt{2},$

$\therefore f(x, y)$  在  $B$  上的最大值为  $1 + \sqrt{2}$ , 最小值为  $-\frac{1}{2}$ .

4. 求函数  $f(x, y, z) = x^2 y^2 z^2$  在约束条件  $x^2 + y^2 + z^2 = c^2$  下的最大值, 并证明不等式

$$\sqrt[3]{x^2 y^2 z^2} \leq \frac{x^2 + y^2 + z^2}{3}.$$

解: 条件极值问题 
$$\begin{cases} \max\{x^2 y^2 z^2\}, \\ \text{s.t. } x^2 + y^2 + z^2 = c^2, \end{cases} \quad \text{等价于在 } u > 0, v > 0, w > 0 \text{ 时的条件极值}$$

问题 
$$\begin{cases} \max\{uvw\}, \\ \text{s.t. } u + v + w = c^2, \end{cases}$$

令  $L(u, v, w, \lambda) = uvw + \lambda(u + v + w - c^2)$ , 由 
$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial u} = vw + \lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial v} = uw + \lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial w} = uv + \lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = u + v + w - c^2 = 0, \end{cases}$$

得  $(u, v, w) = (\frac{c^2}{3}, \frac{c^2}{3}, \frac{c^2}{3})$ , 则所求最大值为  $f(\frac{c}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}}) = \frac{c^6}{27}$  (不妨设  $c > 0$ ).

对任意实数  $x, y, z$ , 取  $c^2 = x^2 + y^2 + z^2$ , 则

$$x^2 y^2 z^2 \leq \frac{c^6}{27} = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{27},$$

即

$$\sqrt[3]{x^2 y^2 z^2} \leq \frac{x^2 + y^2 + z^2}{3}.$$

【关于最值的分析:】在第一象限的平面  $u + v + w = c^2, u > 0, v > 0, w > 0$  上,  $0 < uvw < c^6$ ,  $uvw$  有上界, 故有上确界, 易知该上确界也是最大值. 最大值也是极大值,

满足极值存在的必要条件, 现在根据该必要条件只求出了一个点, 则该点就是最大值点.

5. 设 $x, y$ 为任意正数, 求证

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

(提示: 在约束条件 $x+y=a$ 下, 求 $z = \frac{1}{2}(x^n + y^n)$ 的极值.)

证明: 当 $n=1$ 时,  $\frac{x^n+y^n}{2} \geq (\frac{x+y}{2})^n$ 显然成立;

当 $n \geq 2$ 时, 对于任意正数 $x, y$ , 求解条件极值问题 
$$\begin{cases} \min\{\frac{1}{2}(x^n + y^n)\}, \\ s.t. \ x + y = a, \end{cases}$$

令 $L(x, y, \lambda) = \frac{1}{2}(x^n + y^n) + \lambda(x + y - a)$ ,

$$\text{由} \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = \frac{n}{2}x^{n-1} + \lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = \frac{n}{2}y^{n-1} + \lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x + y - a = 0, \end{cases} \quad (*) \text{得} (x, y) = (\frac{a}{2}, \frac{a}{2}),$$

故 $z(x, y) = \frac{1}{2}(x^n + y^n) \geq z(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}) = (\frac{a}{2})^n$ .

对于任意正数 $x, y$ , 取 $a = x + y$ , 则

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{a}{2}\right)^n = \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

**【注意:】** (1)这里 $n$ 的范围应为正整数; (2)当 $n=1$ 时, 线段 $x+y=1, x>0, y>0$ 上的任意一点均满足方程组(\*), 可能的极值点不唯一, 故应分成 $n=1$ 和 $n \geq 2$ 两种情况考虑. 这也和 $n=1$ 时在线段 $x+y=1, x>0, y>0$ 上 $\frac{1}{2}(x^n + y^n) = \frac{1}{2}(x+y) = \frac{1}{2}a$ 为常数一致.

**【关于最值的分析:】** 当 $n=1$ 时, 在线段 $x+y=1, x>0, y>0$ 上 $\frac{1}{2}(x+y) = \frac{1}{2}$ ;

当 $n=2$ 时,  $\frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 在线段 $x+y=1, x \geq 0, y \geq 0$ 的两端点处等于 $\frac{1}{2}$ , 在该线段的内部因 $0 < x < 1, 0 < y < 1$ , 故 $\frac{1}{2}(x^2 + y^2) < \frac{1}{2}(x+y) = \frac{1}{2}$ ;

同理, 当 $n=3$ 时,  $\frac{1}{2}(x^3 + y^3)$ 在线段 $x+y=1, x \geq 0, y \geq 0$ 的两端点处等于 $\frac{1}{2}$ , 在该线段的内部因 $0 < x < 1, 0 < y < 1$ , 故 $\frac{1}{2}(x^3 + y^3) < \frac{1}{2}(x^2 + y^2) < \frac{1}{2}(x+y) = \frac{1}{2}$ .

故 $\forall (x, y) \in \{(x, y) \mid x+y=1, x>0, y>0\}$ ,  $\frac{1}{2}(x^n + y^n) < \dots < \frac{1}{2}(x^3 + y^3) < \frac{1}{2}(x^2 + y^2) < \frac{1}{2}(x+y) = \frac{1}{2}$ , 因为在线段 $x+y=1, x>0, y>0$ 上 $\frac{1}{2}(x^2 + y^2) = \frac{1}{2}[x^2 + (1-x)^2] = x(x-1) + \frac{1}{2}$ , 为一开口向上的抛物线, 最高的两点的值为 $\frac{1}{2}$ , 故当 $n \geq 2$ 时 $\frac{1}{2}(x^n + y^n)$ 在线段 $x+y=1, x>0, y>0$ 上均为下凸函数, 则 $\frac{1}{2}[(\frac{x}{a})^n + (\frac{y}{a})^n] = \frac{1}{2a^n}(x^n + y^n)$ 在线段 $\frac{x}{a} + \frac{y}{a} = 1, x>0, y>0$ 上也为下凸函数, 则 $\frac{1}{2}(x^n + y^n)$ 在线段 $\frac{x}{a} + \frac{y}{a} = 1, x>0, y>0$ 即 $x+y=a, x>0, y>0$ 上也为下凸函数, 故必有最小值. 最小值也是极小值, 满足极值的必要条件, 因满足极值必要条件的点只有一个, 故该点就是最小值点.



6. 求曲面  $S_1: z = x^2 + y^2$  与  $S_2: x + y + z = 1$  的交线上到原点的距离最大与最小的点.

解: 曲面  $S_1$  与  $S_2$  的交线上的点  $(x, y, z)$  到原点的距离  $r(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ , 问题是

$$\text{求解条件极值} \begin{cases} \max(\min)\{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\}, \\ s.t. \quad z = x^2 + y^2, \\ \quad \quad x + y + z = 1, \end{cases} \quad \text{可化为条件极值问题} \begin{cases} \max(\min)\{x^2 + y^2 + z^2\}, \\ s.t. \quad z = x^2 + y^2, \\ \quad \quad x + y + z = 1, \end{cases}$$

$$\text{令 } L(x, y, z, \lambda) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z) + \mu(x + y + z - 1),$$

$$\text{由} \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + 2\lambda x + \mu = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y + 2\lambda y + \mu = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial z} = 2z - \lambda + \mu = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 - z = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \mu} = x + y + z - 1 = 0, \end{cases} \quad \text{得 } (x, y, z) = (\frac{\pm\sqrt{3}-1}{2}, \frac{\pm\sqrt{3}-1}{2}, 2 \mp \sqrt{3}),$$

由  $r(\frac{\sqrt{3}-1}{2}, \frac{\sqrt{3}-1}{2}, 2-\sqrt{3}) = \sqrt{9-5\sqrt{3}}$ ,  $f(-\frac{\sqrt{3}+1}{2}, -\frac{\sqrt{3}+1}{2}, 2+\sqrt{3}) = \sqrt{9+5\sqrt{3}}$  得曲面  $S_1$  与  $S_2$  的交线上到原点距离最大的点为  $(-\frac{\sqrt{3}+1}{2}, -\frac{\sqrt{3}+1}{2}, 2+\sqrt{3})$ , 距离最小的点为  $(\frac{\sqrt{3}-1}{2}, \frac{\sqrt{3}-1}{2}, 2-\sqrt{3})$ .

【关于最值的分析:】旋转抛物面  $S_1$  与平面  $S_2$  的交线是一条光滑封闭曲线, 在该曲线上必有到原点距离最大和最小的点, 这两点均是极值点, 满足极值的必要条件, 现在根据极值的必要条件只求出两个点, 故这两个点一个是最大值点, 一个是最小值点.

7. 将长为  $l$  的线段分成三份, 分别围成圆、正方形和正三角形, 问如何分割才能使他们的面积之和最小, 并求此最小值.

解: 设  $x, y, z$  分别是围成圆、正方形和正三角形的线段长度, 问题是求解条件极值

$$\begin{cases} \min\{f(x, y, z) = \pi(\frac{x}{2\pi})^2 + (\frac{y}{4})^2 + \frac{\sqrt{3}}{4}(\frac{z}{3})^2\}, \\ s.t. \quad x + y + z = l, \end{cases}$$

$$\text{令 } L(x, y, z, \lambda) = \pi(\frac{x}{2\pi})^2 + (\frac{y}{4})^2 + \frac{\sqrt{3}}{4}(\frac{z}{3})^2 + \lambda(x + y + z - l),$$

$$\text{由} \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = \frac{x}{2\pi} + \lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = \frac{1}{8}y + \lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial z} = \frac{\sqrt{3}}{18}z + \lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x + y + z - l = 0, \end{cases} \quad \text{得 } (x, y, z) = (\frac{\pi l}{\pi+4+3\sqrt{3}}, \frac{4l}{\pi+4+3\sqrt{3}}, \frac{3\sqrt{3}l}{\pi+4+3\sqrt{3}}),$$

故当围成圆、正方形和三角形的三条线段的长度分别为  $\frac{\pi l}{\pi+4+3\sqrt{3}}, \frac{4l}{\pi+4+3\sqrt{3}}, \frac{3\sqrt{3}l}{\pi+4+3\sqrt{3}}$  时, 它们的面积和最小, 最小值为  $f(\frac{\pi l}{\pi+4+3\sqrt{3}}, \frac{4l}{\pi+4+3\sqrt{3}}, \frac{3\sqrt{3}l}{\pi+4+3\sqrt{3}}) = \frac{(\pi+4+3\sqrt{3})l^2}{4(\pi+4+3\sqrt{3})^2}$ .

【关于最值的分析:】当椭圆面  $S = \pi(\frac{x}{2\pi})^2 + (\frac{y}{4})^2 + \frac{\sqrt{3}}{4}(\frac{z}{3})^2$  与第一象限的平面  $x + y + z = l$  相切时,  $S$  为最小, 切点位于第一象限, 故满足条件的最小值点存在, 最小值点也是

极小值点, 满足极值的必要条件, 现在根据极值的必要条件只求出了一个点, 故该点就是最小值点.

## 5.7 第11章补充题解答

1. 确定正数 $a$ , 使得椭球面 $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = a^2$ 与平面 $x - 2y + 3z = 100$ 相切.

解: 方法1: 平面 $x - 2y + 3z = 100$ 的法向量 $\mathbf{n}_0 = (1, -2, 3)$ ,

设切点为 $(x_0, y_0, z_0)$ , 椭球面在切点处的法向量 $\mathbf{n} = (2x, \frac{1}{2}y, \frac{2}{9}z)|_{(x_0, y_0, z_0)} = (2x_0, \frac{1}{2}y_0, \frac{2}{9}z_0)$ ,

由 $\mathbf{n} \parallel \mathbf{n}_0$ 知 $(2x_0, \frac{1}{2}y_0, \frac{2}{9}z_0) = \lambda(1, -2, 3)$ , 又知切点 $(x_0, y_0, z_0)$ 应满足直线方程 $x_0 - 2y_0 + 3z_0 = 100$ , 可得 $\lambda = \frac{100}{49}$ ,

故 $a^2 = x_0^2 + \frac{y_0^2}{4} + \frac{z_0^2}{9} = \frac{\lambda^2}{4} + 4\lambda^2 + \frac{81}{4}\lambda^2 = \frac{98}{4}(\frac{100}{49})^2 = \frac{5000}{49}$ ,  $a = \frac{50}{7}\sqrt{2}$ .

方法2: 如限定椭球面 $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = a^2$ 与平面 $x - 2y + 3z = 100$ 相交或相切, 则当相切

时 $a^2$ 最小, 因此问题等价于条件极值问题 
$$\begin{cases} \min x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9}, \\ s.t. x - 2y + 3z = 100, \end{cases}$$

令 $L(x, y, z, \lambda) = x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} + \lambda(x - 2y + 3z - 100)$ ,

$$\text{由} \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + \lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = \frac{1}{2}y - 2\lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial z} = \frac{2}{9}z + 3\lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x - 2y + 3z - 100 = 0, \end{cases} \quad \text{得}(x, y, z) = -\frac{100}{49}(-\frac{1}{2}, 4, -\frac{27}{2}),$$

故所求最小值为 $a^2 = x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = (\frac{1}{4} + 4 + \frac{81}{4})(\frac{100}{49})^2 = \frac{5000}{49}$ ,  $a = \frac{50}{7}\sqrt{2}$ .

2. 设 $f(x, y)$ 在全平面内可微, 并且当 $x^2 + y^2 \rightarrow +\infty$ 时, 满足条件

$$\frac{|f(x, y)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow +\infty.$$

求证: 对于任意向量 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ , 存在点 $M(x_0, y_0)$ , 使得 $\text{grad}f(x_0, y_0) = \mathbf{v}$ .

证明:  $\because \frac{|f(x, y)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow +\infty, x^2 + y^2 \rightarrow +\infty,$

$$\therefore |f(x, y)| = \frac{|f(x, y)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow +\infty, x^2 + y^2 \rightarrow +\infty,$$

下面证明: 当 $x^2 + y^2 \rightarrow +\infty$ 时, 或者 $f(x, y) \rightarrow +\infty$ 或者 $f(x, y) \rightarrow -\infty$ .

$$\because |f(x, y)| \rightarrow +\infty, x^2 + y^2 \rightarrow +\infty,$$

$$\therefore \exists R > 0, s.t. \text{当} x^2 + y^2 > R^2 \text{时}, |f(x, y)| > 1,$$

假设当 $x^2 + y^2 \rightarrow +\infty$ 时, 既不是 $f(x, y) \rightarrow +\infty$ , 也不是 $f(x, y) \rightarrow -\infty$ . 则必存在两点 $M_1(x_1, y_1), M_2(x_2, y_2)$ , 满足 $x_1^2 + y_1^2 > R^2, x_2^2 + y_2^2 > R^2$ , 且 $f(x_1, y_1) < 0, f(x_2, y_2) > 0$ .

以点 $M_1(x_1, y_1), M_2(x_2, y_2)$ 分别为起点和终点做一条完全位于圆域 $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$ 之外的连续曲线 $L$ , 在该曲线上 $f(x, y)$ 为一元连续函数, 根据零点定理 $\exists M(\xi, \eta) \in L, s.t. f(\xi, \eta) = 0$ . 但在曲线 $L$ 上 $x^2 + y^2 > R^2$ , 故 $\forall (x, y) \in L, |f(x, y)| > 1$ , 与 $\exists M(\xi, \eta) \in L, s.t. f(\xi, \eta) = 0$ 矛盾. 故假设不成立.

所以当 $x^2 + y^2 \rightarrow +\infty$ 时, 或者 $f(x, y) \rightarrow +\infty$ 或者 $f(x, y) \rightarrow -\infty$ .

对于任意向量 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ ,

$$\therefore \left| \frac{v_1 x + v_2 y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \frac{|v_1||x| + |v_2||y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{|v_1||x|}{|x|} + \frac{|v_2||y|}{|y|} = |v_1| + |v_2|,$$

$$\therefore \frac{|f(x, y) - (v_1 x + v_2 y)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \geq \frac{|f(x, y)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \left| \frac{v_1 x + v_2 y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \geq \frac{|f(x, y)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} - (|v_1| + |v_2|),$$

$$\therefore \frac{|f(x, y)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow +\infty, x^2 + y^2 \rightarrow +\infty,$$

$$\therefore \frac{|f(x, y) - (v_1 x + v_2 y)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow +\infty, x^2 + y^2 \rightarrow +\infty,$$

$\therefore$ 与证明当 $x^2 + y^2 \rightarrow +\infty$ 时, 或者 $f(x, y) \rightarrow +\infty$ 或者 $f(x, y) \rightarrow -\infty$ 同理, 当 $x^2 + y^2 \rightarrow +\infty$ 时, 或者 $f(x, y) - (v_1 x + v_2 y) \rightarrow +\infty$ 或者 $f(x, y) - (v_1 x + v_2 y) \rightarrow -\infty$ ,

不妨设当 $x^2 + y^2 \rightarrow +\infty$ 时,  $f(x, y) - (v_1 x + v_2 y) \rightarrow +\infty$ ,

根据第10章补充题第1题的结论,  $\exists (x_0, y_0), s.t. g(x, y) = f(x, y) - (v_1 x + v_2 y) \geq g(x_0, y_0)$ .

则在点 $(x_0, y_0)$ 处 $\frac{\partial g(x_0, y_0)}{\partial x} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} - v_1 = 0, \frac{\partial g(x_0, y_0)}{\partial y} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} - v_2 = 0$ , 即 $\text{grad} f(x_0, y_0) = \left( \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}, \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \right) = (v_1, v_2) = \mathbf{v}$ ,

所以对于任意向量 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ , 存在点 $M(x_0, y_0)$ , 使得 $\text{grad} f(x_0, y_0) = \mathbf{v}$ .

3. 设 $f(x, y) = 3x^4 - 4x^2y + y^2$ . 求证: 若限制在过原点的每条直线上,  $f(x, y)$ 在原点达到极小值. 但是原点不是 $f(x, y)$ 的极小值.

证明: (1)  $f(0, y) = y^2$ 在 $y = 0$ 处达到极小值, 即在直线 $x = 0$ 上 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处达到极小值.

$$(2) \text{记 } g(x) = f(x, kx) = 3x^4 - 4kx^3 + k^2x^2,$$

$$\text{则 } g'(x) = 12x^3 - 12kx^2 + 2k^2x, \quad g''(x) = 36x^2 - 24kx + 2k^2,$$

i) 当 $k \neq 0$ 时,  $g'(0) = 0, g''(0) = 2k^2 > 0$ ,  $g(x)$ 在点 $x = 0$ 处取得极小值;

ii) 当 $k = 0$ 时,  $g(x) = 3x^4$ ,  $g(x)$ 在点 $x = 0$ 处取得极小值.

故在直线 $y = kx$ 上 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处达到极小值.

所以在过原点的每条直线上,  $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处达到极小值.

$$\therefore \frac{\partial f}{\partial x} = 12x^3 - 8xy, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -4x^2 + 2y,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 36x^2 - 8y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -8x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2,$$

$\therefore$  在点  $(0, 0)$  处  $\frac{\partial f(0,0)}{\partial x} = 0, \frac{\partial f(0,0)}{\partial y} = 0,$

且  $A = \frac{\partial^2 f(0,0)}{\partial x^2} = 0, B = \frac{\partial^2 f(0,0)}{\partial x \partial y} = 0, C = \frac{\partial^2 f(0,0)}{\partial y^2} = 2, AC - B^2 = 0,$

又  $\because f(x, 2x^2) = 3x^4 - 8x^4 + 4x^4 = -x^4$  在  $x = 0$  处取得极大值, 即在抛物线  $y = 2x^2$  上  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  处取得极大值, 故点  $(0, 0)$  不是  $f(x, y)$  的极小值.